

Vorausedition zur Leibniz-Akademie- Ausgabe, Band VII, 8: Varia mathematica, Nachträge 1670–1676

Version 3

Vorausedition zur Leibniz-Akademie-Ausgabe, Band VII, 8: Varia mathematica, Nachträge 1670–1676. Version 3. Bearbeitet von Alexandra Lewendoski, Siegmund Probst, Elisabeth Rinner, Regina Stuber und Achim Trunk, hrsg. von der Leibniz-Forschungsstelle Hannover der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen beim Leibniz-Archiv der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek. Hannover, 4. November 2022.



Sofern nicht anders angegeben, werden die Inhalte dieses Dokuments von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International Lizenz ([CC BY-NC 4.0](#)) zur Verfügung gestellt.

ZU DIESEM DOKUMENT

Band 8: *Varia mathematica, Nachträge 1670–1676* von Reihe VII: *Mathematische Schriften* der historisch-kritischen Gesamtausgabe *Gottfried Wilhelm Leibniz: Sämtliche Schriften und Briefe*, hrsg. von der Preußischen Akademie der Wissenschaften u. a., Darmstadt u. a. 1923 ff. (Leibniz-Akademie-Ausgabe), wird die Edition der mathematischen Schriften aus Leibniz' Jahren in Paris abschließen. Die vorliegende Vorausedition gibt den Stand der Arbeiten an diesem Band vom November 2022 wieder.

Die Handschriften wurden von Alexandra Lewendoski, Siegmund Probst, Elisabeth Rinner, Regina Stuber und Achim Trunk bearbeitet. Davide Crippa (Venedig/Prag) stellte während seiner Tätigkeit für das Projekt ANR MATHESIS: Édition et commentaires de manuscrits mathématiques inédits de Leibniz (2017–2021), N° ANR-17-CE27-0018-01 AAP générique 2017, eine Transkription von N. 26 zur Verfügung. Michel Serfati (†, Paris) trug Vorarbeiten zur Edition von N. 40₆ bei. Die Erfassung der Stücke hat Manuela Mirasch-Müller übernommen, teilweise nach Vorarbeiten von Christopherus Ray'onaldo, Jule Schwarzkopf und Yixiao Wang.

Der Satz erfolgte mit dem von John Lavagnino und Dominik Wujastyk entwickelten TeX-Macropaket EDMAC. Um den Editionstext angemessen wiedergeben zu können, wurde im Leibniz-Archiv eine auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Edition zugeschnittene Erweiterung entwickelt. Einige Figuren wurden mit den Programmen WINGEOM und WINPLOT von Richard Parris generiert und in TeX weiterbearbeitet.

Vorläufigkeit

Bei den Texten der Vorausedition handelt es sich um vorläufige Ergebnisse. Der fertige Band wird in einigen Aspekten von diesem Preprint abweichen. So werden sich die Anzahl und die Reihenfolge der Stücke und damit auch ihre Nummern und Seitenzahlen ändern. Bei Seitenumbrüchen und Zeilenzählung kann es ebenfalls zu Verschiebungen kommen. Schließlich können sich auch inhaltliche Änderungen ergeben; insbesondere sind die Datierungen noch vorläufig.

Versionierung und Langfristigkeit

Im Lauf der editorischen Arbeit an einem Band können geänderte vorläufige Fassungen als Vorausedition zugänglich gemacht werden. Unterschiedliche Fassungen des Dokuments werden durch Versionsnummern gekennzeichnet und sind so eindeutig identifizierbar.

Wir empfehlen ausdrücklich, stets die aktuellen Fassungen der Bearbeitungen der Stücke zu nutzen. Bitte überprüfen Sie deshalb vor der Nutzung auf unserer Webseite, ob eine neuere Version der *Vorausedition* oder der publizierte Band verfügbar ist.

Die Langzeitarchivierung und die langfristige Bereitstellung der Dokumente erfolgen über die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, die das Akademien-Vorhaben „Leibniz-Edition“ gemeinsam mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften betreut. Die Zitierfähigkeit wird gewährleistet.

Zitierhinweis

Die vollständigen bibliographischen Angaben des Dokuments können der Titelseite entnommen werden. Wir empfehlen, bei Zitaten aus der Vorausedition oder Verweisen auf diese stets die Versionsnummer mit anzugeben. Ein Verweis könnte in einer Kurzform nach dem Muster des folgenden Beispiels gestaltet werden:

G. W. Leibniz, *De condendis tabulis analyticis* (GWLB LH 35 XIII 1 Bl. 440; vgl. *Vorausedition zur Leibniz-Akademie-Ausgabe, Band VII, 8, Version 1*, dort N. 21 S. 69–70).

Die Signatur der edierten Handschrift findet sich jeweils im Kopf des Stückes.

Kontakt

Leibniz-Archiv, Waterloostraße 8, D-30169 Hannover, Deutschland

Leitung: Michael Kempe

Email: leibnizarchiv@gwlb.de

Internetauftritt: <http://www.gwlb.de>

ABOUT THIS DOCUMENT

Volume 8: *Varia mathematica, Nachträge 1670–1676* of Series VII: *Mathematische Schriften* (Mathematical Writings) of the historical-critical edition of the complete works of Leibniz (Gottfried Wilhelm Leibniz: *Sämtliche Schriften und Briefe*) published by the Prussian Academy of Sciences and other institutions since 1923 (the Academy Edition or *Leibniz-Akademie-Ausgabe*) will complete the publication of the mathematical writings from Leibniz's years in Paris. This *Vorausedition* (advance edition) presents the state of work on this volume as of November 2022.

The texts were prepared from manuscript sources by Alexandra Lewendoski, Siegmund Probst, Elisabeth Rinner, Regina Stuber and Achim Trunk. Davide Crippa (Venice/Prague) provided a transcription of N.²⁶ during his work for the project ANR MATHESIS: Édition et commentaires de manuscrits mathématiques inédits de Leibniz (2017–2021), N° ANR-17-CE27-0018-01 AAP générique 2017. Michel Serfati (†, Paris) contributed preparatory work to the edition of N.^{40₆}. Manuela Mirasch-Müller was responsible for inputting the texts, partly on the basis of preparatory work by the editors and by Christopherus Ray'onaldo, Jule Schwarzkopf, and Yixiao Wang.

The \TeX macro suite EDMAC, developed by John Lavagnino and Dominik Wujastyk, was used for typesetting. To facilitate an adequate rendition of the published text, additions to this suite specifically adapted to the requirements and needs of the edition were developed at the Leibniz-Archiv. Some of the figures were initially produced using the WIN-GEOM and WINPLOT programs created by Richard Parris, and completed using \TeX .

Preliminary status

The writings presented in this advance edition are preliminary research results. The finished volume can be expected to diverge from them in some respects. Thus, the quantity and the sequence of the texts will change, as will their numbering and pagination. Likewise, there may be shifts in page transitions and line numbers. Finally, changes may occur to the content itself; the dates assigned to the writings, in particular, are only preliminary.

Versions and long-term availability

Over the course of editorial work, successive preliminary versions may be made available as advance editions. Distinct versions of the document are marked with version numbers and are thus unambiguously identifiable.

We strongly recommend always using the most recently published version of our edition of each text. Please check our website before citing this document to ascertain whether a newer version of the *Vorausedition* or the printed volume has become available.

Long-term archiving and availability of our documents are provided by the Göttingen Academy of Sciences and Humanities, which is jointly responsible with the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities for the interacademic project of the Leibniz Academy Edition. Citability will remain assured.

Suggestions for citation

The complete reference of this document can be found on the title page. We recommend always specifying the version number when citing or referring to this advance edition. The following is an example of how such a reference may be provided in an abbreviated form:

G. W. Leibniz, *De condendis tabulis analyticis* (GWLB LH 35 XIII 1 fol. 440; see *Vorausedition zur Leibniz-Akademie-Ausgabe, Band VII, 8, Version 1*, N. 21 p. 69-70).

The shelfmark for the manuscript source may be found in the introductory notes to each individual text.

Contact

Leibniz-Archiv, Waterloostr. 8, D-30169 Hannover, Germany

Head of department: Michael Kempe

E-mail: leibnizarchiv@gwlb.de

Website: <http://www.gwlb.de>

INHALTSVERZEICHNIS

VARIA MATHEMATICA, NACHTRÄGE 1670–1676

1.	Observatio de logarithmis Mitte Februar 1673	1
2.	Règle pour trouver les feries Oktober – Dezember 1675	2
3.	Datum et determinatum Erste Hälfte 1676 oder 1678 – 1679 (?)	7
3 ₁ .	Datum est determinatum cognitum	7
3 ₂ .	Determinatum idem quod dabile	8
4.	Expressio unius literae per multas 4. September 1674	9
5.	De characterum imperfectione September – Oktober 1674	11
6.	Generalia Geometrica Mai – Oktober 1674	12
7.	Sur le calcul des partis 7. Januar 1676	17
8.	Fractiones sexagenariae Mitte 1674 – Ende 1676	48
9.	Multiplicatio numerorum sexagesimalium Mitte 1674 – Ende 1676	50
10.	De numero jactuum in tesseris Januar 1676	59
11.	De Analyseos Historia Oktober 1674 – Januar 1675	73
12.	Generatio circuli November 1675 – Januar 1676	85
13.	Cylinder sinuum ex applicatis parabolicis Sommer 1673	86
14.	De modis exprimendi series Herbst 1672 – Anfang 1673	87
15.	Exempla aequationis quadraticea et biquadraticae 10.–11. Oktober 1675	88
16.	Instrumentum ad constructionem aequationum Mitte bis Ende Oktober 1675	89
17.	De conoeidibus 1673 (?)	91
18.	Quadratura per figurae complementum Herbst 1675 (?)	92
19.	Lalouverae speculationes geometricae 1673	94
20.	Tabula pythagorica in manu nostra inscripta nach Mitte 1674	95
21.	Calculus per divisiones 29. Oktober 1675	96
22.	Cartesii cogitationes privatae 1. u. 5. Juni 1676	98
23.	De condendis tabulis analyticis Januar 1675	131
24.	Schediasma de constructore Dezember 1674	133
24 ₁ .	Pars prima	133
24 ₂ .	Pars secunda	144
24 ₃ .	Pars tertia	152
25.	Dispositiones et complexions April – Juli 1672	157

26.	Constructor Dezember 1674.....	161
27.	De tabulis analyticis condendis 24. Dezember 1674 – Anfang 1675 (?).....	178
28.	De solidis analyticis Dezember 1674.....	183
29.	Nota ad Soverum Oktober 1676 – März 1679 (?)	184
30.	Mea Geometria Juli – September 1676 (?).....	185
31.	De Machina Combinatoria, sive Analytica September 1674 – Anfang 1675 (?)	186
32.	Generalis Diatyposis Ende 1676	190
33.	Pascalii fragmentum 4. Juni 1675 – Januar 1676.....	197
34.	Extrait d'un Fragment de Pascal Januar – September 1676 (?)	201
35.	De tabula combinatoria perfecta 31. Oktober – November 1675	205
36.	De formulis omnium dimensionum	206
36 ₁ .	De formulis omnium dimensionum, partes prima et secunda Januar 1675	206
36 ₂ .	De formulis omnium dimensionum, partes tertia et quarta Februar 1675	234
37.	De aequatione quadratica Frühjahr 1673	237
38.	Invenire generatricem trochoidis Ende 1676	245
39.	Aus und zu Pierre Courcier, Supplementum Sphaerometriae 8. März 1676 ...	248
40.	Marginalien in Blaise Pascal, Traité Du Triangle Arithmetique	255
40 ₁ .	Zur Klapptafel Frühjahr – Herbst 1672.....	255
40 ₂ .	Zum Traitté des ordres Numeriques Herbst 1672 – Winter 1672/73	258
40 ₃ .	Zu De numerorum continuorum productis Ende 1672 – Frühjahr 1673 sowie Ende 1673 – Mitte 1674	259
40 ₄ .	Zu Numericarum potestatum Generalis resolutio Ende 1672 – Frühjahr 1673	260
40 ₅ .	Zu Potestatum Numericarum Summa Juli – Dezember 1672	261
40 ₆ .	Zu De numeris multiplicibus Winter 1686/87.....	262
41.	Formae Combinatoriae 20. Oktober 1675	267
42.	De Discrptionibus numerorum April – Dezember 1670 (?)	272
43.	Regula Discrptionum Universalis Juli – Dezember 1672	276
44.	Regula discrptionum et triscrptionum universalis Juli – Dezember 1672	277
45.	De Numero Formarum Februar 1676	282
46.	Notae ad triangula numerorum et ad algebraam Erste Hälfte Mai 1676	285
47.	De aequationibus cubicis et biquadratis reductis Oktober – Dezember 1676 ..	289
48.	Notae ad radicum series Frühjahr bis Sommer 1673.....	292
49.	Numerum datum dividere in duos quadratos Mai 1675	293

50.	Combinatoria Oktober 1674 – Januar 1675	295
51.	Characteristica et combinatoria Oktober 1674 – Januar 1675	297
52.	Note sur les Nouveaux elemens de geometrie Mitte 1674 – Ende 1675 (?)	303
53.	Tabula differentiarum et summarum April 1675	304

VARIA MATHEMATICA, NACHTRÄGE 1670–1676

1. OBSERVATIO DE LOGARITHMIS

[Mitte Februar 1673]

Überlieferung: L Notiz: LH 35 V 16 Bl. 4. 1 Streifen $19 \times 1,5$ cm. 2 Z. auf Bl. 4 r°. — Gedr.: III, 1 N. 4 S. 26 Erl.
Cc 2, Nr. 339

5

Datierungsgründe: Die Aufzeichnung dürfte kurz nach der in III, 1 N. 4 S. 22 f. erwähnten Unterhaltung mit J. Pell vom 12. Februar 1673 entstanden sein. Leibniz erwähnt das Werk von Briggs in seinen *Observata in itinere Anglicano* (VIII, 1 N. 1 S. 4).

Bridgjus in *Trigonometria Britannica*, ubi de Logarithmis, observavit, differentias sinuum numerorum imparium crescere, ut ipsos sinus; parium decrescere, puto. Dixit D^{nus} Pellius.

10

9 Astronomia Britannica L ändert Hrsg.

9 observavit: Pell bezog sich vermutlich auf folgende Aussage in H. BRIGGS, *Trigonometria Britannica*, 1633, S. 36: „Sunt igitur Differentiae Secundae, Quartae, Sextae, Octavae etc. proportionales ipsis Sinibus datis. Et Differentiae Primae, Tertiae, Quintae, Septimae proportionales inter se et Sinibus complementorum Arcuum mediorum.“

2. RÈGLE POUR TROUVER LES FERIES

[Oktober – Dezember 1675]

Überlieferung: L Notiz: LH 35 XII 1 Bl. 182–183. 2 Bl. 8°, die ursprüngl. 1 Bl. 4° bildeten.

1 S. auf Bl. 182, 2 S. auf Bl. 183.

5 Cc 2, Nr. 1502 B, A

Datierungsgründe: Vgl. die Datierungsgründe zu VII, 3 N. 49. — Eine Datierung auf das Jahr 1675 wird durch den Umstand nahegelegt, dass Leibniz, als er sich mit dem Beispiel 1. Mai 1615 befasst, zunächst versehentlichlich 1675 schreibt; möglicherweise ist dies also die aktuelle Jahreszahl. Einen konkreten *terminus ante quem* liefert das Stück, indem es den 1. Januar 1676 in der Zukunftsform behandelt.

- 10 Auch der 15. August 1676 wird in der Zukunftsform behandelt, in einer verworfenen Variante allerdings in der Vergangenheitsform. — Das Wasserzeichen des Papiers ist bislang nur von zwei anderen Trägern bekannt. Auf diesen finden sich VII, 3 N. 49₁, eine gemeinsame Gesprächsaufzeichnung von Leibniz und Tschirnhaus, und VII, 3 N. 49₂, eine Aufzeichnung von Tschirnhaus. Möglicherweise stammt die bei Leibniz seltene Papiersorte also aus Tschirnhausens Besitz. Da Tschirnhaus erst Ende September 1675
- 15 in Paris ankommt, können die erwähnten beiden Teilstücke nicht früher entstanden sein. Falls das Papier tatsächlich aus Tschirnhausens Besitz stammt, gilt dies auch für unser Stück, falls nicht, legt die Übereinstimmung der Wasserzeichen zumindest eine Entstehung in derselben Zeit nahe.

[*Erster Ansatz*]

Le cycle solaire peut servir à obtenir la lettre dominicale, et à connoistre ainsi le jour
20 de la semaine qui sera par exemple le premier de mars, ou quelque autre d'un mois donné.
Mais on peut l'obtenir plus aisément par la voye suivante: Au nombre 2 soit adjouté le
nombre de l'année proposée de l'Epoque vulgaire, et encor le quart du dit nombre de la
dite année proposée; negligeant le residu. Divisez la somme de ces trois nombres, $2 + b + \frac{b}{4}$

19 obtenir erg. L 22 proposée erg. L

19 cycle solaire: Die Nummer eines Jahres im 28-jährigen Sonnenzirkel setzt Leibniz offenbar als bekannt voraus, sie kann aber auch mühelos berechnet werden (sie entspricht dem Rest, der bei Division der um 9 vergrößerten Jahreszahl durch 28 bleibt). Der dieser Zahl des Sonnenzirkels zugeordnete Sonntagsbuchstabe und der sich aus diesem ergebende Wochentag eines gesuchten Datums lassen sich dann geeigneten Tabellen entnehmen.

par 7, et le residu sera le nombre du jour de la semaine au quel se rencontre le premier de mars, contant le dimanche pour le premier jour de la semaine, lundi pour le second, etc. Quand il ne restera 0 le premier de Mars sera un samedy.

Si l'on demande la même chose de quelque année avant la naissance de nostre seigneur; alors il faut se servir de la regle suivante.

5

[*Zweiter Ansatz*]

Regle pour trouver les feries ou le jour de la semaine au quel se rencontre
un certain jour du mois donné dans l'année donnée

Adjoutons ensemble,

le nombre de l'année donnée	1676	10
son quart (negligeant le residu s'il y en a)	419	
et le nombre constant	2 si c'est un bissext ou 3 si c'est un autre	
La Somme	<u>2097</u>	
divisée par 7 laissera	4	

Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	15
1	2	3	4	5	6	0	Nombres des feries

Donc le premier janvier de l'an 1676 sera un Mercredi.

Maintenant s'il s'agit de trouver la ferie du 15 d'Aoust de l'an 1676, on n'a qu'à prendre le nombre des jours qui sont depuis le 1. janvier inclusivement jusqu'au 15

3 *Über die 0 gesetzt:* rien

7 les feries ou *erg. L* 8f. donnée (1) Par exemple le 15 d'Aoust de l'année 1676 estoit un samedi, tachons de le trouuer par nostre regle, qvi est telle: au nombre 2 (a) (si c'est un bissext) (b) ou (2) Adjoutons *L* 12 constant 2 (1) ou 3. au lieu de 2. si l'an est un bissext. (2) si *L* 18 trouuer (1) le 15 d'A (2) la ferie *L* 19 janvier (1) exclusivement jusqv'au 15 d'Aoust (2) inclusivement *L*

1f. premier de mars: Die im ersten Ansatz festgehaltene Regel zur Bestimmung des Wochentages des 1. März eines beliebigen Jahres ist für den julianischen Kalender gültig, jedoch nicht für den in Paris geltenden gregorianischen. 5 regle suivante: Anstatt eine solche Regel zur Bestimmung des Wochentags von Daten, die vor Beginn der christlichen Zeitrechnung liegen, auszuführen, schneidet Leibniz das Blatt unterhalb der letzten Zeile des ersten Ansatzes durch und notiert den zweiten und dritten auf Vorder- und Rückseite des verbleibenden Papierstückes. 18 15 d'Aoust: Bereits G. SCHOTT, *Organum mathematicum*, 1648, *regula XI*, S. 412–415, dient ein 15. August (der des Jahres 1665) als Beispiel für seine Regel zur Berechnung des Wochentages.

d'Aoust exclusivement sçavoir 227, et y adjouter 4, nombre de la ferie du premier janvier, et il proviendra 231, le quel divisé par 7 laisse 0, donc le 15 d'Aoust 1676 est un Samedi.

La regle se proposera plustost ainsi. Il faut adjouter ensemble le nombre 1676, son

1 *Hilfsaufstellung zu den beiden Beispielen:*

Janvier	31 •	31	31
Fevrier	28 ou 29	29	28
Mars	31 •	31	31
Avril	30	30	30
May	31 •	31	<u>120</u>
Juin	31 •	31	
Juill.	<u>30</u>	30	
Aoust	<u>31 •</u>	<u>14</u>	
Sept.	30	<u>227</u>	
Oct.	31 •		
Nov.	30		
Dec.	31 •		

2 *Nebenrechnungen zum Beispiel 15. August 1676:*

$$\begin{array}{r}
 1676 \\
 419 \\
 \underline{227} \\
 \underline{2} \\
 \hline
 2324
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 21 \\
 \cancel{2324} \not| 332, \text{ reste, } 0. \text{ Nombre de la ferie du Samedy.} \\
 777
 \end{array}$$

1 227. (1) et les diviser par 7 le residu (a) 7 (b) 3 adjouté à 4 (2) et y adjouter *L*

3 regle: Diese Regel ist, da sie ausfallende Schaltjahre wie 1700 unberücksichtigt lässt, nicht auf den gesamten gregorianischen Kalender seit seiner Einführung 1582 anwendbar, sondern gilt so nur für das 16. und 17. Jahrhundert. Ab 1701 müsste sie angepasst werden, indem man vor der Division durch 7 die Anzahl der ausfallenden Schalttage subtrahiert. **10** Juin: Leibniz verwechselt die Länge der Monate Juni und Juli, was sich auf die Berechnung aber nicht auswirkt.

quart 419, negligeant le residu, le nombre des jours de l'année qui precedent celuy dont on cherche la ferie; et enfin le nombre constant 2 si c'est un bissext, ou 3 si c'est une autre année; le residu de la somme divisée par 7 donnera le nombre de la ferie du jour qu'on cherche.

[*Dritter Ansatz*]

5

„Regle pour trouver la ferie ou jour de la semaine au quel se rencontre un certain „jour du mois donné dans l'année donnée de la periode julienne.

Au nombre de l'année julienne adjoutez sa quatrieme partie, ou si le residu passe l'unité, le nombre entier prochainement plus grand, negligeant tousjours la fraction. La

4 *Berechnung eines weiteren Beispiels für die Regel aus dem zweiten Ansatz:*

1 Maii 1615. Lundi.

$$\begin{array}{r}
 1615 \\
 403 \\
 1 \\
 \hline
 120 \\
 2139
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 6 \\
 2141 \not| 305 \\
 777 \\
 \hline
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 4 \\
 2139 \not| 305 \\
 777 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 10 \quad 1 \text{ Maii } (1) \text{ 1675 } (2) \text{ 1615 } L \\
 \quad \quad \quad 11-15 \quad (1) \text{ 1615 } \quad (2) \text{ 1615 } \quad L \\
 \quad \quad \quad 403 \quad \quad \quad 403 \\
 \quad \quad \quad 3 \quad \quad \quad 1 \\
 \quad \quad \quad \hline
 \quad \quad \quad 120 \quad \quad \quad 120 \\
 \quad \quad \quad 2141 \quad \quad \quad 2139
 \end{array}$$

8 l'année julienne: Gemeint ist die Jahreszahl nach der von J. J. SCALIGER, *De emendatione temporum*, 1583, S. 198 eingeführten Zeitrechnung. Ihre Epoche ist Montag, der 1. Januar 4713 v. Chr., gerechnet nach dem julianischen Kalender.

11 1 Maii 1615: Dass der 1. Mai 1615 ein Montag gewesen sei, führt S. MORLAND, *Arithmetick Instruments*, 1673 [Marg.], Abschnitt *An Explanation of the Perpetual Almanack*, auf S. 3 als Beispiel zur Benutzung seines Ewigen Kalenders an. Leibniz prüft an diesem Beispiel die im zweiten Ansatz stipulierte Regel: Er addiert die Zahl 3 für Gemeinjahre und führt die Division durch 7 schriftlich aus (Mitte). Da das Ergebnis den Rest 6 aufweist und somit nicht wie von ihm erwartet ausfällt, ändert er den zu addierenden Wert, indem er statt einen Tag mehr als 2 einen weniger addiert. Die korrigierte Summe dividiert er erneut schriftlich (rechts). Doch auch diese Division liefert nicht das gewünschte Ergebnis. Tatsächlich ist das erste Ergebnis richtig: Der Rest 6 besagt, dass es sich beim 1. Mai 1615 des gregorianischen Kalenders um einen Freitag handelte. Dementsprechend war der 1. Mai 1615 des julianischen Kalenders — und eben diesen berechnet der Engländer Morland — ein Montag.

somme augmentée de 5, soit divisée par 7; et ce qui restera sera le nombre de la ferie du premier janvier nouveau style de l'année proposée. Lequel estant connu, il est aisé d'avoir la ferie de tel autre jour que l'on voudra, en adjointant au nombre de la ferie du premier de janvier le nombre de tous les jours de cette année qui precedent le jour proposé. Cette somme divisée par 7 laissera la ferie demandée. Il est aisé de sçavoir le nombre de tous les jours precedans, parce qu'on sçait le nombre des jours de chaque mois qui est tousjors le même excepté que le fevrier au lieu de 28 en a 29, l'an estant bissextre. Or le bissextre de la Periode Julianne se reconnoist, lors qu'en divisant son nombre par 4, il reste 1.

Exemple

10	1676 est de la periode julienne	6389	$\frac{34}{7991} \text{ f } 1141.$ Reste 4.
	son quart (negligeant la fraction)	1597	
	Nombre constant	5	$\frac{7777}{7777}$
		7991	

Donc le premier janvier de cette année est la quatrieme ferie ou un mercredi.

15 Si vous voulez la ferie du 15 d'Aoust de la même année, adjoutez à 4 le nombre 227 qui est celuy des jours de cette année bissextile qui precedent le 15 d'Aoust, et la somme 231 divisée par 7 laisse [0] donc le 15 d'Aoust est la septieme ferie ou un samedi.

2 nouveau style: Die im dritten Ansatz vorgestellte Regel ist nicht ganz korrekt; sie erzeugt die Wochentagsprünge jeweils um zwei Jahre versetzt. So ergibt bereits ihre Anwendung auf den Neujahrstag des folgenden Jahres 1677 unzutreffenderweise, dieser sei ein Donnerstag gewesen; tatsächlich handelte es sich um einen Freitag. Die Regel ließe sich ohne weiteres ertüchtigen — etwa, indem man die Julianische Jahreszahl vor der Addition ihres Viertels um 2 erhöht und nach dieser Addition den ganzzahligen Anteil dann nur noch um 3 vergrößert. Doch auch eine in dieser Form verbesserte Regel wäre, so wie die aus dem zweiten Ansatz, nur bis 1700 gültig.

3. DATUM ET DETERMINATUM

[Erste Hälfte 1676 oder 1678 – 1679 (?)]

Bei den Stücken N.³¹ und N.³² handelt es sich um Notizen zu den Begriffen *datum* und *determinatum*. Auf dem Träger von N.³¹ sind auf Bl. 73 v^o Namen von französischen Diplomaten notiert. Am 7. November 1672 schreibt Johann Christian von Boineburg an Leibniz, dass er seinen Sohn mit Jean-Antoine d'Avaux, dem *président à mortier*, und mit Honoré Courtin bekannt machen solle (I, 1 N. 194, S. 284). Am 31. März 1673 schreibt Leibniz an Melchior Friedrich von Schönborn, dass er von der Entsendung von Honoré Courtin und Jean-Paul de Barillon, der ihm unbekannt sei, als französische Gesandte zum Kölner Friedenskongress erfahren habe (I, 1 N. 225, S. 330). Nach der Verhaftung von Wilhelm Egon von Fürstenberg verließ die französische Delegation Köln am 16. April 1674 zunächst Richtung Maastricht. Leibniz war spätestens ab Oktober 1674 aufgrund seiner juristischen Beratung für die Familie Fürstenberg in die Causa Fürstenberg involviert (vgl. seine Denkschrift zur Befreiung von Wilhelm Egon von Fürstenberg, I, 1 N. 318, S. 469–473). Für den in Nimwegen ab Ende 1676 stattfindenden Friedenskongress wurde von Ludwig XIV. bereits Ende November 1675 als Mitglied der französischen Gesandtschaft Jean-Antoine d'Avaux bestimmt. Es handelt sich hierbei um den Sohn des am 23. August 1673 verstorbenen *président à mortier*, er war zuvor von Mai 1672 bis November 1674 in Venedig und im Dezember 1675 als Gesandter in Brandenburg tätig. Dass Leibniz Kenntnis von der bereits erfolgten Abreise der französischen Delegation Richtung Nimwegen hatte — Leibniz nennt keine Namen —, belegt sein Brief an Melchior Friedrich von Schönborn von Anfang Januar 1676 (I, 1 N. 266, S. 397). Für die beiden Diplomaten Courtin und Barillon lässt sich erst ab Mai 1676 bzw. ab September 1677 wieder eine offizielle Akkreditierung nachweisen: jeweils für die französische Gesandtschaft in London. Die auf Bl. 73 r^o festgehaltene Notiz stimmt inhaltlich überein mit einer Aussage in der von den Herausgebern auf Sommer 1678 bis Anfang 1679 datierten Studie VI, 4 N. 25 (S. 74 Z. 9f.). N.³ dürfte vorher verfasst sein. Die Nennung der drei französischen Diplomaten weist auf das erste Halbjahr 1676 hin, eine spätere Entstehung ist aber nicht ausgeschlossen. — N.³² dürfte zur selben Zeit entstanden sein.

3₁. DATUM EST DETERMINATUM COGNITUM

Überlieferung: L Notiz: LH 35 I 9 Bl. 73. Zettel 6,35 × 3,4 cm. 5 Z. auf Bl. 73 r^o. Auf Bl. 73 v^o
Cc 2, Nr. 449: Messieurs d'Avaux[,] Courtin, Barillon. — Gedr.: COUTURAT, *Opusc. et
fragm.*, 1903, S. 545.
Cc 2, Nr. 448

Datum est determinatum cognitum. Ex data diametro circuli datur area quadrati inscripti, sed determinatur area circuli.

3₂. DETERMINATUM IDEM QUOD DABILE

Überlieferung: *L* Notiz: LH 4 V 10 Bl. 56 r° (v° leer). Zettel, rechte untere Ecke abgeschnitten, ca 4,4 × 8,5 cm. — Gedr.: COUTURAT, *Opusc. et fragm.*, 1903, S. 147.
Cc 2, Nr. 00

5 Determinatum idem quod dabile. Ita arcus aliquis positione datus est magnitudine determinatus seu dabilis. Etsi magnitudo ejus non sit cognita.

4. EXPRESSIO UNIUS LITERAE PER MULTAS

4. September 1674

Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 XII 1 Bl. 230. Ein beschnittenes Blatt ca 13,3 × 17,8 cm.

2 S. Bl. 230 bildete ursprünglich mit LH 35 XII 1 Bl. 14 (= VI, 3 N. 44) ein vollständiges

Bl. 2°. — Gedr.: LKK 2, 1976, S. 4f.

5

Cc 2, Nr. 740

Expressio unius literae per multas

4 Sept. 1674

Saepe magnitudinem cognitam incognitamve utile est exprimere certo quodam modo, per multas alias in ejus compositionem ingredientes; quod tum ad numeros, tum ad constructiones Geometricas inventorum jam valorum, et ad incognitas quorum valores non dantur, utiliores prae caeteris eligendas utile est. Omnis autem varietas oriri potest, ex combinatione literarum propositarum, inter se et cum forinsecus assumtis.

Exempli causa, datae sunt literae tres *a. b. y.* Et quaestio est de exprimenda aliqua magnitudine, cuius explicatio in nostro est arbitrio; tunc fateor infinitae sunt varietates, sed tamen re intra certos limites comprehensa varietates illae sunt numerabiles. V. g. *a. b. y. ab. ay. by. aby.* Singulae harum duci possunt in aliam quandam arbitrariam; nec refert multiplicando an dividendo. Sed postea ad arbitrarias accedentes veniemus. Nunc datis literis inhaereamus: Assurgant omnes ad quadratum: $a^2 + b^2 + y^2$. Hae inter se, et cum prioribus combinationibus jungi possunt. Et ita si ad altiora ascendatur. Hactenus incognita non nisi multiplicando dividendoque ex propositis literis formata est.

Jam jungi possunt inter se, et multiplicationes divisionibus misceri. Possunt jam de foris numeri literaeque accedere. Sed una litera numeros quoslibet comprehendet. Novae literae additio totidem producet varietates, quot sunt si plures essent ab initio propositae. Sufficeret ergo Tabulas texi, pro combinationibus possibilibus literarum, duarum: trium, quatuor. Et cuilibet combinationi resolutionem cuius est capax, pro varia literarum explicatione. Sed cum ista sint pene infinita, Methodi quaerendae sunt quibus ex

18 refert | addendo ändert Hrsg. | an *L* 20 possunt. (1) Primum inter se (*a*) addere (*b*) m (2)
Hactenus omni (3) Et *L* 21 dividendoqve (1) ex datis (2) ex *L* 22 misceri. (1) Deniqve prae (2)
Hactenus repetitiones praescidimus (3) possunt *L*

tot combinationibus utiles ab initio eligantur.

Breviter Tabulae analyticae formandaes essent procedentes ordine per omnes formulas, non considerando literarum qualitatem sed numerum, v. g. $\frac{a^2 - y^2}{a + y}$. Jam y . potest significare $2a$.

5 Ita inchoandum esset: a . ab . abc . $abcd$. $\frac{a}{e}$ $\frac{ab}{e}$ etc. $\frac{a}{ef}$ $\frac{ab}{ef}$ etc. Terminus, ut in numeratore pariter ac nominatore non sint ultra quatuor literae. Jam conjungantur inter se, ea lege, ne maximus numerus Terminorum nominatoris et terminorum denominatoris excedat 10. Ecce basin, jam in qualibet basi literis licet tribuere diversos valores; v. g. ab . licet annotare, si b . intelligatur a , fieri inde formulam a^2 cujus radix a . Nec obliviscendae 10 forte formulae in quibus ipse nominator vel numerator rursus continent fractiones. Sed quoniam istorum spes nulla, nec forte operae pretium est, superest formulas illustriores hac methodo disponi, ut si qua theorematata nova reperiantur, inseri possint suo loco.

5 $\frac{ab}{ef}$ etc. (1) Summus (2) Terminus L 7 maximus (1) literarum (2) numerus L 9 licet
 (1) facere b . (2) annotare, (a) aliquando b esse, (b) si b . intelligatur | a^2 ändert Hrsg.|, fieri L
 10 nominator (1) ac numerator compositi sunt (2) vel L 12 qva (1) denuo (2) theorematata L

5. DE CHARACTERUM IMPERFECTIONE


[September – Oktober 1674]

Überlieferung: L Konzept: LH 35 XIII 1 Bl. 122–123. 1 Bog. 4°. 7 Z. auf Bl. 123 r°. — Auf dem Rest des Bogens VII, 5 N. 10 u. VII, 6 N. 5.

Cc 2, Nr. 843

5

Datierungsgründe: Das Wasserzeichen des Papiers ist für Anfang September bis November 1674 belegt. N. 5 dürfte im selben Zeitraum entstanden sein wie VII, 5 N. 10 u. VII, 6 N. 5.



[Fig. 1]

Si a sectore $AMBA$, auferas Triangulum AMB , restat segmentum ABA . Id sane patet ex figura inspecta, sed non paret ex ipsis literis sive characteribus, unde patet eos esse imperfectos aliosque inveniendos. Eodem modo si a sectore duplicato auferas Rectangulum VMA , restabit segmentum duplicatum, necesse esset ista ex characteribus posse detegi, ne inspecta quidem figura.

10

6. GENERALIA GEOMETRICA

[Mai – Oktober] 1674

Überlieferung: *L* Konzept: LH 4 V 10 Bl. 47. 1 Bl. 4°. 2 S. Geringe Textverluste durch
 Tintenfraß sowie aufgrund einer Papierfalte. — Gedr.: 1. COUTURAT, *Opusc. et fragm.*,
 5 1903, S. 144–146; 2. (engl. Teilübers. nach 1.) WIENER, *Selections*, 1951, S. 5.
Cc 2, Nr. 866

Datierungsgründe: Im vorliegenden Stück referiert Leibniz seine Leistungen auf dem Gebiet der Geometrie — unter anderem eine von ihm wenige Tage zuvor gefundene Lösung eines Konstruktionsproblems der Dreieckslehre. Die ausformulierte Lösung ließ sich in seinen Handschriften bislang nicht finden,
 10 doch enthält das auf den 25. August 1674 datierte Stück VII, 1 N. 47₁₀ eine Skizze, die sich möglicherweise auf jenes Problem bezieht. Die Vermutung ist zulässig, dass er das Problem im August 1674 behandelt und kurz danach unser Stück verfasst hat. — Des weiteren erwähnt Leibniz eine Schrift zur *méthode des universels*, die er kurz zuvor geschrieben habe. Die drei hierfür in Frage kommenden Schriften (VII, 7 N. 10, 11 oder 14) sind auf Mai oder Juni, auf Juni respektive auf Mitte 1674 zu datieren. Unser Stück
 15 ist somit nicht vor Mai 1674 abgefasst worden. — Eine vergleichbare Darstellung seiner mathematischen Errungenschaften gibt Leibniz auch an anderer Stelle: Dem Stück III, 1 N. 38₂, das von den Herausgebern auf Oktober 1674 datiert wird, erteilt er nachträglich den einschlägigen Titel *Propria inventa analytico-geometrica*. In ihm beschränkt er sich aber im Bereich der Geometrie auf seine arithmetische Kreisquadratur und erwähnt die *méthode de l'universalité* nicht mehr, sondern führt statt dessen eine
 20 neue, analytische Methode zur Behandlung zahlentheoretischer Probleme an. Offenbar ist jenes Stück also nach unserem verfasst worden, womit dieses spätestens im Oktober 1674 entstanden ist. — Auch das auf September oder Oktober 1674 zu datierende Stück VII, 6 N. 7, in welchem Leibniz seine arithmetische Kreisquadratur darstellt, greift (wie III, 1 N. 38₂) einleitend die in unserem Stück vorgenommene Kategorisierung geometrischer Probleme auf und verwendet dabei recht ähnliche Formulierungen. Es baut
 25 hierbei offenkundig auf unserem Stück auf und ist also ebenfalls jünger als dieses.

1674. Paris

*Generalia Geometrica: de meis accessionibus
 et methodo universalitatis*

Les Theoremes n'estant que pour abréger ou diriger la solution des problèmes, puis-

26–29 1674. Paris | (1) imperfectum (2) Generalia ... universalitatis erg. | (a) Les problemes Geometriques (b) Les Theoremes *L* 29 ou diriger erg. *L* 29–13,1 puisque ... practique erg. *L*

que toute la theorie doit servir à la pratique. Il suffit d'estimer la varieté de la Geometrie, par celle des problemes. Les problemes de Geometrie, sont ou Rectilignes ou Curvilignes. Les Problemes rectilignes sont, dans les quels on ne demande ny suppose que la grandeur de quelques lignes droites ou espaces rectilignes. Les curvilignes supposent ou demandent la grandeur de quelque ligne courbe, ou de quelque espace curviligne. Les problemes des centres de Gravité et par consequent quantité de problemes de la Mechanique sont, de la derniere sorte. Ainsi on peut dire, qu'il y a comme deux E(sp)ees de la Geometrie, celle d'Apollonius, et celle d'Archimede; la premiere renouvellée par Viete et des Cartes; l'autre, par Galilei et Cavalieri.

Les problemes Rectilignes se reduisent à la Resolution de quelque $\langle E \rangle q(u)$ ation dont il faut tirer les racines, analytiquement par le calcul, ou Geometriquement par l'intersection des lieux; exactement, ou par approximation. Mais les Curvilignes ne sont pas encor sujets à l'analyse connue, e(t) si on les vouloit reduire à une equation, on la trouveroit de $\langle l \rangle$ 'infinitesieme degré.

Or $\langle a \rangle$ yant fait quelques remarques assez extraordinaires dans l'une aussi bien que dans l'autre espece de Geometrie, j'ay bien voulu en toucher icy quelques unes en peu de mots.

Dans la Geometrie des Rectilignes; j'ay trouvé enfin le moyen d'e
tirer les racines de toutes les Equations cubiques; c'est à dire

7 sorte. (1) On peut dire qve (2) de sorte qv (3) Ainsi L 8 d'Apollonius, (1) et l (2) qvi est des problemes Rectilignes, qvi se resolvent a la vérité par l'intersection (3) et celle L 8 f. des Cartes; (1) second par (2) l'autre L 10 Rectilignes se (1) resolvent (2) reduisent L 11 par le calcul erg. L 11 f. par ... lieux erg. L

7 deux Espes: Die hier getroffene Unterscheidung zwischen gerad- und krummlinigen geometrischen Problemen sowie ihre historische Einordnung nimmt Leibniz auch anderorts vor: Sie findet sich sowohl in seinen wohl im Oktober 1674 für Mariotte verfassten Ausführungen über seine mathematischen Entdeckungen (III, 1 N. 382 S. 139 f.) als auch in den einleitenden Bemerkungen eines wahrscheinlich zwischen dem 10. September und Ende Oktober 1674 entstandenen Stücks, welches die Bestimmung der Kreisfläche mit Hilfe einer unendlichen Reihe rationaler Zahlen darstellt (VII, 6 N. 7, S. 88 f.).

19 E q u a t i o n s c u b i c u e s : Gemeint ist womöglich die Schrift *De aequationum transformationibus cubicarum et quadrato-quadraticum* aus dem September 1674 (VII, 1 N. 127 S. 818 ff.). Auch in der Schrift *Schediasma de radicibus cubicis* von Oktober 1674 (VII, 1 N. 139) sowie in dem (allerdings unvollendeten und dann verworfenen) Konzept VII, 1 N. 133, das wohl auf den September 1674 zu datieren ist, beschäftigt sich Leibniz mit der Lösung kubischer Gleichungen.

de rendre toutes les Equations cubiques pures; en sorte que pour les resoudre il ne faut que tirer la racine cubique d'un solide connu. Scipio Ferreus a trouvé le premier des regles propres à tirer les racines de quelques especes des Equations cubiques, Cardan a publié sa methode. Et Viete aussi bien que Mons. des Cartes ont desesperé de pouvoir venir 5 <au> bout des autres. J'ay eu le bonheur d'y voir quelque jour. Et ce la estant on peut dire que la resolution de toutes les Equations cubiques ou quarrequarrées estachevée, et qu'on les peut construire toutes Geometriquement par l'invention de deux moyennes proportionnelles.

Je ne repete pas icy ce que je viens de dire dans un papier à part de la Méthode des universels ; qui nous abrege le calcul comprennant plusieurs cas soubs un seul, qui nous fait decouvrir des harmonies dans les figures et qui nous donne le moyen de les ranger en classes par des idees generales.

Touchant les lieux, j'ay observé quelques moyens extraordinaires d'obtenir des aequations *ad circulum* dans les problemes proposés, à fin d'en donner des constructions courtes et be(l)les, comme par exemple je donna[y] il y a quelques jours une construction

4 Et (1) Mons. Viete et (2) Viete $L = 6$ dire qve (1) l'Analytique les (2) la resolution $L = 7$ par (1) le moyen de (2) | la seule invention *nicht gestr.* | (3) l'invention $L = 10$ comprennant ... seul erg. $L = 12$ par | (1) qvelques notions (2) des idees | generales $L = 14$ les (1) proposés, (2) problemes proposés, $L = 15$ et (1) nettes (2) be(l)les, $L = 15-15,1$ jours (1) la construction du probleme: (2) une qvi n'est qve <de deux> mots (3) | une erg. Hrsg. | construction fort courte de ce probleme: (a) L'Hypothénuse d'un Triangle rectangle (b) un costé L

3 Equations cubiques: Vgl. G. CARDANO, *Artis magnae sive de regulis algebraicis liber unus*, 1545, Bl. 31 (G. CARDANO, *Opera IV*, S. 251.) 9 papier: Gemeint ist wahrscheinlich der Mitte 1674 entstandene *Essay de la méthode des universels* (VII, 7 N. 14), denn die Bezeichnung *méthode des universels* verwendet Leibniz nur dort. Üblicherweise spricht er dagegen von der *méthode de l'universalité*. So lautet auch der Titel der beiden grundlegenden, auf Mai oder Juni 1674 zu datierenden Schriften zu diesem Ansatz, in welchen er — deutlicher und im Wortlaut dem obigen ähnlicher als im *Essay* — sowohl die Verkürzung des Rechenaufwandes als auch die Aufdeckung von Harmonien mittels seiner neu ersonnenen Methode anspricht (vgl. etwa VII, 7 N. 10 S. 76 § 2 u. S. 79 § 7; N. 11 S. 114 f.). Die Bemerkung könnte sich also auch auf eines dieser beiden Konzeptpapiere beziehen.

fort courte de ce probleme: Un costé d'un Triangle estant donné et l'angle qui luy est opposé, trouver le $\langle T \rangle$ riangle en sorte que ses costés soyent en proportion harmonique.

Viete nous a donné la methode de tire $\langle r \rangle$ les racines des Aequations par des nombres approchans aux veritables; mais personne a ce que [je] scache a donné des proximatis G e o m e t r i q u e s ; $\langle j \rangle$ e croy pourtant d'y avoir reussi, et de pouvoir resoudre l $\langle e \rangle$ s problemes solides par approximations en n'employan $\langle t \rangle$ que des droites ou cercles; et cette methode a cela au dessus d $\langle e \rangle$ l'exegese numerique de Viete, qu'elle nous donne toutes les racines de l'Equation proposée tout à la fois; au lieu que l'exegese par nombres n'en donne qu'une.

Quant à la Geom $\langle e t \rangle$ rie des Curvilignes je pre $\langle t e n d \rangle$ s d'y avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Sans parler de la quadrature d'un segment oblique $\langle d \rangle$ e la Cycloide;

5

10

1f. et ... opposé erg. L 2 trouuer (1) les deux costés, de sorte qv (2) tous les coste (3) le $\langle T \rangle$ riangle L 2f. harmonique (1) et j'ay ob (2) Viete L 5 G e o m e t r i q u e s ; (1) j'en ay trouué (2) j'ay pourtant trouué (3) j'a (4) $\langle j \rangle$ e croy L 9f. qv'une (1) Dans la Geometrie des curvilignes (2) Qvant à L 11 de la (1) dimension (2) qvadrature L

1 probleme: Mit Konstruktionsproblemen der Dreieckslehre befasst sich Leibniz im Jahr 1674 mehrfach. In VII, 1 N. 11 etwa, das die Herausgeber auf August 1674 datieren, sind zwei Seiten und die Fläche eines gesuchten Dreiecks vorgegeben. In dem bislang auf Ende 1674 datierten Teilstück VII, 1 N. 14₁ sind dagegen die Basis des gesuchten Dreiecks und ein an der Basis anliegender Winkel sowie das Produkt der beiden anderen Seiten gegeben. Und im bislang auf Frühjahr 1675 datierten Teilstück VII, 1 N. 14₂ greift Leibniz das letztgenannte Problem erneut auf, ändert dann aber die Fragestellung und setzt nun nicht mehr einen an der Basis anliegenden, sondern den der Basis gegenüberliegenden Winkel als gegeben voraus. Dieses Problem kann er elegant konstruktiv lösen. Das in unserem Stück genannte Problem lässt sich auf eine sehr ähnliche, wenngleich geringfügig aufwendigere Weise lösen. Seine Bearbeitung ist nicht überliefert. Aus diesem Grund und auch, weil Leibniz von einer „construction fort courte“ spricht, liegt die Vermutung nahe, dass er tatsächlich die Konstruktion aus VII, 1 N. 14₂ meint. Womöglich geht er davon aus, dass diese Konstruktion ohne Änderung auch das hier genannte Problem löst. Weil VII, 1 N. 14₁ und 14₂ aus einer Reihe von Gründen neu datiert und nun in die erste Hälfte des Jahres 1674 gestellt werden, steht ihre Datierung dieser Interpretation nicht mehr entgegen. 3 methode: Vgl. FR. VIÈTE, *De emendatione aequationum*, 1615 (VO S. 82–161). 4 approximations Geometriques: Leibniz denkt hier womöglich an eine Verknüpfung seiner Lösung der soliden Probleme durch Kegelschnitte mit der Umformung der Kegelschnittgleichungen in eine Kreisgleichung; vgl. seine wohl im September 1674 verfasste Schrift *De aequationibus ad circulum inveniendis* (VII, 1 N. 130). 11 Cycloide: Den Segmentsatz an der Zykloide formuliert Leibniz erstmalig in III, 1, N. 29, zu datieren auf den Sommer 1674, auf S. 115. Vorarbeiten finden sich in VII, 4 N. 17, wohl aus dem späten Frühjahr 1673. Den Beweis liefert er in VII, 5 N. 31, zu datieren auf März bis Dezember 1675.

de la dimension de la courbe décrite par l'evolution du cercle (ayant trouvé que l'arc evolu est la moyenne proportionnelle entre le diametre et la courbe décrite);¹ de la dimension de la surface du solide parabolique fait par la parabole revolüe à l'entour de la touchante du sommet; j'ay observé deux methodes fort estendues, l'une de donner la dimension des figures superieures en supposant celle des inferieures; l'autre de reduire l'aire d'une figure à la somme d'une progression de nombres rationaux. Ce qui est traduire la difficulté de la Geometrie à l [bricht ab]

3 de la (1) super (2) surface (a) d'un solide Hyp (b) du solide L 4 l'une de (1) revoquer (2) donner L 4 dimension des (1) courbes (2) figures L 6 somme (1) de progressio (2) d'une progression L

1 l'evolution du cercle: Vgl. das wahrscheinlich im Frühjahr 1673 entstandene Konzept VII, 4 N. 101 S. 141 u. 143 sowie III, 1 N. 29 S. 116. 3 solide parabolique: Vgl. das wohl aus dem Sommer 1673 stammende Konzept *Triangulum characteristicum ellipsis* (VII, 4 N. 28, hier S. 509–515) sowie den auf den 3. Oktober 1674 datierten ersten Teil der Schrift *Schediasma de superficiebus conoecidum* (VII, 5 N. 6). 4 l'une de: Leibniz bezieht sich hier möglicherweise auf sein im August 1673 verfasstes, *Methodus tangentium inversae seu De functionibus* überschriebenes Konzept VII, 4 N. 40. 5 l'autre: Diese Bemerkung bezieht sich auf Transmutation und Reihenentwicklung; vgl. etwa das aus der ersten Hälfte des Jahres 1674 stammende Stück zur arithmetischen Kreisquadratur VII, 6 N. 4. 6 difficulté: In VII, 6 N. 7 S. 89 Z.2f. formuliert Leibniz den hier abgebrochenen Gedanken zu Ende: „... la difficulté des Curvilignes est transferée de la Geometrie à l'Arithmetique par les progressions.“

7. SUR LE CALCUL DES PARTIS

7. Januar 1676

Überlieferung: L Konzept: LH 35 III B 14 Bl. 5–8. 2 Bl. 4° u. 1 Bog. 2°. 7 S. Bl. 8 v° leer bis auf 1 Z. — Gedr.: 1. PARMENTIER, *L'estime*, 1995, S. 113–145; 2. (span. Übers.) LEIBNIZ, *Obras filosóficas y científicas*, Bd. 7 B, 2015, S. 669–687.

Cc 2, Nr. 1259

5

7. Janvier 1676

Le Chevalier de Meslé fut le premier qui donna l'ouverture pour le calcul des partis, que Messieurs Pascal et Huguens ont entrepris par apres. On croyoit que s'il y avoit par exemple trois partis à gagner, pour gagner l'argent, qui estoit mis, ou trois partis à gagner, pour gagner le jeu, et si l'un avoit gagné deux partis et l'autre un; que $\frac{2}{3}$ du jeu

10

11 partis; (1) qve $\frac{2}{3}$ du jeu luy appartenoint (2) et l'autre *L*

8 Meslé: Gemeint ist Antoine Gombaud (1607–1684), genannt Chevalier de Méré. 8 partis: Das *problème des partis*, zu deutsch Teilungsproblem, besteht darin, eine „gerechte“ Aufteilung des Einsatzes bei einem in mehreren Runden auszutragenden Spiel zu finden, wenn dieses abgebrochen werden muss, bevor einer der Spieler die für den Gesamtsieg vereinbarte Anzahl Runden gewonnen hat. Es gilt als klassisches Problem der Wahrscheinlichkeitstheorie. 9 Pascal: Nachdem Méré das Problem an Pascal herangetragen hat, erörtert dieser es 1654 in seinem Briefwechsel mit Fermat. Eine Abhandlung Pascals, die die Lösung des Problems präsentiert, wird nach seinem Tod abgedruckt: Bl. PASCAL, *Traité du triangle arithmétique*, 1665 [Marg.], Abhandlung III: *Usage du triangle arithmetique, pour determiner les partys qu'on doit faire entre deux Joueurs qui jouent en plusiers parties* (PO III, S. 478–498). Leibniz besitzt wohl schon seit 1672 ein Exemplar dieses Buches (vgl. N. 40) und bezieht sich hier offensichtlich auf diese Abhandlung. Ihre Ergebnisse hat er jedoch nicht zur Kenntnis genommen. Pascals Briefe an Fermat — der vom 29. Juli 1654 präsentiert seine eigene Problemlösung, der vom 24. August 1654 referiert jene Fermats — werden drei Jahre nach Entstehung des vorliegenden Stücks in P. de FERMAT, *Varia opera*, 1679 [Marg.], S. 179–188, veröffentlicht. Im Juni 1675 und wohl ab Januar 1676 kann Leibniz verschiedene Stücke aus Pascals Nachlass einsehen (vgl. N. 33 sowie III, 1 N. 53, 54 u. 74), gewinnt jedoch auch dabei keine nähere Kenntnis von der Behandlung des Problems durch Pascal und Fermat. 9 Huguens: Vgl. Chr. HUYGENS, *De ratiociniis in ludo aleae*, in: Fr. van SCHOOTEN, *Exercitationum mathematicarum*, 1657, S. 517–534, insbesondere prop. IV–VII.

appartenioient au premier. Mais il refusoit refusoit cela, par ce qu'il ne me faut qu'un parti pour gagner tout, et il ne me faut que la perte d'un, pour rendre tout égal, et pour

revenir au premier estat, donc $\frac{1}{2}$ ou $\frac{2}{4}$ m'appartenant au commencement, et en cas de

perte du 4^{me} jeu; et le tout, ou $\frac{4}{4}$ m'appartenant en cas du gain du 4^{me} jeu, ou du 3^{me}

5 parti; il est donc manifeste qu'avant que de le gagner ou perdre j'ay $\frac{3}{4}$ de l'argent mis

sur la table. Car ce jeu me peut faire gagner $\frac{2}{4}$, et me peut faire perdre $\frac{2}{4}$, dont il vaut

$\frac{1}{4}$ ou la moitié de $\frac{2}{4}$. Donc avant ce jeu j'avois $\frac{3}{4}$.

Le chevalier de Melé gentilhomme du Poictou, grand joueur, et homme d'esprit.

Cela a lieu au piquet où l'on joue des partis liez, et qu'il faut gagner 3 fois par exemple

10 ou 4 fois, pour amener l'argent. NB. Si on joue à trois partis, il faut nécessairement qu'un gagne en 5 jeux ou partis. Il peut arriver que l'un gagne trois partis de suite; ||| item

1 f. faut qv'un (1) jeu pour (2) parti L 4 du 4^{me} (1) parti (2) jeu L 6 gagner (1) $\frac{1}{4}$, (2) $\frac{2}{4}$,

et ... il (a) faut (b) vaut L 7 j'avois (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{3}{4}$ L 10 joue (1) trois jeux (2) à trois partis L

11-19,1 suite; (1) item qv'il en gagne (2) ||| item qv'il gagne (a) •||| vel |•||| vel ||•| vel (b)
||•| (aa) vel |•||| vel •||| (bb) ou L

1 appartenioient: Eine solche Aufteilung des Gewinns im Verhältnis der jeweils gewonnenen einzelnen Spielrunden schlägt L. PACIOLI, *Summa de arithmeticā, geometriā, proportioni, et proportionalita*, 1494, Bl. 197 r^o vor. Es handelt sich hierbei um die erste Behandlung des Problems durch einen namentlich bekannten Autor in der Literatur.

1 refusoit: Nicht erst Méré weist Paciolis Teilungsregel zurück; bereits G. CARDANO, *Practica arithmeticē*, 1539, cap. 68, § 5 und N. TARTAGLIA, *La prima parte del general trattato di numeri, et misure*, 1556, lib. XVI, Bl. 265, § 206 kritisieren sie und stellen eigene Teilungsregeln auf.

4 parti: Die Verwendung der Begriffe *jeu* und *parti* ist anfangs inkonsistent; *jeu* steht meist für das gesamte Spiel, hier aber für eine einzelne Runde, *parti* meint in der Regel eine Spielrunde, hier aber eine gewonnene Runde bzw. einen Gewinnpunkt (später auch als *coup* oder *point* bezeichnet).

5 manifeste: Der hier am Beispiel referierte Ansatz zur Lösung des Teilungsproblems stimmt mit jenem von Chr. HUYGENS, *a. a. O.*, S. 525, prop. IV überein.

6 dont: Für die im modernen Französisch *dont* geschriebene Konjunktion verwendet Leibniz in diesem Stück, ohne einer ersichtlichen Regel zu folgen, öfters auch die Schreibweise *dont* (die an anderen Stellen aber auch für das gleichgeschriebene Pronomen steht).

9 piquet: Dies ist ein im 17. Jahrhundert populäres Kartenspiel französischen oder spanischen Ursprungs für zwei Personen.

qu'il gagne || .| ou | .|| ou .|||. Et s'il gagne en 5 jeux il peut gagner ainsi: ..||| | ..|| | | ..| .|||. Ecce modos omnes quibus vinci potest. Et notandum hoc combinationis plane singularis genus. Nunc ut ex meis rem principiis examinem, je mets pour asseuré, qu'en gagnant un parti je fais un tiers de ce qu'il faut faire, pour gagner l'autre moitié de l'argent qui est mise au jeu; car une moitié m'appartient déjà. Donc l'argent mis au jeu estant: a , et le nombre des partis qu'il faut gagner pour amener tout l'argent estant p , 1 parti vaudra $\frac{a}{2p}$ et 2 partis

gagnez vaudront: $\frac{a}{p}$. Les quels joints à $\frac{a}{2}$ j'aurois alors $\frac{a}{2} + \frac{a}{p}$ de tout l'argent. Mais mon

adversaire gagne le 3^{me} parti, c'est à dire, il gagne par là: $\frac{a}{2p}$, et il a ainsi $\frac{a}{2} + \frac{a}{2p}$. Donc

mon droit sur l'argent tout entier est au sien, comme $\frac{a}{2} + \frac{a}{p}$ est à $\frac{a}{2} + \frac{a}{2p}$ ou comme

$\frac{ap+2a}{2p}$ est à $\frac{ap+a}{2p}$, ou comme $p+2$ est à $p+1$. Par consequent il faut diviser a en

deux parties, dont l'une soit à l'autre comme $p+2$ est à $p+1$, et p estant $\square 3$, il faut a diviser en deux parties, dont l'une soit à l'autre comme 5 à 4. C'est à dire divisant toute

5 gagner (1) la moit (2) l'autre L 6 estant: (1) ⟨b⟩ argent ayant gagné un pa (2) a L

8 vaudront: (1) $\frac{a}{4p}$ (2) $\frac{a}{p}$ L

6 estant: Die Bezeichnung a für die Gewinnsumme findet sich bereits bei Huygens, und auch p tritt dort in ähnlicher Bedeutung auf wie hier bei Leibniz; vgl. Chr. HUYGENS, a. a. O., S. 523. 9 gagne: Der hier verfolgte Ansatz widerspricht der Voraussetzung, dass die Summe der Gewinne beider Spieler konstant a ist. Dies belastet die weitere Überlegung und wirkt sich insbesondere in S. 20 Z. 4 f. aus.

12 $p+2$ est à $p+1$: Eine Regel für die Aufteilung des Gewinns kann als hinreichend „fair“ gelten, wenn sie mindestens drei Bedingungen erfüllt: Erstens sollte sie bei Gleichstand zum Zeitpunkt des Spielabbruchs beiden Spielern den gleichen Anteil zusprechen; zweitens sollte sie demjenigen Spieler, der als erster die für den Gesamtsieg geforderten Runden gewonnen hat, den gesamten Gewinn zusprechen; und drittens sollte sie sicherstellen, dass jede zusätzlich gewonnene Runde den Anteil am Gewinn vergrößert. Die beiden ersten Bedingungen sollten sich dabei als Randwerte aus der Regel ergeben und nicht lediglich *per definitionem* gelten. Man kann die „gerechte“ Aufteilung auch noch strenger definieren, indem man verlangt, dass diese genau im Verhältnis der Gewinnwahrscheinlichkeiten zu erfolgen hat. Unausgesprochen verfolgt Leibniz das Ziel, eben hierfür eine Regel zu finden. Die hier untersuchte Aufteilung des Gewinns im Verhältnis $(p+g) : (p+f)$ bei einem Spielstand von $g:f$ im Augenblick des Abbruchs erfüllt allerdings bereits die zweite der Mindestbedingungen nicht: Nach dieser Regel stünde dem Verlierer stets mindestens ein Drittel des Gewinns zu.

la somme en 9 parties celuy qui a gagné 2 partis aura $\frac{5a}{9}$, et celuy qui n'a gagné qu'un

aura $\frac{4a}{9}$. Mais nous verrons incontinent si ce calcul est juste car si celuy qui a gagné 2

partis, gagne encor un, c'est à dire $\frac{a}{2p}$, c'est à dire $\frac{a}{6}$, p estant $\sqcap 3$, il aura a tout entier,

mais $\frac{5a}{9} + \frac{a}{6}$ ne fait pas a . De meme s'il perdoit un, il n'auroit que $\frac{a}{2}$, or $\frac{5a}{9} - \frac{a}{6}$ ne fait

5 pas $\frac{a}{2}$. C'est pourquoy il y a du sophisme dans nostre calcul.

Et il faut un tout autre principe d'analyse. Le principe general est, que deux joueurs ont un droit égal sur une somme qui est au jeu, lors qu'il est aussi aisè à l'un qu'à l'autre de gagner ou de perdre. Donc au commencement du jeu tout est commun. C'est à dire si la société venoit à se rompre chacun en auroit la moitié. De plus si un des joueurs a tant

10 de partis, sur son adversaire, que le nombre des partis qu'il luy faut pour gagner tout est égal au nombre de ceux qu'il doit perdre pour revenir à l'égalité; il aura gagné la moitié de l'autre moitié outre la sienne. Ainsi supposé qu'il faille 5 partis pour amener l'argent. J'en ay gagné 3, et mon adversaire 1. Si j'en gagne encor deux, j'amene l'argent, si j'en

perds deux nous revenons à l'égalité, donc en ce cas ils m'appartiennent $\frac{3}{4}$ de l'argent.

15 On voit par là que ce n'est pas la même chose, que j'aye gagné 3 partis et l'autre 1, et que j'aye gagné 2 partys et l'autre rien. Car au premier cas, il m'appartient $\frac{3}{4}$, au second cas, il me faut 3 partis pour gagner, et il ne faut que perdre deux pour revenir

2 f. qvi (1) gagne (2) a gagné ... encor | un *gestr. L, erg. Hrsg.* |, c'est $L - 6$ principe (1) du jeu (2) general $L - 10$ adversaire, qve (1) ce qv'il (2) le nombre $L - 10$ f. gagner | tout *erg.* | est égal (1) à ce qvi luy faut (a) pour (b) de perte pour (2) au nombre $L - 13$ deus, (1) je gagne (2) j'amene L

11 gagné: Auch in der Verallgemeinerung — einem Spieler fehlt noch eine bestimmte Zahl an Punkten zum Gesamtsieg und sein Vorsprung beträgt ebensoviele Punkte — ist der direkte Weg zum Gesamtsieg genauso wahrscheinlich wie der direkte Weg zum Gleichstand. Doch gibt es nun eine Anzahl weiterer Spielverläufe, die hier nicht berücksichtigt werden. Das Verhältnis der Gewinnwahrscheinlichkeiten der beiden Spieler kann so nicht korrekt bestimmt werden. Auch im weiteren beschränkt sich Leibniz auf die Betrachtung spezieller Konstellationen, bis er auf S. 34 den Blick dann auf alle Spielverläufe ausweitet.

au premier estat d'egalité. Donc l'apparence de gagner $\frac{a}{2}$ est à l'apparence de gagner 0, comme 2 à 3. Et il faut voir si je puis dire, que j'ay gagné autant de $\frac{1}{5}$ mes de $\frac{a}{2}$, qu'il y a d'apparences de gagner, sçavoir 2. Il faut que mon adversaire gagne 5 partis pour gagner $\frac{a}{2}$. Et il faut gagner 2 pour venir à l'égalité. Ce qui est paradoxe. Et on ne pourra pas dire ici que l'apparence de gagner est à l'apparence de l'égalité, comme 2 à 5, donc je n'ose pas parler comme cela, non plus dans la personne de celuy qui a gagné: car il faut de maniere de parler qui convienne à tous deux. Il est bien vray ici que l'un ayant gagné autant de partis, que l'autre tout est égal; mais il n'est pas vray, qu'adjoutant autant de

5

3 2. Il faut (1) 5 à mon adversaire, (a) dont (b) donc à que (2) que mon L (don) (2) et il ne faut parler comme cela; et même il faut considerer (3) Et on L cela, (1) donc (2) non plus L

4 paradoxe, (1)
6 cela, (1) donc

4,14 m'appartiennent: Wenn sich die Aufteilung des Gewinns am Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten bemessen soll, mit denen die beiden Spieler das gesamte Spiel gewinnen, ist zunächst danach zu fragen, ob man ein exaktes Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten angeben kann, mit welchen sie eine einzelne Runde für sich entscheiden. Bei Spielen wie etwa dem Münzwurf kann dieses Verhältnis mit 1:1 angesetzt werden. Bei einem Spielstand von 3:1 und fünf Gewinnrunden ist der Einsatz dann im Verhältnis 13:3 aufzuteilen, wie sich mit den Ansätzen von Pascal oder Fermat leicht berechnen lässt und wie es bei Chr. HUYGENS, *a. a. O.*, S. 526, prop. VII nachzulesen ist. Auch Bl. PASCAL, *a. a. O.*, S. III, 7 (= *PO* III, S. 488 f.) behandelt dieses Beispiel. Bei dem hier betrachteten Kartenspiel Piquet haben die beiden Spieler jedoch im Allgemeinen nicht die gleiche Chance, eine Runde zu gewinnen, so dass sich die Frage stellt, wie ihre jeweiligen Spielstärken zu bemessen sind. Falls man davon ausgeht, dass der Zwischenstand von 3:1 die unterschiedlichen Spielstärken abbildet und man daher auch das Verhältnis der Erfolgswahrscheinlichkeiten in einer einzelnen Runde so ansetzt, müsste eine Verteilung des Gewinns im Verhältnis von 63:1 erfolgen. In der Regel sind die genauen Spielstärken aber unbekannt. Das Problem setzt in seiner überlieferten Form stillschweigend gleiche Spielstärken und Erfolgswahrscheinlichkeiten in jeder Einzelrunde voraus, und Leibniz folgt dieser Vorgabe.

1 apparence: Der methodische Ansatz zur mathematischen Behandlung von Wahrscheinlichkeiten besteht im vorliegenden Stück darin, das Verhältnis zweier *apparences* zueinander zu betrachten. Die *apparence* — die Häufigkeit, mit der ein ungewisses Ereignis eintritt — wird also nicht als für sich stehende Größe betrachtet, sondern sie ist stets in eine Relation zu setzen. Dies gilt in diesem Stück gleichermaßen auch für die als *facilité*, *difficulté* oder *probabilité* bezeichneten Größen.

4 paradoxe: Für eine analoge Betrachtung aus der Sicht des zurückliegenden Spielers ist die Zahl an Runden, die dieser gewinnen muss, damit wieder Gleichstand herrscht (hier 2), in Relation zur Zahl der Runden, die er verlieren muss, damit er das Gesamtspiel verliert (hier 3), zu setzen. Dementsprechend wäre im vorliegenden Beispiel sein eigener Anteil im Verhältnis von 3:2 aufzuteilen. Der Ansatz führt also, ob man nun den führenden oder den zurückliegenden Spieler betrachtet, tatsächlich zum gleichen Ergebnis.

partis à l'un qu'à l'autre tout demeure égal, car celuy qui est déjà le plus avancé gagnera en ce cas. C'est pourquoi un jeu étant disputé il y aura bien de la différence entre dire que tous deux ont gagné, et que pas un n'a gagné. On ne sauroit bien démontrer cela sans des definitions exactes. Cependant je crois que nous avons la règle. Le nombre des 5 partis nécessaires est p , le nombre des partis gagnés g . Donc de ceux qui restent à gagner le nombre est $p - g$. Donc si vous perdez g , vous reviendrez à l'égalité, si vous gagnez $p - g$, vous amenez l'argent. Or l'apparence de gagner est à l'apparence de perdre en raison reciproque du nombre des jeux qu'il faut gagner, au nombre des jeux qu'il faut perdre, ou comme g à $p - g$; et par consequent l'apparence d'amener l'argent, est à 10 l'apparence de revenir à l'égalité, comme g à $p - g$. Mais comme est l'apparence d'amener l'argent à l'apparence de revenir à l'égalité de même est la partie de l'argent de mon adversaire sur la quelle un droit m'est acquis, à la partie de son argent qui reste dans la communauté. Donc si le jeu se doit séparer en cet état, j'aurois préférablement de l'argent de mon adversaire une partie qui sera à l'autre partie comme g est à $p - g$. Le 15 reste sera divisé également. Et par consequent l'argent est a , la moitié de mon adversaire est $\frac{a}{2}$ et $\frac{pa}{2p} = \frac{ga + pa - ga}{2p}$. Ainsi j'auray en cas de séparation;

$$\frac{a}{2} + \frac{pa - ga}{4p} + \frac{ga}{2p} = \frac{3ap + ga}{4p}$$

Avant que de venir au théorème il faut aussi comprendre dans le calcul le cas où tous deux ont gagné quelque parti; l'un en a gagné g , l'autre en a gagné f , et je suppose f 20 moindre que g . Il faut à G , c'est à dire celuy qui a gagné g , le nombre $p - g$; pour amener

5 partis (1) est p. le nombre des partis (2) qv'il fa (3) nécessaires L 6 donc erg. $L = 7$ $p - g$. vous (1) gagnez (2) amenez l'argent. (a) donc (b) or $L = 7$ perdre (1), comme le nombre (2) en raison L 9 comme (1) $p - g$ (2) p (3) g à $p - g$; et par consequent (a) le gain sur la moitié de vostre *{nom}* (b) l'apparence $L = 11$ même est (1) le gain (2) le droit acquis sur l'argent de mon adversaire, un droit (3) la partie $L = 17$ f. $\frac{3ap + ga}{4p}$ (1) Donc nous pourrons faire un théorème. Deux joueurs (a) ayant mis (b) estant tombés d'accord que celuy (2) Avant $L = 18$ aussi (1) toucher (2) comprendre L 20 gagné | f, ändert Hrsg. | le nombre L

15 divisé: Der hier verfolgte Ansatz verlangt, den Einsatz des zurückliegenden Spielers im angegebenen Verhältnis zwischen den beiden Spielern aufzuteilen. Demzufolge bleibt weder unverteiltes Geld im gemeinsamen Besitz übrig, noch ist jener Teil des Einsatzes, der dem zurückliegenden Spieler verbleibt, hälftig auf beide Spieler zu verteilen. Leibniz entwickelt seinen Gedanken konsequent weiter, bis er in S. 24 Z. 7 diese Inkonsistenz erkennt.

l'argent; et il faut que l'autre F gagne $g - f$ pour venir à l'égalité donc l'apparence de gagner sera à l'apparence d'égalité comme $g - f$ est à $p - g$. Par consequent il faut diviser $\frac{a}{2}$ en deux parties, dont l'une soit à l'autre comme $g - f$ est à $p - g$. Pour cela: $\frac{a}{2} \sqcap$

$\frac{ga - fa + pa - ga}{2g - 2f + 2p - 2g} \sqcap \frac{pa - ga}{2p - 2f}$. Donc ces deux parties seront: $\frac{ga - fa}{2p - 2f}$, et $\frac{pa - ga}{2p - 2f}$. Donc

$\frac{ga - fa}{2p - 2f}$ appartient preferablement à celuy qui a gagné g , et du reste il luy appartient $\frac{a}{2}$, sa moitié, et la moitié du reste de la moitié de l'adversaire $\frac{pa - ga}{4p - 4f}$, c'est à dire

$\frac{a}{2} + \frac{pa - ga}{4p - 4f} \sqcap \frac{3pa - 2fa - ga}{4p - 4f}$, et à luy preferablement \wp . Donc joignant $\odot + \wp$, il

proviendra $\frac{3pa + ga - 4fa}{4p - 4f}$, qui appartient à G , et à F , il n'appartient que $\frac{pa - ga}{4p - 4f}$.

Donc joignant \wp et $\frac{pa - ga}{4p - 4f}$, nous aurons $\frac{4pa + ga - 4fa}{4p - 4f} \sqcap a$.

Donc nous pourrons faire un theoreme: Deux joueurs estant tombés d'accord que celuy qui auroit fait le premier un certain nombre de jeux (points), (p) ameneroit la somme d'argent mise au jeu (a) et le jeu venant à estre rompu legitimement lors que celuy qui a fait le plus de points n'en a fait qu'un nombre moindre que celuy qu'on demande (p) sçavoir (g) et celuy qui en a fait le moins en a (f). Il s'agit de sçavoir comment il faut faire les partis, c'est à dire comment il faut partager la somme a , entre ces deux joueurs, au sortir de ce jeu imparfait? Je dis que la somme a , doit estre partagée

1 et (1) il faut à celuy qvi a (2) il faut L 7 $\frac{3pa - 2fa - ga}{4p - 4f}$, \odot (1) celu (2) ce qvi appartient aussi à son adversaire, (3) et à luy L 7 preferablement (1) $\frac{ga - fa}{2p - 2f}$ (2) \wp . donc L 11 jeux | (points) *erg.* |, (p) (1) ga (2) gagneroit (3) ameneroit L 12 f. lors qve (1) l'*'un en* a f (2) celuy L 14 f. sçavoir (1) combien il faut faire les partis, c'est à dire combien il faut *'avoir* (2) comment L 16 Je dis (1) qve celuy qvi a fait (g) points *'am* (2) qve la somme L

en deux: $\frac{3p + g - 4f}{4p - 4f} a$, et $\frac{p - g}{4p - 4f} a$ et que la premiere $\frac{\wp}{\gamma}$ doit estre donnée à celuy qui aura fait (g) points, l'autre $\frac{\gamma}{\wp}$ à celuy qui n'en aura fait que (f).

Il est premierement manifeste que g et f estant égaux, ou tous deux égaux à rien, tout doit estre partagé également. Mais nostre calcul ne comprend pas ce cas, donc il faut qu'il y ait de la faute là dedans, dont je voys la raison à present. Je ne luy donne pas seulement préférablement sur son adversaire $\frac{ga - fa}{2p - 2f}$, qui est \square à 0, lors que $g \square f$ mais je luy donne encor la moitié de $\frac{pa - ga}{2p - 2f}$. Donc il gagne en ce cas cette somme, et néanmoins il ne doit rien gagner, donc la règle est fautive, et il faut retrancher cette moitié. L'erreur est venue de ce que j'avois pris l'argent mis au jeu comme une somme dont le reste doit estre divisé, lors que celuy qui a gagné le plus de points a pris son préciput. Ce que les loix de cette société faite pour le jeu, ne portent pas. Je n'y vois pas même de la société; et il n'est point nécessaire de considerer l'argent mis sur la table; il faut seulement considerer que celuy qui gagne le plus de points, a obligé l'autre à quelque chose, et a un droit acquis sur quelque chose, qu'il faut déterminer, et quand les points sont égaux l'apparence de gagner toute est égale de part et d'autre, et l'obligation est compensée. Donc il faut dire: comme l'apparence de gagner la somme à laquelle mon adversaire s'oblige en cas de perte, est à l'apparence de revenir à l'égalité, ou à l'apparence de rien gagner, de même doit estre le gain au sortir du jeu imparfait, à ce que l'adversaire retient. Or l'apparence de gagner est à l'apparence de revenir à l'égalité en raison reciproque des points à faire. C'est à dire l'apparence de faire $p - g$ points; e[st] à l'apparence de perdre $g - f$ points comme $\frac{1}{p - g}$ points à $\frac{1}{g - f}$ points, parce que l'apparence de les faire est d'autant moindre, que le nombre à faire est plus grand. Donc l'apparence de gagner est à l'apparence de rien gagner comme $g - f$ est à $p - g$. Donc le

2 f. fait qve (f) (1) Axiomes: lors qve l'apparence de gagner de l'un et de l'autre costé est commune, le droit est égal Le droit du parti, est (a) qve chacun (b) qv'un joueur (2) Le fondement doit estre, qve l'argent doit estre divisé en deux parties, (3) Le fondement (a) doit (b) est, (4) il est $L - 3f$ rien, (1) le droit (2) tout $L - 9$ moitié. (1) | Et nicht gestr. | généralement | la nicht gestr. | (2) L'erreur $L - 10$ plus de (1) partis a (2) points $L - 15$ toute erg. $L - 18$ estre le (1) parti (2) partis au sortir du jeu imparfait (3) gain $L - 20$ points (1) faits (2) à faire c'est à dire (a) est en raison (b) l'apparence $L - 23$ l'apparence de (1) revenir (2) rien L

gain doit estre au residu, comme $g - f$ à $p - g$. C'est à dire la somme que mon adversaire a mis au jeu doit estre divisé en deux parties, dont l'une est [à] l'autre comme $g - f$ à $p - g$, et mon adversaire est obligé de me donner la partie qui est comme $g - f$, le reste luy demeure. Mais j'avoue que cela a besoin d'estre demontré rigoureusement. De plus la difficulté s'augmentera ainsi, posons que les obligations des joueurs soyent inégales; c'est à dire que l'un s'oblige à perdre plus qu'il ne s'assuroit gagner. Il est manifeste qu'à lors en cas d'égalité; il n'y a point d'obligation mais en cas de gain je gagne la somme que mon adversaire a mis, quoique plus grande que la mienne. Donc si j'ay gagné quelques points et mon adversaire aussi, il faut calculer tout de même sur la somme que mon adversaire a mis. Je ne voy pourtant pas encor la chose assez clairement, par ce que si je le voyois dans la dernière simplicité, je devois estimer combien un point gagné m'avance en nostre cas et combien un point perdu avance mon adversaire. Il faut voir si on peut expliquer la chose ainsi. Je gagne un certain nombre de points et en raison de ces points j'ay un droit acquis sur l'argent de mon adversaire; je conte comme si mon adversaire n'avoit rien gagné; car ce qu'il aura gagné sera conté apart sur mon argent; et nous pouvons faire comme si à chaque coup nous payions autant que chacun a de droit acquis sur son adversaire, et nous verrions au bout du conte, le quel auroit gagné. Je gagne donc g points, il me restent à gagner $p - g$ points, l'apparence de les gagner est en raison reciproque des points à gagner car la difficulté croist avec le nombre, dont la facilité décroist avec le nombre (+ il faut pourtant demontrer ceci rigoureusement +). rigoureusement +). Mais

5
10
15
20

2 estre (1) à la somme (2) divisé L 5 posons que (1) l'un s'oblige (2) les obligations L
 6f. manifeste qu' (1) en ce cas tout révenant à rien (2) à lors ... d'égalité; (a) chacun reprend (b) il
 n'y a L 13 de | ses ändert Hrsg. | points L 14f. conte (1) si mon adversaire n'avoit rien gagné;
 car si (2) comme L 20 rigoureusement +). (1) donc l'apparence de gagner est à g (2) (-) (3) Au
 contraire (4) Mais L

2 divisé: Die hier aufgestellte Teilungsregel für einen Spielstand von $g:f$ im Augenblick des Abbruchs lässt sich auch mit der Formel $(p+g-2f):(p-g)$ wiedergeben. Diese erste Leibniz'sche Teilungsregel erfüllt die drei genannten Mindestanforderungen an eine „faire“ Aufteilung. 15 conté apart: Die folgenden Überlegungen betrachten die von einem Spieler gewonnene Anzahl an Runden separat und unabhängig von der Anzahl an Runden, die sein Gegner gewonnen hat. Leibniz erwägt dabei verschiedene Vorschriften, dieser Anzahl jeweils einen Anteil des Gewinns zuzuordnen. Schreibt man die Gewinnanteile hintereinander auf, bilden sie, je nach Vorschrift, eine umgedrehte harmonische Folge, eine arithmetische oder eine geometrische Reihe. Allerdings erfüllen Teilungsregeln, die auf einer solchen Getrenntbetrachtung basieren, die zweite Mindestbedingung nicht, da sie dem Verlierer des gesamten Spiels regelmäßig einen Teil des Einsatzes seines Gegners zusprechen.

cela ne me dit pas encor combien j'auray. Car il faut deux termes pour faire cette raison reciproque, et d'où prendrons nous l'autre terme; si j'avois gagné $g + 1$ points il reste $p - g - 1$; l'apparence de gagner tout au premier cas, est à l'apparence de gagner tout au second cas comme $\frac{1}{p - g}$ est à $\frac{1}{p - g - 1}$, ou comme $p - g - 1$ à $p - g$. Et enfin si 5 j'avois gagné tous les points quasi comme si le nombre des points gagnez estoit $g + \beta$, et la difference entre p et $g + \beta$ quasi nulle, l'apparence de gagner tout en cas des points g gagnez est à l'apparence de gagner tout, ou d'amener mon argent, en cas des points $g + \beta$ gagnez, comme $p - g$ est à $p - g - \beta$; c'est à dire si $p - g - \beta \sqcap 0$, l'apparence 10 de gagner en cas de tous les points gagnez, sera à l'apparence de gagner tout en cas de quelques points gagnez, comme quelque chose à rien, ce qu*(i)* est inepte. C'est pourquoi il y a encor du manquement la dedans, et comme la chose est tres considerable, il est important de l'examiner à fonds.

11 *Am unteren Seitenrand:* Voyez 7 Janvier 1676 partie II^{de}

1 j'auray. (1) Car l'apparence de gagner $p - g$ est (2) Car L 2f. il reste $p - g - 1$ erg. L
 4 comme (1) $\frac{1}{p - g - 1}$ est à $\frac{1}{p + 1}$ (2) $\frac{1}{p - g} L$ 5 comme si (1) $p - g - 1$ (2) le nombre L
 6 tout erg. L 8 $p - g - \beta$; (1) donc (2) c'est ... $\sqcap 0$. (a) comme (b) l'apparence L

25,19 difficulté: Bei *facilité* und *difficulté* handelt es sich um zwei weitere Schlüsselbegriffe des Stückes. Leibniz definiert sie jedoch nicht explizit, sondern arbeitet mit einem impliziten Verständnis, das er für evident hält. Diesem zufolge verhält sich die *difficulté*, r Runden zu gewinnen, zu der *difficulté*, s Runden zu gewinnen, wie $r:s$, und das Verhältnis der entsprechenden *facilités* zueinander beträgt $\frac{1}{r} : \frac{1}{s}$ bzw. $s:r$ (vgl. Z. 2–4, S. 30 Z. 9 f. u. S. 38 Z. 14 f.). In S. 27 Z. 10 führt Leibniz zudem den Begriff *des-apparence* als Synonym für *difficulté* ein, und in S. 30 Z. 9 f. gebraucht Leibniz *facilité* und *apparence* als Synonyme. Meist verwendet er *apparence* im vorliegenden Stück aber im oben genannten, weiter gefassten Sinn. 4 $p - g - 1$ à $p - g$: Diese Aussage ergibt sich aus dem Konzept der *facilité*. Das Verhältnis zweier Wahrscheinlichkeiten zueinander wird durch sie im Allgemeinen jedoch nicht zutreffend beschrieben. Notiert man die *facilités* hintereinander, erhält man eine Reihe, die einer umgedrehten harmonischen Folge sehr ähnelt. Die Glieder dieser Reihe geben die relativen Gewinnanteile, die dem Spieler im Abhängigkeit vom Punktestand zugesprochen werden, wieder. Der Sieg in einer Runde führt hierbei zu einem jeweils größeren Zuwachs als ein Sieg in der vorangehenden Runde. Allerdings wird dem Spieler bereits ein Gewinnanteil zugesprochen, bevor er überhaupt eine Runde gewonnen hat (vgl. auch S. 30 Z. 14–16). Problematisch ist zudem, wie Leibniz im folgenden bemängelt, die Zuteilung für den Fall $g = p$.

7 Janvier 1676.

P a r t i e I I^{de}

Il ne faut donc pas dire que les apparences de gagner sont en raison reciproque des points qui restent à gagner pour amener l'argent, car si cela estoit, l'apparence de gagner, et par consequent le droit acquis sur l'argent de mon adversaire lors que j'ay tous les points qu'il faut, seroit à l'apparence de gagner, lors que j'ay tous les points horsmis 3, comme 3 à 0. Et par consequent celuy qui a tous les points prenant tout ce que son adversaire a mis au jeu, celuy qui auroit tous les points horsmis 3, n'obtiendroit rien. Donc il ne faut pas faire les apparences en raisons reciproques des points à faire. Mais plustost les des-apparences ou les difficultez, en raisons directes des points qui restent à faire. Et les des-apparences sont proportionnelles à ce qui reste de droit à mon adversaire, sur son argent. Et les points qu'il a à faire, sont la des-apparence qu'il y a qu'il conserve son argent, et par consequent elles sont proportionnelles au droit qu'il a perdu. Donc: ayant gagné (g) points, et ayant à gagner $p - g$ points, il ne faut que dire que l'argent de mon adversaire doit estre partagé en 2 parties dont l'une est à l'autre comme g à $p - g$, et la partie comme g m'appartiendra. Jusques icy j'ay supposé que mon adversaire n'ait rien gagné. Ainsi supposons que j'aye gagnez g points et que j'en doive gagner $5p$ pour

5

10

15

9 il | ne erg. Hrsg. | faut (1) dire qve (2) pas faire L 11 proportionnelles (1) aux (2) non pas au (3) à ce qvi L 12 argent. (1) Dont ayant fait (g) points (2) Et les L 14 gagné (1) p (2) (g) points L 17–28,4 gagné. (1) Apresent contons ce qv (2) Ainsi ... gagnez | 3 ändert Hrsg. | points et qve j'en (a) faille (b) doiuee ... du party (aa) gagnant le (bb) et qv'il ait mis (aaa) 5 (bbb) 10a, je gagne (aaaa) 3g, donc son argent doit estre divisé en 2 parties 3g. et (aaaaaa) 5g (bbbbbb) $5p - 3g$ (aaaaaaaa) et j'aurois $\frac{3ga}{5p - 3g}$. et il luy resteront (bbbbbb) Sçavoir a n $\frac{3ga + 5p - 3ga}{5p}$ (bbbb) 1g, donc ... Sçavoir (aaaaaa) a n $\frac{1ga + 5pa - 1ga}{5p}$, et j'auray $\frac{1ga}{5p}$. il luy resteront $\frac{5pa - 1ga}{5p}$ (bbbbbb) 10a n $1g10a + 5p | 10 erg. Hrsg. | a - 1g10a$ L
 $\frac{5p}{5p}$

2 P a r t i e : Die Gliederung des Stückes in drei Teile ist nicht inhaltlich, sondern durch die Papierträger begründet. Jeder Teil entspricht dem auf einem der drei Träger niedergeschriebenen Text. Tatsächlich endet der erste Teil mitten im Satz nach „comme la chose est tres considerable“ und der zweite beginnt mit „il est important“; der besseren Lesbarkeit halber wird hier der gesamte Satz im ersten Teil wiedergegeben. 4 restent: Wendet man den hier verworfenen Ansatz, zwei *facilités* zueinander ins Verhältnis zu setzen, nicht auf die Gewinnanteile des einen Spielers, sondern auf den Spielstand $g:f$ an, so erhält man eine besonders einfache und alle Mindestbedingungen erfüllende Teilungsregel, nämlich die Teilung im Verhältnis von $(p-f):(p-g)$. (Vgl. auch S. 37, Anm. zu Fig. 4.)

amener tout, mais que nous convenions, de nous payer à chaque coup à proportion du party et qu'il ait mis $10a$, je gagne $1g$, donc son argent doit estre divisé en 2 parties $1g$,

et $5p - 1g$. Sçavoir $10a \sqcap \frac{1g 10a + 5p 10a - 1g 10a}{5p}$, et j'auray $\frac{1g 10a}{5p}$, il luy resteront

$\frac{5p 10a - 1g 10a}{5p}$. Je gagne encor $1g$, donc c'est comme si nous recommencions et s'il

5 n'avoit mis au jeu que $\frac{5p 10a - 1g 10a}{5p} \sqcap R$, qui luy restent, donc au lieu de $\frac{1g 10a}{5p}$ que

j'avois gagné auparavant, je gagneray $\frac{1gR}{5p}$. C'est à dire je gagneray $\frac{1g 5p 10a - 1g^2 10a}{25p^2}$

au deuxieme coup et la somme des deux coups gagnez sera:

$$\frac{25p^2 10a \left[-5p 1g 10a + 1g 5p 10a \right] - 1g^2 10a}{25p^2}$$

Donc si je ne m'estoys pas fait payer au premier coup, et si j'avois attendu jusqu'au
10 2^{me}, et si alors le jeu avoit esté rompu, il faudroit que j'eusse gagné la même somme, que

7 *Zwischen die Zeilen gesetzte Anmerkung:* (Erreurs: on ne peut pas comme cela conter sur les restes, voyez la 3^{me} partie.)

4 donc (1) *en* (2) je gagneray (3) c'est L 5 $\sqcap R$. *erg.* L

11,17 5p: Lies „im Beispiel 5, im Allgemeinen p “. $10a$ oder $1g$ sind entsprechend zu interpretieren.

6 $\frac{1gR}{5p}$: Da der Spieler nach g gewonnenen Runden nur noch $(5p - g)$ weitere gewinnen muss, um

den Gesamtsieg zu erringen, stünde ihm beim Gewinn weiterer g Runden folgerichtig ein zusätzlicher

Anteil von $\frac{1gR}{5p - g}$ zu. Dies entspricht eben $\frac{1g 10a}{5p}$; der hier verfolgte Ansatz, welcher jede gewonnene

Runde mit einem gleichen Teil des Gewinns belohnt, wird also im folgenden mit einem untauglichen Argument verworfen. In der bereits in Hannover verfassten Schrift *De incerti aestimatione* kehrt Leibniz im September 1678 zu diesem Ansatz einer arithmetischen Reihe zurück (vgl. VI, 4 N. 34, S. 101 Z. 10 bis 12).

8 $\frac{25p^2 10a \left[-5p 1g 10a + 1g 5p 10a \right] - 1g^2 10a}{25p^2}$: Das Ergebnis der Addition lautet konsequent

gerechnet $\frac{2g 5p 10a - 1g^2 10a}{25p^2}$. Der Fehler fällt nicht mehr ins Gewicht.

je gagne en me faisant payer chaque deux coups. Voila une belle preuve de ces sortes de raisonnemens mais selon nostre regle, j'aurois gagné $\frac{2g\ 10a}{5p}$, ce qui est bien different de $\frac{25p^2\ 10a - 1g^2\ 10a}{25p^2}$. C'est pourquoy pour venir à bout d'une question aussi difficile que cellecy; je vois qu'il faut proceder tout autrement. Et tous ces sauts aux proportionalitez ne sont que des sophismes, qui nous doivent estre suspects. Et je vois par là qu'Euclide a eu raison de demontrer rigoureusement les theoremes des triangles semblables et choses semblables. Voila la veritable methode, à ce que je crois.

Le nombre des points qu'il faut gagner est p . L'argent que mon adversaire a mis au jeu est a . Supposons que je ne mette rien de mon costé car cela peut arriver; et mon adversaire peut conter le plaisir qu'il a de jouer contre moy, pour quelque chose. Quoiqu'il y ait de la difficulté, car c'est alors plutost un prix proposé, s'il faut que je gagne dans un temps prefix et s'il n'y a point de temps, c'est un salaire, car humainement parlant je ne manqueray jamais de gagner que si nous mettons de deux costez, on peut concevoir l'un comme salarié de l'autre; et le salaire cessera lors que l'un de deux aura fait un certain nombre: mais cela n'est pas dans notre cas; donc cette supposition ne servira de rien.

Je reviens toujours à cela, qu'ayant gagné 1 coup, ou 1 point, j'ay gagné quelque chose. Appelons cela l (*lucrum*). Mon adversaire a mis a sur la table, je gagne de son argent l le premier coup, donc il reste $a - l$, l'argent qui est sur la table que nous appellerons (a) , donc le second coup je gagneray (l) qui seroit à l comme $(a) \sqcap a - l$ est à a . C'est à dire $(l) \sqcap \frac{al - l^2}{a}$. Et ainsi autant de fois qu'il y a des unitez en p , et la

6 demontrer (1) Geometriq (2) rigoureusement les (a) proportions (b) les (c) theoremes *L*
 18 1. (*lucrum*). (1) Donc l'argent gagné (2) Mon adversaire *L* 19 a - l. (1) pour le second (2) je
 gagne le second coup (3) l'argent *L* 20 appellerons (1) 1 (2) a (3) (a) donc ... gagneray | (*L*) ändert
Hrsg. | qui seroit à | *L* ändert *Hrsg.* | comme *L* 21 c'est a dire (1) *L* $\sqcap a^2 - al$ (2) (1) $\sqcap \frac{al - l^2}{a}$ *L*

6 demontrer: Vgl. EUKLEIDES, *Elementa*, VI.

somme de tous les l , (l) doit estre égale à a , ou $a \sqcap l + ((l))$ etc. Mais cela suppose une chose dont je ne suis pas bien sûr, savoir que je gagne autant à proportion par le second coup sur l'argent qui reste après celui que j'ai emporté par le premier coup; que j'ai gagné au premier coup sur tout l'argent de mon adversaire, ce qui n'est pas. Mais

5 voilà ce qu'on peut dire: j'ai emporté une certaine partie de l'argent de mon adversaire le premier coup: par exemple l . Il reste donc $a - l$. Donc après cela, c'est comme si mon adversaire avait mis sur la table $a - l$, à gagner en 4 points. Supposons que je ne mette rien, et que mon adversaire mette de l'argent a , à gagner en 5 points consécutifs; or je suppose que la facilité de gagner en 5 points consécutifs, est à l'apparence de gagner


10 en 4 points consécutifs en raison réciproque du nombre des points. Ce principe étant posé, nous calculerons le parti en cas qu'on laisse le jeu imparfait: Le nombre des points à gagner est p , l'argent mis est a . Je gagne un coup, ou 1 point, et je gagne par là quelque chose que nous appellerons l . Donc il reste $a - l$: à gagner en $p - 1$ points. Il faut considérer ici une chose étrange, qui est, que cette condition étant accordée,

15 il m'appartient quelque chose si un cas survenant m'empêche de commencer même à jouer; car j'ai toujours un droit acquis et il est possible que je gagne. Et il est assez difficile d'estimer la probabilité qu'il y a que je gagne 5 fois consécutives à la probabilité

1 somme (1) | de *nicht gestr.* | tous, doit estre égale à a. (2) de tous les l. | (1) *erg.* | doit L
 2 à proportion *erg.* $L = 5$ emporté (1) un certain argent (2) une certaine $L = 9$ que la (1) difficulté
 (2) facilité $L = 11$ imparfait: (1) Ayant gagné 1 point il est assuré (2) Le nombre $L = 17$ que je (1)
 trouve (2) gagne L

1 $a \sqcap l + ((l))$: Leibniz legt hier den jeweils erreichten Gewinnanteil über eine geometrische Reihe fest. Der Sieg in einer Runde führt dabei zu einem jeweils kleineren Zuwachs als ein Sieg in der vorangehenden Runde. Allerdings konvergiert die von ihm definierte Reihe — unabhängig davon, wie groß der Anteil l von a gewählt wird — gegen a . Damit ist jede ihrer Partialsummen kleiner als a . Eine Teilungsregel, die auf dieser Reihe basiert, kann also die zweite der Mindestbedingungen (dass der Gesamtsieger den gesamten Gewinn erhält) niemals exakt erfüllen. 17 probabilité: Auch die *probabilité* wird in diesem Stück als Größe angesehen, die nicht absolut zu betrachten ist, sondern ihre Bedeutung als Teil eines Zahlenverhältnisses erhält. Zwar hat Leibniz bereits 1665 in seiner *Disputatio de conditionibus posterior* (in einem rechtstheoretischen Zusammenhang also) eine Vorform eines genormten Wahrscheinlichkeitsmaßes entwickelt: Der *conditio impossibilis* ordnet er dort die 0 zu, der *conditio necessaria* die 1 und der *conditio incerta* einen Bruch zwischen 0 und 1 (vgl. VI, 1 N. 6 S. 139; ganz ähnlich auch in den *Specimina juris* von 1667–69, ebd., N. 11 S. 420). Hier knüpft er an diesen Gedanken jedoch nicht an. 17 5 fois consécutives: Das im Anschluss behandelte Beispiel verlangt nur vier in Folge zu gewinnende Runden. Es ist als Zusatzspiel im Rahmen des eigentlichen Spiels konzipiert. Eine vergleichbare Anforderung besteht aber auch etwa bei einem 0:3-Rückstand und vier Gewinnrunden.

qu'il y a que je perde une seule fois. Au premier jeu il est aussi probable que je perde que, que je gagne, donc une probabilité pour mon adversaire, l'autre est encor incertaine, car ayant gagné, il est encor aussi probable que je perde le second jeu, qu'il n'est probable que je le gagne; donc encor 1 degré de probabilité assuré pour mon adversaire, l'autre controversé entre luy et moy, car ayant gagné le second jeu, je peux encor ou perdre le troisième, ce qui est assuré pour mon adversaire, ou le gagner, ce qui est controversé entre moy et l'adversaire, et ainsi tousjours, jusqu'au dernier qui m'assure de la victoire, $D \sqcap 0 \infty 1$.



[Fig. 1]

5

10

∞ est signum disjunctivi, aut, quo nondum in calculo usi sumus. $C \sqcap 0 \infty D \sqcap 0 \infty 0 \infty 1 \sqcap 2\bar{0} \infty 1$. $B \sqcap 0 \infty C \sqcap 0 \infty 2\bar{0} \infty 1 \sqcap 3\bar{0} \infty 1$. Et $A \sqcap 4\bar{0} \infty 1$.

2 gagne, (1) dont (2) donc ayant gagné, (3) donc $L = 2$ l'autre (1) pour moy (2) est encor $L = 3$ que je (1) gagne le second jeu, (a) que (b) qu'il n'est probable que je perde; (2) perde $L = 4$ f. encor 1 | degré ... assuré erg. | pour ... , l'autre (1) pour moy (2) controversé $L = 5-7$ jeu, | il peut ändert Hrsg. | encor ... pour | son ändert Hrsg. | adversaire, ... entre | luy ändert Hrsg. | et ... qui | l' ändert Hrsg. | assure $L = 7$ f. victoire, (1) $C \sqcap (a) 0 - 1$. (b) $0 \infty 1 = \infty$ est signum disjunctivi |, aut erg. |, quo nondum in calculo usi sumus. $B \sqcap 0 \infty C \sqcap 0 \infty 0 \infty 1 \sqcap 2\bar{0} \infty 1$. $A \sqcap (2) D \sqcap 0 \infty 1 = L$

10 Fig. 1: (1) $A \left\{ \begin{array}{l} 0 \\ B \left\{ \begin{array}{l} 0 \\ C \left\{ \begin{array}{l} 0 \\ 1 \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \quad (2) A \left\{ \begin{array}{l} 0 \\ B \left\{ \begin{array}{l} 0 \\ C \left\{ \begin{array}{l} 0 \\ D \left\{ \begin{array}{l} 0 \\ 1 \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \quad L$

10 Fig. 1: In diesem Schema lässt sich jede geschweifte Klammer als einzelne Spielrunde betrachten, A stellt den Spielstand zu Beginn des Zusatzspiels dar (vgl. S. 35 Z. 3), B, C und D sind Zwischenstände, bei denen es fortgesetzt wird, und 0 und 1 sind die möglichen Endresultate. Dabei bedeutet 1, dass der Spieler eine Serie von vier Runden in Folge gewonnen hat, 0 dagegen, dass ihm dies nicht gelückt ist. Ein fast identisches Zerlegungsschema findet sich als fragmentarische Notiz in dem ebenfalls im Januar 1676 verfassten Stück *De numero jactuum in tesseris* (N. 10 S. 59 Z. 16 f.).

Donc $4p$ points estant proposez à estre gagnez consecutivement, l'apparence de les gagner à celle de ne pas gagner au commencement du jeu, est comme 1 est à $4p$. Ainsi

2 à celle . . . gagner erg. L 2 comme (1) $4p$ est à 1. (2) 1. est à $4p$. (a) Rappeler (b) ainsi L

31,11 signum disjunctivi: Leibniz verfolgt das Programm, nach den Regeln einer *ars characteristica universalis* einsetzbare Zeichen zu bilden. Das neu geschaffene Symbol ∞ steht jedoch nicht allgemein für *aut* (... *aut*), also exklusives „oder“ (wofür die moderne Logik verschiedene Symbole kennt, etwa \vee oder \oplus), sondern es hat eine engere Bedeutung: Es stellt die einander ausschließenden Ausgänge einer Spielrunde nebeneinander. Dabei stehen links wie rechts des Symbols jeweils als gleichwahrscheinlich betrachtete Möglichkeiten; seine symmetrische Gestalt versinnbildlicht dieses Gleichgewicht. Das Symbol ∞ kann in eine Reihe mit den *signa ambigua* gestellt werden, wie sie Leibniz Mitte 1674 in seinen Schriften zur *méthode de l'universalité* (VII, 7 N. 10 u. 11) definiert. Auch bei diesen gibt es exklusive Fallunterscheidungen, die sich weiter aufzweigen. So steht etwa das Symbol \dagger für die Aussage „im einen Fall +, im anderen Fall entweder – oder +“ (vgl. VII, 7 N. 11 S. 124). Noch zwei Jahrzehnte später nennt Leibniz *notae ambiguæ* und *notae disjunctivorum* im selben Atemzug (vgl. Leibniz an Wernher, 6./16. Oktober 1697; III, 7 N. 148 S. 598).

31,11 $C \sqcap 0 \infty D$: In den zum Schema aufgestellten Gleichungen haben die Größen A bis D andere Bedeutungen als im Schema selbst. Sie stehen nicht mehr für einen Spielstand, sondern für die Gesamtheit der als gleichwahrscheinlich vorausgesetzten Ausgänge, die sich aus diesem Spielstand ergeben können. Sie geben somit eine Art Erwartungswert an. Die Kurzschreibweise $C = 2\bar{0}\infty 1$ für $C = 0\infty 0\infty 1$ behandelt die Gleichung, als ob sie äquivalent zu $C = (0\infty 0)\infty 1$ wäre; tatsächlich steht sie aber für $C = 0\infty(0\infty 1)$, was aufgrund der fehlenden Assoziativität der durch ∞ begründeten Verknüpfung nicht das Gleiche ist. In der Folge zählt die Kurzschreibweise nur die ungünstigen Endresultate und stellt sie dem einen günstigen Endresultat gegenüber. Bei der Betrachtung von Wahrscheinlichkeiten führt sie in die Irre (vgl. Z. 2), da sie nicht zwischen den einzelnen ungünstigen Endresultaten, die jeweils unterschiedlich wahrscheinlich sind, differenziert.

1 $4p$: Lies „im Beispiel 4, im Allgemeinen p “. 2 1 est à $4p$: Leibniz übersetzt die Gleichung $A = 4\bar{0}\infty 1$ in die unzutreffende Aussage, dass vom Spielstand A ausgehend das Endresultat 0 (Misserfolg) viermal so häufig auftrete wie das Endresultat 1 (Erfolg). Noch im selben Monat gelangt er an anderer Stelle aber zu einem korrekten Ergebnis: Unter dem Zerlegungsschema in

N. 10 (S. 59 Z. 17) notiert er die Gleichungen $D = \frac{1}{2}$, $B = \frac{1}{4}$, $C = \frac{1}{8}$ und $A = \frac{1}{16}$ (in jenem Schema sind B und C vertauscht). Die Größen A bis D erhalten dabei erneut eine andere Bedeutung; sie lassen sich als Erwartungswert des Zusatzspiels interpretieren, wenn der mit dem gleichen Buchstaben bezeichnete Spielstand erreicht worden ist. Der Erwartungswert (*valor expectationis*, eingeführt von Chr. HUYGENS, a. a. O., 1657, S. 521 f.) ist ein Konzept, mit welchem Leibniz auch zweieinhalb Jahre später in *De incerti aestimatione* arbeitet. Dort berechnet er ihn für den Spielstand 1:0 und zwei Gewinnrunden

über den Ansatz $\frac{\frac{1}{2} + 1}{2}$ (vgl. VI, 4 N. 34 S. 100 Z. 4–6). Die Gleichungen in N. 10 lassen sich leicht auf

analogem Wege aus den oben aufgestellten Gleichungen erhalten, indem man die Notation $D = 0\infty 1$ in


$D = \frac{0+1}{2}$ umschreibt, dann $C = 0\infty D$ in $C = \frac{0+\frac{1}{2}}{2}$ überführt und entsprechend fortfährt.

celuy qui joue, a au commencement $\frac{1}{p}$ de la somme proposée. Le Reste est a u j e u , c'est à dire, commun aux deux joueurs, s'il[s] les ont mis tous deux; ou à celuy qui a mis cet argent: celuy qui a gagné 1 point consecutif a $\frac{1}{p-1}$ de la somme proposée, celuy qui a 2 points consecutifs, a $\frac{1}{p-2}$ de la somme proposée. Donc la question se peut concevoir ainsi: deux joueurs mettent chacun une somme égale au jeu, à condition, que celuy qui gagnera un certain nombre de coups consecutifs, par exemple 4, gagnera tout. Par exemple jouant triomphe, ils demeurent d'accord apart, que celuy qui pendant le jeu principal gagnera le premier quatre fois consecutives, tirera outre ce qu'il gagne au jeu principal, une certaine somme qu'ils ont mise pour cet effect. Il s'agit de sçavoir le party qu'il faut faire de cette somme, lors que [le] jeu cesse, selon le nombre des points que celuy qui a gagné le dernier a gagné. Cette condition a cela de remarquable qu'on ne sçauroit finir que l'un de deux n'emporte quelque chose de la somme. Car celuy qui a gagné le dernier a détruit tout ce que l'autre a fait. Et ainsi, n'ayant qu'un point pour le moins

3 argent: (1) aux deuxième coup (2) celuy qvi a gagne (a) deux points consecutifs (b) 1 point *L* 6 exemple 4. (1) amenera (2) gagnera *L* 7 f. celuy qvi (1) aura le premier (a) 5 (b) 4 (2) pendant le jeu principal (a) aura le premier (b) gagnera *L* 8 f. outre ... principal *erg.* *L* 9 sçavoir (1) si (2) combien (3) le party *L* 11 dernier a (1) amené (2) gagné *L* 12 finir (1) (dans les jeux ou pas un ne peut passer (2) qve l'un *L*

4 consecutifs: Die hier beschriebene Zuteilung der Gewinnanteile folgt unmittelbar aus der unzutreffenden Annahme, die Häufigkeit eines Misserfolgs sei, wenn p Siege in Folge gefordert sind, p -mal so hoch wie die eines Erfolges. Konsequent betrachtet müsste der Spieler allerdings mit einem Anteil von $\frac{1}{p+1}$ (und nicht von $\frac{1}{p}$) starten. Die Gewinnanteile im Zusatzspiel entsprechen dann den Gliedern einer umgedrehten harmonischen Folge. Die Frage nach dem „fairen“ Einsatz für ein solches Spiel — die Leitfrage von N. 10; vgl. S. 71 Z. 1–4 — greift Leibniz an dieser Stelle nicht auf, obwohl sein Ergebnis eine Antwort impliziert. 7 triomphe: Dieses einfache, in zeitgenössischem Deutsch als „Trumpfspiel“ bezeichnete Kartenspiel ist zu jener Zeit in Frankreich populär; die Zahl der Spieler ist variabel (vgl. LA MARINIÈRE, *La maison des jeux académiques*, 1665, S. 43–45). Es existiert auch eine Variante für genau zwei Spieler (vgl. ebd., S. 46). 8 quatre fois consecutives: Durch die geänderten Bedingungen des Zusatzspiels — es ist nun symmetrisch angelegt, wird bei Misserfolg fortgesetzt und als Endresultat ist auch ein Unentschieden möglich — wird ein ganz neues Problem gestellt. Die geänderten Bedingungen und insbesondere der zusätzlich zu berücksichtigende Parameter machen die Berechnung der Gewinnchancen deutlich aufwändiger.

lors que le jeu cesse, il luy appartiendra à proportion. Question: deux joueurs mettent ensemble une somme égale, qui sera à celuy qui aura gagné quatre fois consecutives au jeu principal. Il s'agit de savoir combien de la somme appartiendra à celuy qui aura gagné le dernier un certain nombre de coups consecutifs, lors qu'on se sépare sans avoir
5 achevé le nombre qui luy faut.



[Fig. 2]

1 f. proportion. (1) Lors que la condition (2) question deux joueurs mettent (a) une somme (b) ensemble ... égale, (aa) pendant (bb) qvi $L = 2$ fois | consecutifs ändert Hrsg. | (1) dans le jeu (2) au jeu $L = 3$ combien (1) aura gagné celuy (2) de la somme $L = 4$ le dernier erg. $L = 5$ nombre (1) qv'il faut (2) qvi L

4 le dernier: Man betrachte als Beispiel ein Spiel, in welchem für das Hauptspiel sechs Gewinnrunden vereinbart worden sind und für das Zusatzspiel vier Gewinnrunden in Folge. Wird das Hauptspiel nun beim Stand von 2:2 abgebrochen, wobei der eine Spieler die beiden letzten Runden gewonnen hat, so würde die in Z. 1 angeregte Teilung à proportion nahelegen, dass der Einsatz im Verhältnis 3:1 zu seinen Gunsten zu teilen wäre. Tatsächlich beträgt die Wahrscheinlichkeit eines Sieges dieses Spielers im Zusatzspiel jedoch $\frac{39}{128}$ und die seines Gegners $\frac{12}{128}$; eine „faire“ Aufteilung müsste also im Verhältnis 155:101 erfolgen.

7 Fig. 2: Mit diesem Schema, das einem modernen Baumdiagramm sehr ähnlich ist, nimmt Leibniz nun auch die weiteren möglichen Spielverläufe in den Blick. A lässt sich auch als jener Spielstand interpretieren, bei dem ein Spiel, in welchem maximal noch vier bzw. drei Runden zu spielen sind, abgebrochen werden muss.

S'ils la mettent de sorte que celuy qui gagne le premier quatre fois; la peut prendre; alors, on peut faire de même: Car en 2 fois autant de jeux, qu'il y a de points demandés; l'un des deux doit gagner: *A* est l'estat au quel on commence le jeu. Puisque le nombre des jeux nécessaires à chacun est p , le nombre des jeux qui doivent déterminer la chose est $2p$. Et chaque jeu est $b \propto c$, *id est* favorable à la personne b ou à la personne c , également. Il y aura donc: $2p \overline{b \propto c}$ au commencement c'est à dire $2pb \propto 2pc$. Mais (g) jeux étant gagnés par b , le nombre des jeux qui restent est $2p - g$. Le nombre des jeux qui restent à gagner à b est $p - g$. Le nombre des jeux, qu'il faut que c gagne est $p + g$. Or il peut arriver par autant de manières différentes que b gagne, qu'il y a de com $\boxed{p - g}$ naisons dans le nombre $2p - g$, considérant, qu'il peut gagner chaque jeu; car ainsi il peut autant de fois gagner ces $p - g$ jeux qui luy restent, qu'on peut prendre différentes fois le nombre de $p - g$ dans $2p - g$ choses. De même accordant à l'autre c , aussi, qu'il peut gagner chaque jeu, comme il doit gagner $\overline{p + g}$ fois pour tirer l'argent. Mais je trouve encor un paralogisme là dedans, il ne faut pas examiner combien des fois il peut gagner le nombre des jeux qui luy restent, dans le nombre des jeux qui restent à jouer; mais combien des fois il les peut gagner le premier, par exemple dans le nombre $2p - g$. Combien des fois on peut conter $p - g$ pour l'un avant qu'on ait conté $p + g$ pour l'autre. Soit le nombre des jeux qui restent à jouer $2p - g \sqcap 5$, le nombre des jeux que l'un doit gagner $p - g$, le nombre des jeux que l'autre doit gagner n'est pas $p + g$ comme j'avois dit, mais encor p , s'il n'a rien gagné, et $p - f$, s'il en a fait f .

5

10

15

20

2 alors, (1) il faut (2) on peut $L = 2$ Car (1) *en 3 fo* (2) en (a) 3 (b) 2 fois $L = 3$ f. Puisque (1) cha (2) le nombre des (a) jeux est $2p$. (b) jeux $L = 5$ est $2p$. (1) Dont il faudroit (2) Et $L = 6$ également | Dans le nombre *gestr.* |, il y aura $L = 6$ Mais (1) 1 jeu étant gagné, (2) (g) | jeu étant gagné ändert Hrsg. || par b erg. |, $L = 12$ De même (1) consider (2) accordant $L = 13$ jeu, (1) neantmo (2) comme $L = 14$ Mais je (1) m'a (2) trouue L

2 en 2 fois: Leibniz springt unvermittelt vom Zusatzspiel zurück zum Hauptspiel. Die Aussage trifft jedoch weder auf das eine noch das andere zu. 5 2p: Tatsächlich hat nach spätestens $(2p - 1)$ Runden ein erster Spieler p Siege erzielt; vgl. auch S. 18 Z. 10 f. 10 com $\boxed{p - g}$ naisons: Dieser Begriff bezeichnet ungeordnete Stichproben von $(p - g)$ Elementen aus einer gegebenen Grundmenge; vgl. N. 25 S. 159 Z. 21 bis S. 160 Z. 2. Hier sind also Kombinationen von $(p - g)$ aus $(2p - g)$ Elementen ohne Wiederholung, in moderner Darstellung $\binom{2p-g}{p-g}$ an der Zahl, gemeint. Mit Fig. 4 greift Leibniz diesen Ansatz wieder auf. 18 2p - g: Die Anzahl der bei einem Stand von $g : f$ und p Gewinnrunden maximal noch zu spielenden Runden m beträgt tatsächlich $(2p - g - f - 1)$. Leibniz richtet in der Folge in den Figuren \oplus und 4 mehr Spalten ein als erforderlich.

$$\oplus \left\{ \begin{array}{cccccc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ B & b & b & b & b & b & \text{etc.} \\ C & c & c & c & c & c & \text{etc.} \\ (1) & b & & & & & \\ (2) & c & b & & & & \\ \hline (1) & c & c & & & & \end{array} \right.$$

[Fig. 3]

Supposons $p \sqcap 4$, $g \sqcap 3$, $f \sqcap 2$, le nombre des jeux à jouer 5. Le nombre des jeux à gagner par b , sera 1. Le nombre des jeux à gagner par c , sera 2. Or il faut considerer combien des fois on peut conter 1 b , avant que d'avoir conté 2 c dans la figure \oplus . Et on voit, que cela ne se peut qu'en deux manieres, marquées de (1) et de (2). Mais 2 c ne se peut conter qu'une seule fois, en commençant par c c , avant que d'avoir dit une fois b . Donc la possibilitez de l'un est double de la possibilite de l'autre. Et l'argent tout entier qui est au jeu sera partagé en trois parties égales, dont l'un aura $\frac{2}{3}$, l'autre $\frac{1}{3}$, sans se mettre en peine d'autre chose. Prenons un tel exemple. On a proposé une somme d'argent a , à celuy de deux joueurs seuls jouans, qui gagnera le premier 5 jeux. L'un b , en ayant déjà gagné 3, et l'autre c , un seulement, il est manifeste que si b gagne 2, il aura tout; et s'il perd deux, il n'aura que la moitié de l'argent mis au jeu. Dont l'autre moitié se doit partager en deux, et l'un ayant 3, l'autre 1. Celuy qui a gagné 3, aura gagné $\frac{3}{4}$. Ce qui est un cas connu. Voyons si nous pouvons deriver cela de nostre principe. Le nombre

1 1 ... 5 erg. $L = 6$ (1) | b b ändert Hrsg. | $L = 8$ f $\sqcap 2$. (1) et il (a) en faut 1 point (b) faut 2 points à (2) Le nombre $L = 10$ dans (1) les figures (2) la figure \oplus $L = 11-13$ Mais | 2. ändert Hrsg. | ne se ... par | b b, ändert Hrsg. | avant ... fois | c. ändert Hrsg. | donc $L = 16$ joueurs seuls jouans erg. $L = 16$ premier (1) 6 (2) 5 jeux $L = 17$ manifeste qve (1) s'il (2) si b (a) perd (b) gagne $L = 19$ f. gagné (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{3}{4}$. (a) Mais (b) Ce qvi L

13 double: Leibniz betrachtet hier die möglichen weiteren Spielverläufe bis zur Entscheidung — die *possibilités* —, zählt zusammen, wieviele davon mit einem Gesamtsieg des führenden Spielers enden und wieviele mit dem Sieg seines Gegenspielers, und setzt das Verhältnis dieser *possibilités* mit dem der *probabilités* gleich. Dies würde allerdings voraussetzen, dass jede *possibilité* mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auftritt, was nicht der Fall ist. Tatsächlich sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten in diesem Beispiel die gleichen wie in jenem am Anfang des Stücks (S. 18 Z. 5), wo Leibniz sie korrekt angibt.

20 connu: Leibniz bezieht sich hier auf seine unzutreffenden Überlegungen in S. 20 Z. 9–14.

des jeux à jouer au commencement estoit 10. On en a joué 4, dont b a gagné 3, et c en a gagné 1. Il en restent donc 6 à jouer, et 2 à gagner pour b , et 4 à gagner pour c . Donc ayant accordé à l'un aussi bien qu'à l'autre de gagner également chaque jeu; il faut voir quelle consequence il peut tirer de cette permission.

1 2 3 4 5 6	5
b b b b b b	
c c c c c c	
(1) b b	(1) c c c c
(2) c b b	(2) b c c c c
(3) c c b b	(3) c b c c c
(4) c c c b b	(4) c c b c c
(5) b c b	(5) c c c b c
(6) c b c b	
(7) c c b c b	
(8) b c c b	10
(9) c b c c b	
(10) b c c c b	

[Fig. 4]

5 1 ... 6 erg. L

18 Fig. 4: Leibniz verfolgt weiterhin den Ansatz der *possibilités*. Bei höchstens m noch zu spielenden Runden und einem Stand von $g:f$ enden $\binom{m}{p-g}$ Spielverläufe mit einem Gesamtsieg des in Führung liegenden Spielers und $\binom{m}{p-f}$ mit seiner Niederlage. Die Aufteilung soll nun im Verhältnis dieser Zahlen erfolgen, wobei Leibniz allerdings keine Formel zu ihrer Berechnung angibt. Gekürzt ergibt sich eine Teilung im Verhältnis von $(p-f):(p-g)$. Leibniz gelangt hier also auf dem Umweg über kombinatorische Erwägungen — und ohne sich dessen gewahr zu werden — zu einer der einfachsten und nächstliegenden Teilungsregeln. Diese Regel erfüllt die genannten Mindestanforderungen; da sie unterschiedlich wahrscheinliche Spielverläufe gleich gewichtet, erfolgt die Aufteilung allerdings im Allgemeinen nicht im Verhältnis der Erfolgswahrscheinlichkeiten der beiden Spieler zueinander. Dies leistet dagegen die kanonisch gewordene Lösung von Pascal und von Fermat aus dem Jahr 1654. Fermats Ansatz dabei liegt nur einen Schritt von jenem, den Leibniz hier verfolgt, entfernt: Er ergänzt ein Schema wie das obige so, dass es sämtliche Spielverläufe, die in der maximal noch zu spielenden Anzahl an Runden möglich sind, wiedergibt (gleichgültig, ob diese Runden tatsächlich alle gespielt werden müssen, um den Sieger zu ermitteln). Diese Spielverläufe betrachtet er dabei als jeweils gleichwahrscheinlich, und er zählt zusammen, in wie vielen davon der Führende den Gesamtsieg erringen würde und in wie vielen sein Gegenspieler. Die Teilung erfolgt im Verhältnis dieser Zahlen (vgl. P. de FERMAT, a. a. O., S. 184).

Donnons à la personne *b* le pouvoir de gagner toutes les fois qu'il veut; il ne peut gagner qu'en 10 manieres selon les loix et circomstances du jeu: donnons à l'autre le même pouvoir sur la fortune, il ne peut gagner qu'en 5 manieres differentes: dont ostant à tous deux ce pouvoir, et les remettant dans l'estat des hommes ordinaires, les apparences de gagner, seront comme les possibilitez, et les possibilitez comme le nombre de plusieurs cas egalement possibles. Voila icy l'objection car on peut dire les differens cas ne sont pas egalement possibles. Je reponds qu'ouy, par ce qu'il y a dans l'un autant de requisits que l'autre, car dans tous les dix cas favorables à *b*, on ne demande que deux fois le gain de *b*, et dans tous les cas favorables à *c* on ne demande que quatre fois le gain de *c*. Mais je voy par là que mon opinion avoit besoin de correction, et que un cas favorable à *b*, est bien plus possible qu'un cas favorable à *c*, par ce qu'il faut quatre succes à un cas de *c*, et il n'en faut que 2 à un succes favorable à *b*. Donc les facilitez estant en raison reciproque des nombres, et 10 estant double de 5, et 4 double de 2, l'avantage de *b* sera à l'avantage de *c*, comme 4 à 1. Il est manifeste de soy meme qu'il est plus aisé de faire 2 coups que d'en faire 4, en raison reciproque de 2 à 4. Et il est bien manifeste aussi qu'il est bien plus aisé de recontrer une des dix manieres, que de recontrer une des 5. Si le partage doit estre fait en deux parties qui sont en raison des apparences de gagner;

1 *Über* le pouvoir de gagner gesetzte Anmerkung: chapeau de Fortunatus

2 manieres (1) dont l'une est aussi possible qv (2) selon *L* 7 possibles (1) Car un cas des (2)
 Je reponds *L* 9 gain de *c*. (1) Donc je vois a prese (2) Mais *L* 15 faire 4. (1) Or qvand il y a (2)
 en ... de (a) 4 a 2 (b) 2 a 4. *L* 16 manieres, (1) | qve de rencontrer une des (a) 4 (b) 10 nicht gestr. |
 (2) qve de rencontrer un des (a) 4 (b) 5. (aa) Si le droit (aaa) est (bbb) acquis est égal à l'apparence de gagner; et l'apparence de gagner est en raison des cas comme (bb) Si *L*

18 chapeau: Das Wunschhütlein ist eine magische Requisite in dem ersten eigenständigen Prosaroman deutscher Sprache, dem aus unbekannter Feder stammenden *Fortunatus*. Mit Hilfe des Hutes kann sich sein Besitzer an jeden beliebigen Ort der Erde wünschen; vgl. o. V., *Fortunatus*, 1509, Bl. 60.

14 manifeste: Das Verhältnis der *facilités* zueinander beträgt $(p - f) : (p - g)$; es entspricht also genau dem der *possibilités* und somit auch der oben zunächst vorgeschlagenen Teilungsregel. Da Leibniz für diese Regel jedoch keine Formel aufstellt, sondern sie nur anhand des Beispiels veranschaulicht, entgeht ihm die Übereinstimmung.

et les apparences de gagner, comme les nombres des cas également aisez, ou en raison composée du nombre des cas et de leur facilité, il est manifeste qu'il est aussi aisé que *b* gagne dans le premier des cas qui luy sont favorables que dans le second.

On peut considerer la même chose lors qu'il y a plus de joueurs que deux, ce que Mons. Pascal n'a pas examiné, et qui est bien plus embarrassé. Car s'il y en a trois par exemple; il ne faut pas prendre le double du nombre des jeux à gagner, pour le nombre des jeux à jouer, mais le triple, *item* il faut faire le partage en trois parties proportionnelles aux apparences, et pour estimer les apparences il faut avoir egard à deux obstacles, par exemple non seulement venant de *c*, mais aussi de *d* troisieme joueur. On peut considerer que deux jouent, et qu'on demande d'un certain nombre de partis à l'autre, un autre; pour gagner. Il peut estre que l'un aye mis plus au jeu, dont il a quitté la propriété, pour acheter le droit de gagner en moins de coups.

5


10

1f. gagner; (1) en raison des possibilitez (2) comme (a) le nombre (b) les nombres des cas également (aa) possibles; ou en raison (bb) aisez, ou en raison (aaa) reciproqve (bbb) recip (ccc) composée *L*
 4 qve deux erg. *L* 8 egard a (1) trois (2) deux *L* 9 seulement (1) de (a) b, (b) c, mais aussi (2) venant *L* 12–40,1 acheter (1) | par *nicht gestr.* | la des (2) le droit ... moins de (a) part (b) coups.
 (aa) Si (aaa) un (bbb) b aya (bb) S'il y a trois (aaa) parties, et b a gagné (bbb) poi (ccc) jeux *L*

1f. raison composée: Die hier aufgestellte zweite Leibniz'sche Teilungsregel, die eine Aufteilung im Verhältnis der Produkte aus *facilité* und *possibilité* vorsieht, lässt sich mit der Formel $(p - f)^2 : (p - g)^2$ wiedergeben. Diese Regel erfüllt die genannten Mindestanforderungen. Die von Leibniz zunächst erwogene Aufteilung im Verhältnis der *possibilités* spricht dem in Führung liegenden Spieler stets einen geringeren Anteil zu, als es der Wahrscheinlichkeit seines Gesamtsieges entspricht; die um den Faktor der *facilité* erweiterte Regel liefert demgegenüber eine bessere Annäherung an das Verhältnis der Erfolgswahrscheinlichkeiten. 5 pas examiné: Leibniz bezieht sich hier auf die genannte Abhandlung III in Pascals *Traité du triangle arithmétique*, 1665 [Marg.]. Dass diese die Aufteilung unter zwei Spielern behandelt, geht aus ihrem Titel hervor. Mit der Teilungsregel, die Pascal in dieser Abhandlung auf S. III, 6f. (= PO III, S. 488) beschreibt und welche sich mit der Formel $\sum_{n=0}^{p-f-1} \binom{m}{n} : \sum_{n=p-f}^m \binom{m}{n}$ wiedergeben lässt, befasst sich Leibniz nicht. Die Verteilung des Gewinns unter drei Spielern diskutiert Pascal ausführlich an anderer Stelle (vgl. Pascal an Fermat, 24. August 1654, in: P. de FERMAT, *Varia opera*, 1679 [Marg.], S. 185–188). Der Inhalt dieses Briefes ist Leibniz, als er das vorliegende Konzept niederschreibt, offensichtlich noch nicht bekannt. 7 triple: Tatsächlich beträgt bei drei Spielern die maximal zu spielende Anzahl an Runden $(3p - 2)$. 12 acheter: Bei einer solchen Vereinbarung stellt sich unmittelbar die Frage nach dem „gerechten“ Einsatz, also die Leitfrage von N. 10.

S'il y a trois jeux à gagner, et b en a gagné 2, c en a gagné 1, et si b gagne 1, il a tout, s'il perd un, il a la moitié de ce qui est au jeu, donc le gain d'un coup luy donnant a et la perte d'un coup le remettant à $\frac{a}{2}$, il semble que le jeu luy doit donner autant qu'il luy peut oster. Mais si ce calcul n'a point d'autre principe, il est malfondé; parce qu'il s'agit non seulement du nombre des points mais encor de la primauté. Et par même raison, on prouveroit qu'il est la même chose que deux joueurs gagnent tous deux, ou perdent tous deux en cas de jeu contesté; ce qui n'est pas ici.

10



[Fig. 5]

Donc selon mes principes en ce cas le party de b sera au party de c , comme 4 à 1. L'autre opinion semble estre confirmée par cecy: quand il y a autant de hazard de gagner, qu'il y en a de perdre; le droit qu'on acquireroit en gagnant, doit estre égal au droit qu'on quitteroit en perdant. Mais cette maxime n'est pas bien constante. Nous le pouvons voir. Soit trois coups à gagner; je gagne 1 coup. Et je suppose d'avoir gagné par là, l . Si je l'avois perdu, j'aurois perdu l . Avant que de jouer j'avois $\frac{a}{2}$. Ayant gagné le premier coup, j'ay $\frac{a}{2} + l$. Ayant perdu le premier coup, j'aurois $\frac{a}{2} - l$. Apres avoir gagné le premier coup, je gagne aussi le second coup, qui me donne (l) . Si je l'avois perdu, j'aurois $\frac{a}{2} + l - (l)$. Or en ce cas, l'autre auroit gagné autant que moy, et nous serions égaux, donc j'aurois $\frac{a}{2}$, donc $\frac{a}{2} + l - (l) \sqcap \frac{a}{2}$, *id est* $(l) \sqcap l$. Donc le second coup

2 un, il (1) n'a rien, et to (2) a la moitié L 2 f. gain d'un (1) point (2) coup luy donnant (a)
 $\frac{a}{2}$ (b) a ... coup (aa) | luy *nicht gestr.* | donnant $\frac{a}{2}$ (bb) le remettant L 3 semble qve (1) l'apparence
(2) le jeu L 10 f. $\overline{b \quad \quad}$ | c c | L 15 gagner | qvelqve chose *gestr.* |, qv'il ... perdre;
c b | b c c gestr.
(1) et qvand on gagne, $\frac{a}{2}$. (2) le droit L 16 constante. (1) Car il est assuré, qv'on peut gagner un jeu (aya) (2) Nous L 18 perdu l. (1) Si je gagne le (2) avant L 20 donne (l). | si je l'avois perdu
streicht Hrsg. | si L

me fait avoir $\frac{a}{2} + 2l$. Il m'en osteroit autant. Il faut examiner si la difficulté de gagner une somme en trois jeux, ou 4, est proportionnelle au nombre de jeux.

On propose à b et c de gagner une somme d'argent, en sorte que celuy, qui fera le premier trois jeux; l'emportera. Il est manifeste, qu'au commencement tout est égal; dont l'un a autant de droit que l'autre sur la somme proposée; et la somme est tout entiere à tous deux, parce qu'ils ne manqueront pas de gagner, l'un ou l'autre, donc la moitié appartient à chacun.

(1) b b	(1) c c c			
(2) c b b	(2) b c c c	$\frac{15a}{23}$	$\frac{8a}{23}$	5
(3) c c b b	(3) c b c c			10
(4) b c b	(4) c c b c			
(5) c b c b				
<hr/>				
b	c c c			
c b				
c c b				
<hr/>				
b	c c			
c b				
<hr/>				
		$\frac{9a}{10}$	$\frac{1a}{10}$	15
		$\frac{4a}{5}$	$\frac{1a}{5}$	

[Fig. 6]

1f. me (1) donne 21 (2) fait ... +21. (a) À présent le troisième coup me donne ((1)), si je l'avais perdu j'aurois (b) il ... autant (aa) donc (bb) A présent voyons (cc) il faut examiner (aaa) | s'il est *nicht gestr.* | aussi aisé de gagner les (bbb) si la ... trois jeux, | ou 4, *erg.* | est proportionnelle (aaaa) à la somme de la gagner (bbbb) au nombre $L = 5$ somme | est *gestr.* L , *erg. Hrsg.* | (1) à (2) tout L

2 proportionnelle: Eine Gleichheit (l) = ((l)) lässt sich auf analogem Wege nicht zeigen. Tatsächlich wird die allgemeine Forderung, dass jede einzelne Runde eines Vorsprungs einen gleich großen Zugewinn einbringen, für den Sieger also gleich viel wert sein soll, ausschließlich durch die erste Leibniz'sche Teilungsregel, formuliert in S. 25 Z. 1–4, erfüllt. Die Forderung dagegen, dass ein Spieler in einer einzelnen Runde stets ebensoviel gewinnen wie verlieren können soll (vgl. auch S. 40 Z. 14–16), dass also der Wert dieser Runde für beide Spieler gleich sein soll, wird nur durch die Teilungsregel von Fermat und Pascal erfüllt. Eine allgemeine Regel, die beide Forderungen gleichzeitig erfüllt, existiert nicht. 18 Fig. 6: In der Tabelle fehlt der sechste Spielverlauf, durch den der in Führung liegende Spieler ausgehend vom Spielstand von 1 : 0 bei drei Gewinnrunden gewinnen kann, nämlich $b\ c\ c\ b$. Dementsprechend müsste der zweiten Leibniz'schen Teilungsregel folgend der Gewinn nicht im Verhältnis von 15 : 8, sondern von 9 : 4 aufgeteilt werden. Die sich aus dem Irrtum ergebenden Zahlenwerte werden bis S. 45 verwendet.

Je suppose que b gagne 1 jeu, il restent 2 jeux à gagner à luy, et trois à gagner à son adversaire; voyons combien il y a plus d'apparence, qu'il en emporte les deux premiers, que l'autre les trois premiers. Parce qu'il faut que b gagne 2, avant que c gagne trois, voyons combien de fois cela peut arriver, que b gagne deux avant que l'autre trois, or il y a 5 manieres favorables à b , et il y en a 4, à c , donc l'apparence pour b est à l'apparence pour c , comme 5 à 4. Mais encor parce que le nombre des jeux que b demande, est au nombre des jeux que c demande comme 2 à 3, donc l'apparence est en raison de 3 à 2 et toute l'apparence est en raison composée, c'est à dire de $\frac{5}{4}$ et $\frac{3}{2}$, c'est à dire comme 15 à 8. Donc divisant l'argent en 23 parties $\frac{15a}{23}$ seront à b , et $\frac{8a}{23}$ à c .

Supposons de plus, que b gagne aussi le second coup, il ne luy restera qu'un à gagner, et à son adversaire encor trois, donc les manieres estant comme 3 à 1, et la raison reciproque des coups aussi comme 3 à 1. Les apprences seront comme 9 à 1, c'est à dire b aura $\frac{9a}{10}$, et c , $\frac{a}{10}$ de la somme. Si b avoit perdu le second coup tout seroit revenu à l'égalité.

Supposons maintenant que b perde le 3^{me} coup, car s'il gagne il a a tout entier. S'il perd, il luy reste 1 coup à gagner, et à son adversaire il en reste deux. Les manieres comme 2 à 1, et les coups de même donc les avantages comme 4 à 1, et b aura $\frac{4a}{5}$ et c , $\frac{a}{5}$. Voila tous les cas possibles à trois jeux. Pour examiner cela, voyons si le même proviendroit, en supposant qu'un homme b , gagne trois coups de suite; et qu'on luy paye chaque foy, ce qu'il peut avoir gagné de droit par ce coup. Le premier coup luy donne $\frac{15a}{23}$

2 voyons (1) qvel (2) quelle apparence il y a, qv (3) combien L 2 emporte les (1) trois (2)
 deux L 3 faut qve (1) celuy (2) b L 8 composée, c'est à dire (1) comme 10 à (5) (2) de $\frac{5}{4} L$
 9 $\frac{15|a\ erg.|}{23} \dots \frac{8|a\ erg.|}{23} L$ 11 donc (1) le nombre des manieres (2) les manieres L 13 Si (1)
 j'avois (2) b avoit L 14 f. l'égalité. — (1) de plus (2) Supposons L 18 $\frac{a}{5}$. (1) Ecce omnes casus
 possibles in tre (2) voila L 19 b erg. L

et à son adversaire $\frac{8a}{23}$, dont prenant $\frac{7a}{23}$ preferablement et laissant $\frac{8a}{23}$ au jeu, aussi bien que son adversaire, il restera au jeu $\frac{16a}{23}$. Et c'est comme si l'on avoit proposé à gagner $\frac{16a}{23}$ à deux en sorte que l'un fut obligé à gagner 2 coups, l'autre à gagner trois pour l'emporter. Mais je voy apresent que ce seroit injuste comme cela, car ayant payé à celuy qui a gagné l'avantage qu'il a eu sur l'autre, il ne faut pas luy laisser encor de l'avantage, c'est pourquoi il faut que l'un gagne autant de fois que l'autre. Et on peut dire que celuy qui a gagné renonce à son coup, en recevant ce que je viens de dire. Et puisque ils sont rendus égaux, il s'agit de sçavoir, s'il faut faire en sorte que tous deux soyent obligez de gagner le residu en trois coups; ou tous deux en deux coups. Je dis que cela n'importe. Et selon la justice puisque ils sont égaux, c'est à eux de choisir la maniere qui leur plaist. Donc si encor tous deux s'obligeoient à gagner trois coups, et si on payoit tousjours son coup, à celuy qui gagneroit, continuant cecy à l'infini; la somme de toutes ses fractions infinies doit estre egale à la somme proposée toute entiere. Si tous deux s'obligeoient à gagner seulement deux coups; et b gagne le premier, il ne luy reste qu'un coup, et deux à son adversaire, donc les manieres et les coups estant doubles; l'avantage e[s]t quadruple,

et par ce second coup, b aura sur $\frac{16a}{23}$ qui reste au jeu, que nous appellerons (a) , $\frac{4(a)}{5}$, et $c \frac{1(a)}{5}$. Donc, b prendra preferablement $\frac{3(a)}{5}$, et il restera au jeu $\frac{2(a)}{5} \sqcap \frac{32a}{5, 23}$, le quel appartient à tous deux également. Si on les obligeoit de jouer tousjours à trois coups, et

1 f. adversaire $\frac{8|a erg. Hrsg. |}{23}, \dots \frac{7|a erg. |}{23} \dots \frac{8|a erg. Hrsg. |}{23} \dots \frac{16|a erg. |}{23}$ (1) dont gagnant le second coup (2) Et $L = 3$ obligé a (1) jouer (2) gagner $L = 4$ ayant (1) donné a celuy qvi (2) payé $L = 7$ dire. (1) Et il s'agit de sçavoir si selo (2) Et puisqve $L = 15$ et les (1) nombres (2) coups L

9 n'importe: Während die Entscheidung für zwei weitere Spielrunden (und anschließend eine einzelne Runde) ein Modell für das Spiel mit drei Gewinnrunden liefern kann, impliziert die Entscheidung für drei weitere Runden einen von der ursprünglichen Spielidee deutlich abweichenden, unendlichen Spielverlauf. 12 l'infini: Dieser Spielmodus entspricht letztlich dem auf S. 29 Z. 18 – S. 30 Z. 1 entwickelten Ansatz unter Ausweitung auf unendlich viele Spiele. 15 manieres: Leibniz wendet erneut seine zweite Teilungsregel an, ersetzt nun aber den Begriff *possibilité* durch *maniere*, und anstelle von *facilité* oder *difficulté* spricht er nun einfach von den benötigten *coups*.

de vendre tousjours le coup; b gagnant tousjours, il auroit premierement $\frac{15a}{23}$, et $\frac{15(a)}{23}$.

Sed si (a) □ $\frac{16a}{23}$, et $\frac{15((a))}{23}$, si ((a)) □ $\frac{16(a)}{23}$ sive ((a)) □ $\frac{16, 16a}{23, 23}$, et ainsi: b auroit

eu $\frac{15a}{23} + \frac{15}{23}, \sim \frac{16a}{23} + \frac{15}{23} \sim \frac{16, 16a}{23, 23}$, et ainsi en progression geometrique perpetuelle

à l'infini. Donc b gagnant tousjours; la difference de son gain, et du tout deviendroit
moindre qu'aucune grandeur assignable, c'est à dire il gagneroit tout dans un temps

infini. Or la somme de 1. $\frac{16}{23} \cdot \frac{16^2}{23^2} \text{ etc. est geometricae seriei } \frac{1}{1-y} \sqcap 1+y+y^2+y^3 \text{ etc.}$

Ergo 1. $\frac{16^1}{23^1} \cdot \frac{16^2}{23^2} \text{ etc. } \sqcap \frac{1}{1-\frac{16}{23}} \sqcap \frac{23}{7}$. Jam $\frac{23}{7} \sim \frac{15a}{23} \sqcap \frac{15a}{7} \sqcap 2a + \frac{a}{7}$. Donc b gagneroit

plus qu'il n'y a à gagner, ce qui est absurd, donc le principe l'est aussi. Ou il faut qu'il
aye une erreur dans le calcul. Ce que je trouve aussi.

10

7. Janvier 1676.

Partie III^{me}

Ce qui est aussi car b a premièrement preferablement non pas $\frac{15a}{23}$, mais $\frac{7a}{23}$. Il reste
 $\frac{16a}{23} \sqcap (a)$. De (a) il gagne de même $\frac{7(a)}{23} \sqcap \frac{7, 16a}{23, 23}$, et il reste $\frac{16(a)}{23} \sqcap \frac{16, 16a}{23, 23} \sqcap ((a))$.
Au troisième coup, b gagne, $\frac{7((a))}{23} \sqcap \frac{7, 16, 16a}{23, 23, 23}$, et il reste $\frac{16((a))}{23} \sqcap \frac{16, 16, 16a}{23, 23, 23}$, etc.

9 Am unteren Seitenrand: Voyez Partie III^{me} 7. Janvier 1676

1 $\frac{15(a)}{23 | a \text{ streicht Hrsg.}} L$ 2 $\frac{16, 16a}{23, 23 | a \text{ streicht Hrsg.}} L$ 3 eu erg. L 4 donc (1) | la
nicht gestr. | differ (2) b gagnant L 5 dans (1) toute l'éternité (2) un temps L 7 $\frac{23}{7} \sim \frac{15a}{23} \sqcap (1)$
 $\frac{15}{7} \sqcap 2\frac{1}{7} (2) \frac{15a}{7} \sqcap 2a + \frac{a}{7} L$ 14 gagne, (1) non pas (2) $\frac{7((a))}{23} L$

Ainsi les gains continuels estant la progression geometrique 1. $\frac{16}{23} \cdot \frac{16,16}{23,23} \cdot \frac{16^3}{23^3}$ etc. $\sqcap \frac{23}{7}$

multipliée par $\frac{7a}{23}$, c'est à dire a . Ainsi b gagnant toujours à l'infini gagnera a tout entier.

Cette methode sert à trouver une infinité de fractions de tout autre égales à des fractions en progression géométrique. Car on peut faire croître continuellement le nombre des jeux il faut jouer. Cependant tout ceci ne me donne pas encore une marque dont je puisse juger de la bonté de ma supposition; et de la méthode dont je me sers de calculer.

Et il faut réver s'il n'y a point d'autre méthode qui nous mène à la même connoissance. C'est pourquoi commençons des cas le[s] plus simples: a argent mis au jeu. Joueurs, b et c . Celuy gagnera a qui aura fait le premier deux coups. Supposons que b gagne un coup, et supposons qu'il gagne par là l . C'est à dire, qu'il luy faut payer l ,

pour luy payer son droit acquis. Preferablement, le reste demeurant au jeu, sera $a - l$,

dont il luy appartiendra la moitié, savoir $\frac{a - l}{2}$. Or $\frac{a - l}{2} + l \sqcap \frac{a + l}{2}$, donc son droit sur

toute la masse sera $\frac{a + l}{2}$. Si son adversaire gagne le second coup, il est manifeste, qu'il

acquerra tout autant de droit sur toute la masse, car il n'importe pas lequel des deux a fait le premier 1 coup, par ce qu'il importera seulement de savoir lequel de deux aura

le premier deux coups; dont le droit de c sera aussi $\frac{a + l}{2}$. Or $\frac{a + l}{2} + \frac{a + l}{2} \sqcap a$, car leurs

droits joints ensemble font le droit tout entier dont $l \sqcap \frac{a}{4}$.

3 sert à (1) prouver (2) trouver $L = 10$ coup. (1) il est manifeste s'il gagne encore 1. coup, (2) et supposons $L = 10$ par la (1) (1) (2) 1 $L = 11$ acquis. (1) il s'agit de savoir la valeur de l . il (a) luy (b) est manifeste qu'il luy faut un coup, encore pour avoir (2) Si c gagne le deuxième coup, il gagne le même droit qu'avait b . (3) préférablement $L = 17$ droits (1) sont égaux; dont 1 $\sqcap \frac{a}{4}$ (2) joints $L = 11$ demeurant: Diese Definition von l oder *lucrum* weicht von der ursprünglichen in S. 29 Z. 18 f. ab. Während l dort den Gewinnanteil meint, den der Verlierer einer Runde theoretisch an deren Gewinner zu entrichten hätte, steht es hier für den Anteil, welchen der Rundensieger entnehmen könnte, so dass beide Spieler gleiche Anteile zu dem im Spiel verbleibenden Einsatz beisteuern (vgl. S. 43 Z. 1 f.). Dieses *lucrum* ist doppelt so groß wie jenes.

11 demeurant: Diese Definition von l oder *lucrum* weicht von der ursprünglichen in S. 29 Z. 18 f. ab. Während l dort den Gewinnanteil meint, den der Verlierer einer Runde theoretisch an deren Gewinner zu entrichten hätte, steht es hier für den Anteil, welchen der Rundensieger entnehmen könnte, so dass beide Spieler gleiche Anteile zu dem im Spiel verbleibenden Einsatz beisteuern (vgl. S. 43 Z. 1 f.). Dieses *lucrum* ist doppelt so groß wie jenes.

Donc nous avons une solution parfaite du premier cas, lors qu'on joue à deux coups. Selon l'autre methode ayant gagné 1 coup, il vous n'en faut qu'un, et il en faut 2 à vostre adversaire, donc vostre avantage est double; de même il est encor double par une autre raison, parce que vous avez deux manieres, et luy n'en a qu'une. Donc vostre avantage

5 est quadruple du sien, dont il appartient à vous, Monsieur b, la $\frac{4}{5}$ et à c $\frac{1}{5}$, au lieu qu'au

paravant nous avons prouvé, qu'il appartient à b, la somme $\frac{a+l}{2} \sqcap \frac{a+\frac{4}{4}}{2} \sqcap \frac{5}{8} [a]$. Or

la methode posterieure est demonstrative et convaincante, et ne laisse point de doute;

venons au jeu à 3 coups. b gagne 1 coup, son droit acquis $\frac{a+l}{2}$. Si c gagne autant son

droit acquis est égal sçavoir $\frac{a+l}{2}$, donc $l \sqcap \frac{a}{4}$. Si b gagne 2 coups il aura gagné $l + (l) \sqcap L$,

10 et il aura encor $\frac{a-L}{2}$. Or $\frac{a-L}{2} + L \sqcap \frac{a+L}{2}$. Si son adversaire gagne aussi deux coups,

3 Am Rande: $\begin{array}{c|cc} b & cc \\ \hline bc & \end{array}$

7 Am Rande: *imo error ut statim sequitur*

1 lors qv'on (1) gagne (2) joue L 2 gagné (1) 2 coups (2) 1. | coups ändert Hrsg. | , il L

5 vous, (1) b; (2) Monsieur b, ... à (a) luy (b) c L 9 il (1) restera $\frac{a-L}{2}$. ou a (2) aura L

29,17 $l \sqcap \frac{a}{4}$: Aus $\frac{a+l}{2} + \frac{a+l}{2} = a$ ergibt sich richtig gerechnet $l = 0$, was kein sinnvolles Ergebnis ist. Es kommt dadurch zustande, dass nach der zweiten Runde der Zugewinn des einen Spielers dem anderen nicht abgezogen wird, so dass beiden Spielern, obwohl der Gesamtgewinn a konstant ist, ein Gewinn gegenüber dem Stand bei Spielbeginn zugesprochen wird. Dieser in Z. 9 und in S. 47 Z. 1 erneut begangene Fehler belastet die weiteren Überlegungen des Stückes. Korrigiert man ihn, so erhält man die Gleichung $\frac{a}{2} + \frac{a}{2} = a$, aus der sich keine Aussage über die Größe l ableiten lässt. Tatsächlich hängt l von der vorgeschlagenen Teilungsregel ab und lässt sich nicht umgekehrt dazu nutzen, eine solche zu finden. Sofern man l im zuerst definierten Sinn versteht (vgl. S. 29 Z. 18 f.), beträgt im gewählten Beispiel sowohl bei einer Aufteilung gemäß der ersten Leibniz'schen Teilungsregel als auch bei Anwenden der Regel von Pascal und Fermat der Zugewinn durch jede gewonnene Runde tatsächlich $l = \frac{a}{4}$.

il aura aussi $\frac{a+L}{2}$. Or $\frac{a+L}{2} + \frac{a+L}{2} \sqsupseteq a$. Donc $L \sqsupseteq \frac{a}{4}$. Or $L \sqsupseteq l + (l)$, et $l \sqsupseteq \frac{a}{4}$. Donc $L \sqsupseteq \frac{a}{4} + (l)$. Or $L \sqsupseteq \frac{a}{4}$. Donc $\frac{a}{4} + (l) \sqsupseteq \frac{a}{4}$. Donc $(l) \sqsupseteq 0$, ce qui est absurd. D'où il s'ensuit que ce droit acquis ou cet l est une chose impossible ou chimere, estant pris absolument, sans relation aux jeux qui restent à jouer. Cependant ce n'est pas repondre *in forma* à l'objection. Et il s'ensuit necessairement que b n'a pas plus acquis par 2 coups, que par un. Tout ce qu'on peut repondre à cela, c'est de nier que les droits de tous deux joints ensemble, fasse[nt] le droit sur toute la masse. Par ce que selon le droit du jeu, ils sont obligez de jouer 6 jeux. Et il faut concevoir comme si un troisième leur avoit mis cet argent à jouer. Cet argent ne sera pas à eux qu'en cas, qu'ils le gagnent, et s'ils sont interrompus il ne leur appartient que l'avantage qu'ils ont acquis par leurs jeux; et celuy qui a mis l'argent reprendra le reste. Cependant il est vray aussi, que lorsque tous deux ont mis l'argent, en cas de rupture; leurs droits joints ensemble font le droit tout entier. Cependant on peut aussi former la question en sorte, qu'un troisième propose [un] prix, et leur commande de jouer autant de coups de suite, qu'il faut pour gagner; un accident les empêchant de continuer, il est assuré qu'ils ont acquis quelque droit, et que l'équité veut qu'ils en tirent quelque avantage quoique à la rigueur; le proposant puisse dire qu'il a demandé la condition tout entière. Il peut pourtant aussi s'obliger de leur laisser en cas d'interruption l'avantage qu'on leur pourra attribuer. Estant proposants eux mêmes on les peut considerer neantmoins comme un troisième quant à cet égard, et raisonner tout de même.

5

10

15

20

3 acquis (1) absolument (2) ou (a) ce (b) cet L 14 jouer (1) 6 coups (2) autant L 16 rigueur;
(1) il puisse dire, que (2) le proposant L

8 6 jeux: Unter diesen Voraussetzungen sind maximal fünf Runden zu spielen.

8. FRACTIONES SEXAGENARIAE

[Mitte 1674 – Ende 1676]

Überlieferung: L Notiz: LH 35 III A 26 Bl. 17. Unregelmässig zugeschnittenes Fragment,
ca 10 cm × 9 cm. Text auf Bl. 17r°, rückseitig 1 Z. mit dem Titel.

5 Cc 2, Nr. 00

Datierungsgründe: Leibniz beschäftigt sich in der vorliegenden Notiz mit den rechnerischen Grundlagen des Sexagesimalsystems. Hierbei knüpft er an Überlegungen an, die er in N. 9, welches dem gleichen Gegenstand gewidmet ist, entwickelt hat. Es darf daher vermutet werden, dass die Notiz kurz nach N. 9 entstanden ist. Da dieses Stück wahrscheinlich im Zeitraum zwischen Mitte 1674 und Ende 1676 10 verfasst worden ist, wird das Gleiche auch für die vorliegende Notiz angenommen. **Die Gegenstücke zu den unregelmäßigen Schnittkanten des Papierfragmentes, auf welchem die Notiz niedergeschrieben ist, sind bislang noch nicht gefunden worden; eine automatisierte Suche im Rahmen des beantragten Projektes zur digitalen Rekonstruktion von Textzusammenhängen bei Leibniz erscheint hier vielversprechend. Aus ihren Resultaten können sich neue Hinweise zur Datierung ergeben. [noch]**

Fractiones sexagenariae

$$\frac{13}{60} + \frac{24}{60^2} + \frac{15}{60^3}$$

$$\begin{array}{rcc} 13 & 24 \\ 36 & 6 \end{array}$$

20 Pour reduire les primes et secondes aux troisiesmes, c'e[s]t à dire pour reduire les fractions sexagénaires à un même dénominateur, il faut multiplier les primes par 36, les

16 Fractiones sexagenariae erg. L auf Bl. 17v°

17 $\frac{13}{60} + \frac{24}{60^2} + \frac{15}{60^3}$: Vgl. diesen Ausdruck mit der Summe $\frac{2}{60} [+] \frac{1}{3600} [+] \frac{7}{216000}$, welche Leibniz in N. 9 S. 56 Z. 3 betrachtet. 21 Denominator: Mit dem beschriebenen Verfahren rechnet man eigentlich eine dreistellige Sexagesimalzahl, so wie in N. 9 gefordert, in eine Dezimalzahl um: Man multipliziert die erste Stelle mit 36 und die zweite mit 6. Um die drei oben genannten Brüche auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, ist dagegen der erste Bruch mit 3600 zu erweitern und der zweite mit 60. Die zum Gleichnamigmachen erforderlichen Nullen fügt Leibniz dem Ergebnis der Nebenrechnung zu S. 49 Z. 2 f. nachträglich noch hinzu, lässt den Haupttext aber unverändert.

secondes par 6, les 3^{mes} par 1. Multiplier par 36[,] c'est multiplier par $40 - 4$, multiplier par 6, c'est multiplier par $4 + \frac{4}{2}$. *Ergo primae multiplicentur per 4[,] producto adjiciatur 0, et inde detrahatur ipsum productum, secundae multiplicentur per 4, producto addatur ipsius dimidium, sed brevius sufficit secundas multiplicari per 6.*

2 f. Nebenrechnung: 13

$$\begin{array}{r} 4 \\ \hline 520 \\ \hline 52 \\ \hline 46800 \end{array}$$

3 f. Gestrichene Nebenrechnung: 24 L 5–9 Gestrichene Nebenrechnung: (1) 13 (2) 13 L

$$\begin{array}{r} 4 \\ \hline 96 \\ 48 \\ \hline 4 \end{array} \qquad \qquad \qquad \begin{array}{r} 40 \\ \hline 520 \\ 52 \\ \hline 468 \end{array} \qquad \qquad \qquad \begin{array}{r} 4 \\ \hline 520 \\ 52 \\ \hline 46800 \end{array}$$

9. MULTIPLICATIO NUMERORUM SEXAGESIMALIUM

[Mitte 1674 – Ende 1676]

Überlieferung: L Notiz: LH 35 VIII 30 Bl. 27. 1 Bl. 4°. 1 S. auf Bl. 27 v°, Vorderseite leer.

Cc 2, Nr. 00

5 Datierungsgründe: Der Gegenstand des Stückes — ein Verfahren zur Multiplikation einer im Sexagesimalsystem ausgedrückten dreistelligen Zahl mit einem unechten Bruch — legt nahe, dass es in zeitlicher Nähe zu N. 8 entstanden ist. Leibniz nimmt seine Aufgabe offenkundig in Angriff, bevor er sich näher mit Stellenwertsystemen befasst hat; dies belegt jedoch nur, dass er das Stück vor März 1679 abgefasst hat. Einen genauereren Hinweis liefert das Papier: Es stammt aus Paris, und sein Wasserzeichen
 10 ähnelt anderen Wasserzeichen, die vor allem in der frühen Pariser Zeit auftreten. Auch der Symbolgebrauch gibt einen Hinweis in diese Richtung: Ganz überwiegend setzt Leibniz als Gleichheitssymbol das Zeichen f ein, teils in einer leicht stilisierten Form, teils als simples handschriftliches f . Diese letztere Variante kommt überwiegend, allerdings nicht ausschließlich, bis Anfang 1673 vor. Die dreimalige Verwendung des Gleichheitssymbols \sqcap dagegen spricht unzweideutig für eine Niederschrift nach Mitte 1674.
 15 Somit ist gesichert, dass das Stück in Paris verfasst worden ist; trotz der Hinweise auf eine Entstehung zu Beginn der Pariser Zeit gibt der Gebrauch des stilisierten Waagebalkens letztlich den Ausschlag für den *terminus post quem* Mitte 1674.

[Erster Ansatz]

$$\begin{array}{rccccc}
 13 & \underline{\quad} & 19 & // & 7 & \underline{\quad} & 17 \\
 & & \frac{19}{6} & \frac{3}{2} & \frac{7}{6} & & \frac{17}{13} f 1 + \frac{4}{13} \\
 20 & & 3\frac{1}{6} & 1\frac{1}{2} & 1\frac{1}{6} & \text{vel} & \frac{1}{6} 3 1 f 2 1 \frac{5}{[6]}
 \end{array}$$

$$20 \text{ Nebenrechnung: } \frac{10}{\underline{\underline{6}}} = \frac{5}{3} \sqcap^2 \text{ [bricht ab]}$$

$$19 \cdot 13 - (1) 14, 13, 18 \cdot (2) 19 // 9 // 7 L \quad 21 3\frac{1}{6} (1) 2\frac{1}{2} (2) 1\frac{1}{2} L$$

21 13 1: Der Status von Zahlen wie dieser als Sexagesimal- oder Dezimalzahl ist für Leibniz nicht eindeutig festgelegt, was er durch (allerdings nicht ganz konsequent durchgeföhrte) Gesperrtschreibung der Ziffern andeutet. Bei Zahlen, die er als eindeutig hexagesimal ausgedrückt verstanden wissen will, trennt er dagegen die Stellen in der Regel durch Kommata voneinander ab — insbesondere, wenn es sich bei mindestens einer ihrer Ziffern um eine im Dezimalsystem notierte zweistellige Zahl handelt.

$$\begin{array}{r} 12 \frac{4}{6} \\ \hline 13 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4 + \frac{4}{2} \\ \hline 13 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4 + \frac{4}{6} \\ \hline 13 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 2 1 \\ 2 1 \\ \hline 3 4 2 \frac{5}{6} \end{array} \sim 1 + \frac{4}{13}$$

$$\begin{array}{r} 76 \\ \hline 13^{\wedge} 6 \end{array} \quad \begin{array}{r} 120 \\ \hline 13^{\wedge} 6 \end{array} \quad \begin{array}{r} 28 \\ \hline 13^{\wedge} 6 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 4 2 \\ 1 0 5 \\ \hline 4 4 7 \frac{19}{39} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 76 \\ 120 \\ 28 \\ \hline 8828 \\ \hline 13^{\wedge} 6 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4414 \\ \hline 13^{\wedge} 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1471 \\ \hline 13 \end{array} + \begin{array}{r} 1 \\ \hline 13^{\wedge} 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ 56 \\ 114 \\ \hline 39 \\ 2 \\ 36 \\ \hline 12 \\ 13 \end{array}$$

1 Nebenrechnung: $\begin{array}{r} 13 \\ 1368 \\ 1333 \\ \hline 11 \end{array} \not\mid 105 \quad \begin{array}{r} 18+20 \\ 6^{\wedge} 13 \\ \hline 38 \end{array} \quad \begin{array}{r} 38 \\ 78 \\ \hline 39 \end{array}$

2 $\begin{array}{r} 76 \\ \hline 13^{\wedge} 6 \end{array}$ (1) $\begin{array}{r} 140 \\ \hline 13^{\wedge} 6 \end{array}$ (2) $\begin{array}{r} 120 \\ \hline 13^{\wedge} 6 \end{array}$ L 4 105 (1) $\begin{array}{r} 3 \\ \hline 13 \end{array}$ + $\begin{array}{r} 20 \\ 6^{\wedge} 13 \end{array}$ (2) $\begin{array}{r} 18+20 \\ 6^{\wedge} 13 \end{array}$ L

1 3 2 1 : Hier ist die Korrektur in der Zeile zuvor nicht berücksichtigt; folgerichtig wäre 3 1 1 .

2 $\begin{array}{r} 120 \\ \hline 13^{\wedge} 6 \end{array}$: Folgerichtig wäre $\begin{array}{r} 36 \\ \hline 13^{\wedge} 6 \end{array}$. 2 4 4 7 $\begin{array}{r} 19 \\ \hline 39 \end{array}$: Bei der Addition von $3 4 2 \frac{5}{6}$ mit $1 0 5 \frac{19}{39}$ ist der

Bruchanteil des ersten Summanden verloren gegangen. 3 24, 24, 28: Das gesuchte Produkt der Sexagesimalzahl $(19, 9, 7)_{60}$ mit dem unechten Bruch $\frac{17}{13}$ ist $(25, 2, 41 \frac{6}{13})_{60}$. Dass die in der rechten Spalte fortgeführte Berechnung zum falschen Ergebnis $(24, 24, 30 \frac{12}{13})_{60}$ führt, ist nicht nur auf Rechenfehler zurückzuführen, sondern grundsätzlich in dem Verfahren begründet, welches Leibniz im vorliegenden Stück ausprobiert: Er behandelt beim Rechnen mit Sexagesimalzahlen diese in einzelnen Rechenschritten wie Dezimalzahlen. Offenbar fühlt er sich hierzu berechtigt, da er eingangs eine Division durch 6 durchführt und am Ende der Rechnung wieder mit 6 multipliziert. Im vorliegenden Ansatz etwa teilt Leibniz im ersten Schritt tatsächlich nicht die Sexagesimalzahl $(19, 9, 7)_{60}$ durch 6, sondern die Dezimalzahl 1997. Sein (nicht ganz korrektes) Ergebnis $3 4 2 \frac{5}{6}$ multipliziert er sodann wie eine gewöhnliche Dezimalzahl mit $\frac{17}{13}$.

Erst bei der abschließenden Wiederversechsfachung seines (ebenfalls nicht korrekten) Produktes $4 4 7 \frac{19}{39}$ behandelt er dessen Ziffern wie jene einer im Sexagesimalsystem geschriebenen Zahl. Tatsächlich kann ein solches Verfahren keine Umrechnung vom Sexagesimal- ins Dezimalsystem und zurück leisten; es führt im Allgemeinen zu fehlerhaften Resultaten.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 142 \\ 1471 \not f 113 + \frac{7}{13^3} \\ 1333 \\ \hline 11 \end{array}$$

Ergo productum,

$$\begin{array}{r} 4, \quad 3, \quad 6: \quad \frac{20}{39} \\ \hline & & & 6 \\ & 24 & 18 & 36 & \frac{33}{120} \\ & 0 & 0 & 3 & \frac{39}{\hline} \\ \hline & 24, & 18, & 39 & \frac{3}{39} \Big| \frac{1}{13} \end{array}$$

[Zweiter Ansatz]

$$\begin{array}{r} 13 \text{ ——— } 19, \quad \frac{3}{9}, \quad \frac{3}{7} \text{ ——— } 17 \\ \hline 5 \quad \quad \quad \frac{3}{1} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{6} \\ \hline \emptyset \quad \frac{6}{6} \quad \emptyset \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad \text{Nebenrechnungen:} \quad \frac{140}{60} \Big| \frac{14}{6} \Big| \frac{7}{3} \wedge 17 \quad \frac{7 + \boxed{7 \wedge 13}}{13^3} 91 \sqcap \frac{98}{13^3} \Big| \frac{98}{39} \not f 2 \Big[\frac{20}{39} \Big] \\ 4 \quad \text{Nebenrechnung:} \quad \frac{17}{13} \not f 1 \frac{4}{13} \end{array}$$

$$11 \mid \frac{13}{13} \text{ ändert Hrsg.} \mid \not f 1 \frac{4}{13} L$$

2 24, 18, 39: Auch das Ergebnis $(24, 18, 39 \frac{1}{13})_{60}$ ist aus den genannten Gründen — diversen Rechenfehlern sowie der unzulässigen Behandlung von Sexagesimal- als Dezimalzahlen — nicht korrekt.

$$\begin{array}{r}
 1\ 8\ 6\ 6 \\
 1\ 3\ 1 \\
 \hline
 1\ 9\ 9\ 7 \\
 6 \quad \text{f} \ 3\ 3\ 3 - \frac{1}{6} \curvearrowleft \frac{17}{13} \Big| 1\ \frac{4}{13} \\
 \hline
 4 \\
 \begin{array}{r}
 16 \\
 1332 \text{ f} \ 102 \left[\frac{36-4}{13 \curvearrowleft 6} \right] \\
 1333 \\
 11
 \end{array} \\
 \hline
 3\ 3\ 3 - \frac{1}{6} \\
 1\ 0\ 2 + \frac{16}{39} \\
 \hline
 4\ 3\ 5
 \end{array}$$

[Dritter Ansatz]

$$\begin{array}{r}
 13 \text{ ——— } 19, \quad \frac{\prime}{9}, \quad \frac{\prime\prime}{7} \text{ ——— } 17 \quad \mid \quad \frac{17}{13} \sqcap 1 + \frac{4}{13} \quad 5 \\
 \\
 13) \overline{1997}^4 \text{ f } 614 \frac{6}{13} \quad \quad \quad \frac{1997}{1} \\
 \overline{7988}^4 \\
 \overline{1156} \\
 1 \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 2611 \\
 23 \\
 \hline
 2611 \frac{6}{13}
 \end{array}
 \end{array}$$

3 4 3 5 : Die Rechnung des zweiten Ansatzes wird konsequent und fehlerfrei im Dezimalsystem durchgeführt. Ihr Resultat $4 3 5 \frac{19}{78}$ würde mit 6 multipliziert $(24, 18, 31 \frac{18}{39})_{60}$ ergeben; auch dies ist nicht das korrekte Ergebnis.

$6 \frac{1997}{4}$: Im dritten und vierten Ansatz verändert Leibniz nun die Reihenfolge der Rechenschritte: Zunächst wird die dezimale Multiplikation von 1997 mit $\frac{17}{13}$ durchgeführt, erst danach folgt die dezimale Division durch 6 und die Wiederversechsfachung im Sexagesimalsystem.

$$\begin{array}{r} 4 \ 3 \ 5 \ \frac{2}{13} \\ \hline 24, \ 18, \ 30 \ \frac{12}{13} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \ 3 \ 5 \ \frac{2}{13} \\ \hline 24, \ 18, \ 30 \ \frac{6}{13} \end{array}$$

[Vierter Ansatz]

$$13 \quad \underline{\quad 19 + 9 + 7 \quad} \quad 17$$

$$\begin{array}{r} 17 \\ \hline 2 \ 6 \ 4 \\ 139 \ 7 \ 5 \\ 133 \ 3 \\ \hline 11 \ 1 \end{array}$$

5

$$\begin{array}{r} 13979 \\ 1997 \\ \hline 33949 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1997 \\ 17 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17116 \\ 33949 \ f \ 2611 \frac{6}{13} \\ 13333 \\ \hline 111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17116 \\ 33949 \ f \ 2611 \frac{6}{13} \\ 13333 \\ \hline 111 \end{array}$$

4 Isoliert und ohne direkten Bezug: 19 9 7

7 Randnotiz mit aus S. 55 Z. 5 bezogener Ergänzung: $33949 \frac{6}{13} + \frac{19}{26}$

7 Gestrichene Nebenbetrachtung: $\cancel{33949} \ f \ 5658 \ L \quad 9 + \frac{19}{26} \ erg. \ L$

1 $4 \ 3 \ 5 \ \frac{2}{13}$: Konsequent gerechnet lautet das Zwischenergebnis nach der Division $4 \ 3 \ 5 \ \frac{19}{78}$. Der Fehler beeinträchtigt im links dargestellten Rechengang das Endergebnis in der folgenden Zeile. Das rechts stehende Endergebnis dagegen verwendet stillschweigend den korrekten Wert des Bruchanteils, vernachlässigt jedoch einen Einerübertrag; folgerichtig gerechnet ergibt sich $(24, 18, 31 \frac{6}{13})_{60}$ (vgl. auch den vierten Ansatz, S. 55 Z. 3, rechts). 5 1 0 7 5 : Versehentlich teilt Leibniz hier das Siebenfache anstelle des Siebzehnfachen von 1997 durch 13. Er erkennt den Irrtum und setzt neu an.

$$\begin{array}{rcl}
 \begin{array}{c} 23 \\ 2611 \\ 666 \end{array} & \frac{1}{13} & \begin{array}{c} 23 \\ 2611 \\ 66 \end{array} + \frac{6}{13} \\
 435\frac{1}{6} + \frac{1}{13} & & 435\frac{1}{6} + \frac{1}{13} \\
 \hline
 24, 18, 31\frac{1}{13} & & 24, 18, 31\frac{6}{13}
 \end{array}$$

[Fünfter Ansatz]

$$\begin{array}{rcl}
 26 & \text{———} & 1997 & \text{———} & 17 \\
 & & \frac{17}{13979} & & \frac{26}{26} \\
 & & 1997 & & \\
 & & \overline{33949} & \not| 1305 & \frac{19}{26} \\
 & & 2611 & & \\
 & & 7 & &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 & 217\frac{3}{6} \\
 \hline
 12, 6, 21\frac{18}{6} & | 3 & \\
 & \frac{3}{24} & \frac{19}{26} \\
 & &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} l \\ 1711 \\ 33949 \not| 1305 & \frac{19}{26} \\ 26666 \\ 222
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 143 & & \\
 1305 & \not| & 217\frac{3}{6} + \frac{19}{26} \\
 666 & & \\
 \hline
 12, 6, 45 & &
 \end{array}$$

5

10

$$9 \quad \text{Nebenbetrachtungen:} \quad \frac{38}{26} \not| 1\frac{12}{26} \quad \frac{19}{26} \quad \frac{3\frac{1}{6}}{26}$$

5 26: Im fünften Ansatz multipliziert Leibniz im ersten Schritt die Dezimalzahl 1997 nicht mehr mit $\frac{17}{13}$, sondern mit $\frac{17}{26}$ und verdoppelt dafür das Zwischenergebnis vor dessen Versechsfachung im letzten Schritt.

7 12, 6, 21: Richtig wäre 12, 6, 42. Leibniz korrigiert dies nicht, sondern setzt neu an.

$$\begin{array}{r} 2 \ 1 \ 7 \\ \hline 6 \\ \hline 12, \ 6, \ 42 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 4 \ 3 \ 4 \\ \hline 6 \\ \hline 24, \ 18, \ 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \hline 10 \\ 60 \\ \hline 100 \\ 3600 \\ \hline 1000 \\ 7 \\ 21600[0] \end{array}$$

[Sechster Ansatz]

5

$$\begin{array}{r} 19 \\ \hline 6 \\ \hline 1 \frac{1}{6} \end{array} \qquad \begin{array}{r} 9 \\ \hline 36 \\ \hline 4 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 7 \\ \hline 216 \\ \hline 27 \end{array} \left| \frac{1}{27} - \frac{1}{216} \right. \\ \begin{array}{r} 4 \\ \hline 6 \\ \hline 1 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 4 \\ \hline 27 \\ \hline 13 \end{array} - \frac{4}{216} \\ \begin{array}{r} 19 \\ \hline 6 \\ \hline 36 \\ \hline 216 \end{array}$$

3 Hilsrechnung:

$$\begin{array}{r} 3600 \\ \hline 6 \\ \hline 21600 \end{array}$$

6 Nebenrechnung:

$$\begin{array}{r} 2 \\ \cancel{2} \\ 8 \\ \cancel{8} \\ 6 \\ \cancel{6} \\ 1 \\ \cancel{1} \\ \hline 22 \end{array}$$

1 Gestrichene Nebenbetrachtung:

$$\begin{array}{r} 1 \\ \cancel{4} \\ 3 \\ \cancel{4} \\ 6 \\ \cancel{6} \\ , \\ 14 \end{array} \not\mid 7 \ 1 \frac{8}{6} \ L \qquad 2 \ (1) \ 24, \ (2) \ \frac{2}{10} \ L$$

3 $\frac{2}{60} \ \frac{1}{3600} \ \frac{7}{21600[0]}$: Leibniz vergewissert sich hier noch einmal der Bedeutung von Sexagesimalstellen und verwirft daraufhin die Ausgangsidee, eine Zahl vom Sexagesimal- ins Dezimalsystem zu transformieren, indem man die gesamte Zahl (also unterschiedslos jede Stelle) durch 6 teilt. In den folgenden Ansätzen differenziert er nun bei der Division zwischen den verschiedenen Stellen.

Richtig wäre $3\frac{1}{6}$. Der Fehler belastet die weitere Rechnung bis S. 57 Z. 2, nach welcher Leibniz noch einmal neu ansetzt.

$$\begin{array}{rcc}
 \boxed{\begin{array}{ccc}
 13\frac{13}{6} & \frac{13}{4} & \frac{13}{7} - \frac{13}{216} \\
 4\frac{4}{6} & 1 & \frac{4}{7} - \frac{4}{216} \\
 & & 17 \quad 17
 \end{array}}
 \\[10pt]
 3 + \frac{1}{6} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{7} - \frac{1}{216} \\
 \text{seu} \quad 39\frac{17}{6}, \quad \frac{17}{4}, \quad \frac{17}{7} - \frac{17}{216} (1)
 \end{array}$$

5

[Siebter Ansatz]

$$\begin{array}{cccccc}
 19 & 9 & 7 & \frac{19}{6} & \frac{9}{60} & \frac{9}{36} \\
 & & & \frac{19}{6} & \frac{9}{60} & \frac{9}{36} \\
 & & & \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 \frac{19}{6} & \frac{9}{6} & \frac{9}{36} \\
 \hline
 & & \frac{9}{36}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 \frac{19}{6} & \frac{9}{60} & \frac{9}{600} \\
 \hline
 & \frac{9}{600} & \frac{9}{6^{\wedge}6}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 24, \quad 3 \quad 31\frac{6}{13} \\
 \hline
 36
 \end{array}$$

10

$$5 \quad (1) \mid \text{seu nicht gestr.} \mid 9 \quad (2) \text{ seu } (a) 39\frac{13}{6}, \frac{13}{4}, \frac{13}{7} - \frac{13}{216} \quad (b) 39\frac{17}{6}, L \quad 7 \quad \frac{9}{60} \quad (1) \frac{9}{60} \quad (2) \frac{9}{36} \quad L$$

$$9 \quad (1) \frac{7}{600} \quad (2) \frac{9}{600} \quad L$$

5 $39\frac{17}{6}$: Leibniz multipliziert zunächst die vorangehende Zeile versehentlich mit 13 statt mit 17, korrigiert dies aber umgehend, wobei er allerdings vergisst, die 39 in 51 zu ändern. Zudem muss es $\frac{17}{27}$ anstatt $\frac{17}{7}$ heißen; dieser Fehler stammt aus Z. 1. Die Versehenen wirken sich nicht aus, da Leibniz die Rechnung abbricht. 10 24, 3: Leibniz probiert hier am Ergebnis des vierten Ansatzes (S. 55 Z. 3, rechts) die Division der zweiten Stelle durch 6 und die der dritten durch 36 aus.

[Achter Ansatz]

$$\begin{array}{r} 19 \\ \times 9 \\ \hline 17 \\ 42 \\ 6 \\ \hline 252 \\ 60 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 19 \\ \times 9 \\ \hline 17 \\ 60 \\ 420 \\ 6 \\ \hline 25200 \\ 450 \\ \hline 25650 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 25650 \\ 17 \\ \hline 17955 \\ 2565 \\ \hline 121 \\ 14753 \\ 43605 \not| 3354 \\ 13333 \\ 111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3354 \not| 55 : 54 \\ \hline 660 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & 25650 & & & & \\ & & \hline & & 17 & & \\ & & \hline & & 17955 & & \\ & & 2565 & & & & \\ & & \hline & & 2 & & \\ & & | & & & & \\ & & 140 & & & & \\ & & | & & & & \\ & & 43605 & \not| & 32 & nicht gestr. & \\ & & | & & 133 & & \\ & & | & & 1 & & \\ & & | & & & & \\ & & 132 & & & & \\ & & | & & & & \\ & & 14094 & & & & \\ & & | & & & & \\ & & 13333 & & & & \\ & & | & & & & \\ & & 111 & & & & \end{array} \quad \begin{array}{c} (1) \quad 19 \quad 9 \quad 7 \quad (2) \quad 19 \quad 9 \quad 7 \quad L \quad 3 \quad (1) \\ \hline 54 \quad 54 \quad 54 \quad | \quad 42 \quad 42 \quad 6 \quad | \quad 252 \quad 60 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccccc} & & 8 & & 2 & & 121 & & \\ & & | & & | & & | & & \\ & & 100 & & 140 & & 14753 & & \\ & & | & & | & & | & & \\ & & 43605 & \not| & 32 & & 43605 & \not| & (a) 3254 \\ & & | & & 133 & & | & & \\ & & | & & 1 & & | & & \\ & & | & & & & | & & \\ & & 3 & & 2 & & 121 & & \\ & & | & & | & & | & & \\ & & 3276 & (b) 3277 & 43605 & \not| & 43605 & \not| & (a) 3254 \\ & & | & & | & & | & & \\ & & 6660 & | & 133 & & 133 & & \\ & & | & & 1 & & 1 & & \\ & & & & & & & & \end{array}$$

$$(b) 3354 \quad 3354 \not| \quad (aa) 54 \quad (bb) 55 : 54 \quad L$$

2 25200: Im achten Ansatz multipliziert Leibniz die dritte Stelle anstatt der ersten mit 3600, addiert aus unklarem Grunde 450 (womöglich denkt er an 540 als dem 60-fachen von 9) und führt sodann die Multiplikation mit $\frac{17}{13}$ durch, wobei eine Dezimalstelle verloren geht. Das Ergebnis der Multiplikation teilt er schließlich wieder durch 6 und beendet die Rechnung ohne brauchbares Resultat.

10. DE NUMERO JACTUUM IN TESSERIS

Januar 1676

Überlieferung: L Konzept: LH 35 III B 14 Bl. 1–2. 1 Bog. 2°. 4 S. — Auf Bl. 1 r° am oberen Rand Datum und Titel des Stückes. In der oberen Hälfte dieser Seite eine fragmentarische Notiz (s. u.), in der Seitenmitte vier Tabellen (= Teil 1 unseres Stückes). Auf dem Rest der Seite das Stück VII, 1 N. 89, um Notiz und Teil 1 herum gesetzt. Auf den drei anderen Seiten des Bogens Teil 2 und 3 unseres Stückes. — Gedr.: 1. BIERMANN, *Spezielle Untersuchungen*, 1956, S. 170 (tlw. = S. 63 Z. 2 – S. 64 Z. 7); 2. PARMENTIER, *L'estime des apparances*, 1995, S. 79 f. u. 88–101 (z.T. frz. Übers.); 3. (span. Übers.) LEIBNIZ, *Obras filosóficas y científicas*, Bd. 7 B, 2015, S. 659 f. u. 662–667.

5

10

Cc 2, Nr. 1281

Januar. 1676.

De numero jactuum in tesseris.
Proposuit mihi dux Roannesius

5 Fragmentarische Notiz inmitten des Textes:

15

$$A \left\{ \begin{matrix} 0 \\ C \left\{ \begin{matrix} 0 \\ B \left\{ \begin{matrix} 0 \\ D \left\{ \begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix} \right. \end{matrix} \right. \end{matrix} \right. \end{matrix} \right. \right. \right.$$

$$D \sqcap \frac{1}{2} \quad B \sqcap \frac{1}{4} \quad C \sqcap \frac{1}{8} \quad A \sqcap \frac{1}{16}$$

13 f. De numero ... Roannesius erg. L 17 D $\sqcap \frac{1}{2}$ B $\sqcap \frac{1}{4}$ gestr. L erg. Hrsg.

14 Roannesius: Gemeint ist Artus Gouffier (1627–1696), Herzog von Roannais, ein Vertrauter Blaises Pascals. 15 Notiz: Leibniz schreibt das Stück auf einem Papierbogen nieder, auf dessen erster Seite er bereits einen Gedanken zu einem anderen Thema notiert hat. Es handelt sich bei dieser inhaltlich nicht zum Stück gehörenden Notiz um ein spieltheoretisches Zerlegungsschema, das dem in N. 7 S. 31 Z. 9 festgehaltenen gleicht.

[Teil 1]

	1	2	3	4	5	6
5	1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
		2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
			3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
				4, 4	4, 5	4, 6
					5, 5	5, 6
						6, 6
10	1	2	3	4	5	6
	2	4	6	8	11	6
	22				17	

[Tab. 1]

1 Teil 1: Dieser Abschnitt behandelt offensichtlich das (allerdings erst auf S. 71 Z. 1–4 explizit formulierte) Würfelspielproblem, den gerechten, also an Gewinnchancen gleichen Einsatz zweier Spieler zu finden, wenn bei einem Wurf von einem, zwei, drei oder mehr Würfeln der eine Spieler darauf wettet, dass keine 6 fällt, der andere dagegen auf das Erscheinen mindestens einer 6 setzt. Es darf vermutet werden, dass es sich hierbei um das durch den Herzog von Roannais an Leibniz herangetragene Problem handelt.

12 Tab. 1: Leibniz befasst sich als erstes mit den möglichen Ausgängen eines Wurfs zweier nicht unterscheidbarer Würfel, in moderner Terminologie also mit Kombinationen mit Wiederholung. Die entsprechenden Ereignisse sind in diesem Falle jedoch ungleich wahrscheinlich, so dass sich das genannte Problem des „gerechten“ Einsatzes nicht lösen lässt, indem man die Anzahlen der verschiedenen Ausgänge bestimmt.

1	dez	a sans 6	b avec 6
2	...	(a)	(b)
3	...	$\overline{a, (a)}$	$\overline{(a) \cap b + (b) \cap a}$
4	...		

[Tab. 2]

5

5	Tab. 2: (1)	1 dez	5 sans 6	1 avec 6	(2)	1 dez	5 sans 6	1 avec 6
		2 ...	$\langle 6 \rangle$	$\langle 15 \rangle$		2 ...	15	6
		3 ...	$15^{\cap} 6, + 6^{\cap} 1$	$(a) 15, ^5 (b) 15^{\cap} 6$		3 ...	$\overline{5, 15}$	$\overline{15^{\cap} 1 + 6^{\cap} 5}$
		4 ...				4 ...		

(3)	1 dez	5a (sans 6)	1b avec 6	ändert Hrsg.	L
	2 ...	$\overline{15(a)}$	$\overline{6(b)}$		
	3 ...	$\overline{5a, 15(a)}$	$\overline{15(a) \cap 1b + 6(b) \cap 5a}$		
	4 ...				

5 Tab. 2: Leibniz nennt in dieser Tabelle zunächst konkrete Zahlen, ersetzt diese dann aber durch Buchstaben: a steht für 5, b für 1, (a) für 15 und (b) für 6. Er löscht die ursprünglichen Zahlenangaben nicht; der Lesbarkeit halber werden sie im Haupttext jedoch nicht wiedergegeben. Eine ähnliche Notation benutzt er auch in N. 7. Die Verwendung dieser Schreibweise ist wohl durch die Hoffnung motiviert, die Erkenntnisse verallgemeinern zu können: auf andere geeignete Spielgeräte wie etwa einen Oktaeder (also $a = 7$) oder auf andere Anzahlen an kritischen Ausgängen, z. B. auf die 1 *und* die 6 (also $b = 2$). Auch in dieser Tabelle betrachtet Leibniz Kombinationen mit Wiederholung, allerdings findet er nicht den richtigen Ansatz zur Berechnung ihrer Zahl. Tatsächlich ist beim Wurf von drei identischen Würfeln die Zahl an Ausgängen, in welchen eine 6 enthalten ist, gleich $(a) + (b)$, die der Ausgänge ohne 6 ist gleich $\frac{7}{3}(a)$, was sich für n Würfel zu den rekursiven Definitionen $a_n = \frac{n+4}{n} a_{n-1}$ und $b_n = a_{n-1} + b_{n-1}$ verallgemeinern lässt. Modern formuliert, gibt es beim Wurf von n nicht unterscheidbaren Würfeln $\binom{n+4}{5}$ verschiedene Ausgänge, die mindestens eine 6 enthalten, und $\binom{n+4}{4}$ Ausgänge ohne 6.

	0	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	3	4	5	6
3	1	3	6	10	15	
4	1	4	10	20		
5	1	5	15			
6	1	6				
7	1					

[Tab. 3]

		<i>A</i>						
10		0	1	2	3	4	5	6
	0	1						
	1	1	1					
	2	1	2	1				
	3	1	3	3	1			
15	B 4	1	4	C 6	4	1		
		1	5	10	10	5	1	
		1	6	15	20	15	6	1
		Unitez	Naturels	Vlaires	Pyram.	VV	VVP	PP

[Tab. 4]

9 Tab. 3: Leibniz will einer Lösung des Problems mit Hilfe des Arithmetischen Dreiecks näherkommen, wozu er dieses in zwei verschiedenen Gestalten notiert. Die in Tab. 3 gewählte Form findet sich auch in N. 36 S. 000; sie entspricht jener in Bl. PASCAL, *Traité de triangle arithmetique*, 1665 [Marg.], Ausklapptafel vor S. 1 (PO III, S. 446). — 19 Tab. 4: In Teil 2 arbeitet Leibniz mit dem Arithmetischen Dreieck in der hier gezeigten Form (vgl. S. 67 f.). — Ausgehend von Tab. 3 u. 4 setzt Leibniz auf derselben Seite zu einem zahlentheoretischen Exkurs an (VII, 1 N. 89), in welchem er eine Vermutung formuliert, die dem Kleinen Satz von Fermat sehr nahe kommt. Die beiden Tabellen gehören somit gleichermaßen zu VII, 1 N. 89 (wo sie auf S. 583 abgedruckt sind) und zum vorliegenden Stück.

[Teil 2]

1 Dez. 6 faces. a. b. c. d. e. f.

Faces de deux dez,

	aa	ba	ca	da	ea	fa
	ab	bb	cb	db	eb	fb
	ac	bc	cc	dc	ec	fc
	ad	bd	cd	dd	ed	fd
	ae	be	ce	de	ee	fe
	af	bf	cf	df	ef	ff

5

Il faut adjouter au nombre Triangulaire ou des Com2naisons la somme des choses,
et nous aurons le nombre des faces de deux dez.

10

2 f. a. b. c. d. e. f (1) Com2naisons de deux dez, 36. faces aa ab
 ab bb cc dd ee ff (2) Faces L
 ac bc
 ad bd
 ae be
 af bf

10 le | nombres ändert Hrsg. | des (1) formes (2) faces L

2 faces: Auch in Teil 2 untersucht Leibniz zunächst das Hilfsproblem, wieviele verschiedene Ausgänge es beim Wurf von mehreren identischen Würfeln gibt. Einen solchen Ausgang bezeichnet er auf französisch als *faces*, auf lateinisch als *facies*. 9 Com2naisons: Zu den Begriffen *com2naison* und *con3naison* vgl. N. 25 S. 159 Z. 21 – S. 160 Z. 2. Siehe auch das Beispiel in VII, 1 N. 89 S. 583 Z. 8 f. sowie die Definitionen, die Leibniz in seinem Handexemplar von Bl. PASCAL, *Traité de triangle arithmetique*, 1665 [Marg.], auf der Ausklapptafel vor S. 1 (PO III, S. 446) notiert. 10 deux dez: Mit Hilfe von Binomialkoeffizienten lässt sich diese korrekte Lösung des Hilfsproblems bei zwei Würfeln als $K_6^2 = 1\binom{6}{1} + 1\binom{6}{2}$ darstellen.

Pour les Faces de 3 dez, il faut chercher premierement toutes les varietez sans repetition qui sont le nombre pyramidal de 6. Il faut adjouter toutes les combinaisons doublees, par ce qu'on peut faire des faces de trois dez des combinaisons de choses, en supposans ou l'une ou l'autre des choses double.

5 Pour les faces de 4 dez. On prendra le nombre Triangulo-Triangulaire et on luy adjoutera une fois les choses, deux fois les combinaisons, trois fois les con3naisons.

Et ainsi de suite.

Mais lors que nous ne contons pas seulement les conjunctures, et lors que nous voulons distinguer les cas non seulement par les nombres $a. b. c. d. e. f$, mais encore 10 par les choses, c'est autre chose, et nous nous pouvons par exemple marquer ceux d'un des dez par $A. B. C. D. E. F$, ceux de l'autre par $a. b. c. d. e. f$, ainsi nous aurons:

1 Pour les (1) Con3naisons, (2) Faces $L = 3$ par ce qv' (1) il faut (2) on peut (a) faire des combi (b) faire ... dez, des (aa) combinaisons (bb) combinaisons | de choses erg. |, en $L = 6$ fois les (1) nombres; deux (2) choses, $L = 8$ seulement (1) les diversitez (2) les conjunctures L

1 f. varietez sans repetition: Hiermit ist die Zahl der Kombinationen ohne Wiederholung gemeint (nicht etwa die der Variationen im modernen Sinne), und diejenige für drei Würfel lässt sich aus Tab. 4 als Pyramidenzahl der 6. Zeile ablesen. 3 trois dez: Die korrekte Lösung lautet in moderner Darstellung $K_6^3 = 1\binom{6}{1} + 2\binom{6}{2} + 1\binom{6}{3}$; Leibniz übersieht hier den ersten Summanden, der für „la somme des choses“, die Anzahl der Würfel also, steht. 5 4 dez: Die richtige Lösung kann man modern mit $K_6^4 = 1\binom{6}{1} + 3\binom{6}{2} + 3\binom{6}{3} + 1\binom{6}{4}$ wiedergeben; Leibniz' Lösung dagegen berücksichtigt die Zahl der combinaisons $\binom{6}{2}$ nur zweimal. 7 ainsi de suite: Aufgrund des Irrtums in der vorausgehenden Zeile lieferte eine Verallgemeinerung der Leibnizschen Lösungen kein valides Ergebnis. Das korrekte Ergebnis für n Würfel lautet vielmehr $K_6^n = \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} \binom{6}{k} = \binom{n+5}{5}$. 10 choses: Leibniz betrachtet nun also unterscheidbare Würfel. Die Ausgänge ihrer Würfe sind, modern gesprochen, Variationen mit Wiederholung. Den entsprechenden Ereignissen können gleiche Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden, so dass sich das Ausgangsproblem auf dieser Grundlage lösen lässt. Im weiteren Verlauf des Stücks steht allerdings das allgemeinere Problem im Vordergrund, in wievielen Ausgängen eines Wurfes mit mehreren Würfeln eine zuvor festgelegte Zahl an Sechsen fällt.

$Aa \quad Ba \quad \text{etc.}$
 $Ab \quad Bb$
 $Ac \quad Bc$
 $Ad \quad Bd$
 $Ae \quad Be$
 $Af \quad Bf \quad \text{etc.}$

5

Ainsi les cas ou faces selon ce sens, seront les nombres de la progression senaire. Les faces de deux dez seront 36, de 3 dez 216, etc.; de même les faces de deux pentaedres seront 5, 25, 125, 625, etc., nombre de faces sans f . Leur difference sera le nombre des faces de deux cubes ou hexaedres où il y a le nombre f , la difference entre les quarrez, de 6 et de 5. Et s'il y a trois hexaedres la difference entre les cubes de 6 et de 5 donnera le nombre des faces avec f . Ainsi de suite. Et ces differences seront tousjours terminées par 1, parce que les termes [se terminent] tousjours par 6 et 5.

Il s'agit apreset de sçavoir les doublets; c'est à dire les faces où il y a f plus d'une fois. Et il est manifeste, qu'il n'y a qu'un seul cas dans deux hexaedres, où f soit double. Mais dans trois hexaedres, voyons combien de fois f est double; car il n'y peut estre qu'une fois triple. Pour double voyons. Il est une fois double dans deux hexaedres, adjoutons y le nombre des faces sans f , du 3^{me}, qui est 5; en voila 5; il est $\overline{6^2 - 5^2 - 1}$ fois simple dans 2 hexaedres, ce la ne se peut prendre qu'une fois, en adjoutant le 3^{me}; et en l'y combinant avec un seul f . Avant que de passer outre, il sera bon d'exprimer cecy par ordre:

10

15

20

8 f. les faces de (1) 5 dez (2) deux pentaedres ... 625, etc (a) les differences font (b) nombre ... sans (aa) f. (bb) | 6. ändert Hrsg. | leur $L = 10$ hexaedres (1) qui est sans une des choses par exemple sans f. (2) ou il y a | le nombre erg. | f. $L = 12$ faces | sans ändert Hrsg. | f. $L = 14$ sçavoir (1) combien il y a des (2) les doublets $L = 18$ adjoutons y (1) le tro (2) les (3) le nombre des faces (a) du troisieme (b) sans f L

	0	1	2	3	[4]	[5]
	*	*				
1 Hexa- edres	$\overline{6 \text{ faces}}$	$\overline{\frac{5 \text{ faces}}{\text{sans } f}}$	1 faces avec f	$\overline{\frac{1 \text{ faces à}}{1 \text{ fois } f}}$	*	
2	36	25	11	10	$\overline{\frac{1 \text{ faces à}}{2 \text{ fois } f}}$	
3	216	125	91	$10^5 +$ $\underbrace{25^1}_{75}$	$10^1 +$ $\underbrace{1^5}_{15}$	$\overline{\frac{1 \text{ faces à}}{3 \text{ fois } f}}$
5 4	1296	625	671	$75^5 +$ $\underbrace{125^1}_{500}$	$75^1 +$ $\underbrace{5^15}_{150}$	$15^1 +$ $\underbrace{1^5}_{20}$
5	7776	3125	4651	$500^5 +$ $\underbrace{625^1}_{3125}$	$500 +$ $\underbrace{150^5}_{1250}$	$150 +$ $\underbrace{20^5}_{250}$
6	46656	15625	31031	$3125^5 +$ $\underbrace{3125^1}_{18750}$	$3125^1 +$ $\underbrace{1250^5}_{9375}$	$1250^1 +$ $\underbrace{250^5}_{2500}$
	etc.	etc.				
						$\overline{\frac{1 \text{ fac. à}}{6 \text{ fois } f}}$

[Tab. 5]

9 Hilfsrechnungen zu Tab. 5:

$\frac{625}{2500}$	$\frac{150}{5}$
$\frac{3125}{750}$	
$\frac{500}{1250}$	

9 Nebenrechnung über Tab. 5: | 300 325 $\frac{12}{\cancel{32500} \cancel{f}}$ 8125 gestr. | L
 $\frac{4444}{25}$

Ex his manifesta est Tabulae continuatio. Nimirum columnas vocabimus, series perpendiculares, numeratas numero duplicationum. Series autem horizontales notatae numero hexaedrorum. Constructio haec est. Quilibet terminus componetur ex quintuplo seriei praecedentis columnae suae, et simplo seriei pariter et columnae praecedentis, ut ita stet semper:

5

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ E & F & G \end{array} \quad \text{et} \quad E \sqcap 1A + 5B \quad F \sqcap 1B + 5C \quad G \sqcap 1C + 5D$$

	0	1	2	3	4
1	α	ε			
2	β	ζ	ι		
3	γ	η	κ	ξ	
4	δ	θ	λ	μ	π
					ρ


[Tab.] \odot

10

3 terminus (1) fiet ex sum (2) componetur L 13 Unter Tab. \odot :
 | Scribatur hoc modo nicht gestr. |

1				1		
α	1			$5^1 \curvearrowright$	1	1
β	Z	1		$5^2 \curvearrowright$	1	2
γ	H	κ	1	$5^3 \curvearrowright$	1	3
δ	θ	λ	μ		3	1

15 Scribatur: Dieser erste Versuch, die Verteilung der Ausgänge mit Hilfe des Arithmetischen Dreiecks wiederzugeben (vgl. auch Tab. 8), ließe sich durch geringfügige Änderungen retten:



$\alpha = 5$	$\varepsilon \sqcap 1$		
$\beta = \alpha^2$	$\zeta \sqcap 1\alpha + 5\varepsilon \sqcap 2, 5$		$\iota \sqcap 1$
$\gamma = \alpha^3$	$\eta \sqcap \frac{1\beta + 5\zeta(\sqcap 5\alpha + 5^2\varepsilon)}{1} \sqcap 3, 5^2$		$\kappa \sqcap \zeta(\sqcap 2, 5) + 5\iota(\sqcap 5) \sqcap 3, 5$
$\delta = \alpha^4$	$\theta \sqcap \frac{1\gamma + 5\eta(1\alpha + 5^2\alpha + 5^3\varepsilon)}{1} \sqcap 4, 5^3$		$\lambda \sqcap 1\eta(\sqcap 3, 5^2) + 5\kappa(\sqcap 3, 5^2) \sqcap 6, 5^2$
5 etc.	etc.		etc.
$\iota \sqcap 1$	$\xi \sqcap 1$		
$\kappa \sqcap 3, 5$	$\mu \sqcap 1\kappa(\sqcap 3, 5) + 5\xi(\sqcap 5) \sqcap 4, 5$		
$\lambda \sqcap 6, 5^2$	$\rho \sqcap 1\lambda(\sqcap 6, 5^2) + 5\mu(\sqcap 4, 5^2) \sqcap 10, 5^2$		$\pi \sqcap 1$

10

[Tab.] \mathfrak{D}

Ex hac jam tabulae repraesentatione Analytica, inventa est ratio inveniendi quemlibet Tabulae terminum sine Tabula. Nimirum quilibet Tabulae numerus est multiplus potestatis Numeri numero Hedrarum Polyhedri unitate Minoris, hoc loco quinarii $\sqcap y$, affectus sub numero combinatorio. Quod ut clarius pateat tabulam \odot explicatam ope 15 Tabulae \mathfrak{D} , sic repraesentabimus:

	0	1	2	
1	$1, y^1$	1		
2	$1, y^2$	$2, y^1$	1	
3	$1, y^3$	$3, y^2$	$3, y^1$	1
4	$1, y^4$	$4, y^3$	$6, y^2$	$4, y^1$

[Tab. 8]

21 Am Rande eine punktuelle Probe der Tabelle: $25 \frac{25}{6} \overline{150}$

10 Über Tab. \mathfrak{D} : $|\alpha \sqcap 5 \quad \beta \sqcap (1) 5\alpha \quad (2) \alpha^2 \quad \gamma \sqcap 5\beta \sqcap \alpha^3 \text{ etc. } \varepsilon \sqcap 1 \quad \zeta \sqcap \alpha + 5\varepsilon \text{ gestr.}| L$
 12 numerus (1) est potestas (2) est multiplus L 14 clarius (1) patet (2) pateat L
 17 $1, y^1 \quad 1, |y^0 \text{ gestr.}| L$

Hinc multa duci poterunt theorematum singularia. Lineas perpendiculares appellabo Columnas, et transversales appellabo Series: Exponentes potestatum in columnis crescent progressionem arithmeticam naturali: in seriebus decrescent etiam progressionem arithmeticam naturali. Afficientes potestatum in columnis sunt Unitates, Numeri Naturales, Numeri Triangulares, Numeri Pyramidales, Numeri Triangulo-Triangulares, verbo Numeri figurati. Affidentes potestatum in seriebus sunt characteristici Potestatum Binomialium. Nempe sit radix $a + b$, cuius characteristici 1.1, quad. $1a^2 + 2ab + 1b^2$, cubus: $1a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 1b^3$, et ita porro.

Problema palmarium huc reddit: Dato numero Tesserarum, eundem numerum laterum habentium, iisdemque characteribus similiter inscriptarum, invenire numerum facierum, tum simpliciter, tum earum, in qua datus character reperiatur, aut non reperiatur, aut datis vicibus reperiatur. Facie autem voco diversitatem jactum, tum a characteribus in supereminencia superficie apparentibus ortas, tum etiam ortas ab ipsis diversis Tesseris, quod ad sensum appareret, si iidem characteres diversis tesseris colore discernerentur vel magnitudine, ut si sit Tessera sola cubus characteres unius Tesserae, A. B. C. D. E. F, alterius a. b. c. d. e. f, patet duabus tesseris ejusmodi jactis, differre Ab et aB. Et ita ut eodem exemplo insistamus, si sint 5 tesserae cubicae, quibus sex characteres a. b. c. d. e. f. diversis coloribus inscripti, quaeritur quot sint facies sive jactus diversi, in quibus una aliqua harum rerum exempli gratia, a reperiatur vicibus 4. Vel positis quatuor tesseris, quot sint jactus in quibus eadem res, ut a vicibus duabus. Sumatur numerus laterum polyhedri 6, sumatur et numerus tesserarum 4, et numerus duplicationum. A numero Tesserarum subtrahatur numerus duplicationum, $4 - 2 = 2$. Residuo addatur unitas, fiet 3. Jam ponantur tot numeri unitate sola differentes quorum minimus 3, quot sunt

1 theoremata (1) admir (2) singularia. Lineas (a) trans (b) horizontales (c) perpendiculares L
 2 Series: (1) Affidentes (2) Exponentes $L = 3$ naturali erg. $L = 3$ progressionem (1) eadem (2) arithmeticam naturali (a) Exponente (b) Affidentes $L = 4$ sunt (1) Numeri, (2) | Numeri gestr. | Unitates $L = 6$ sunt (1) Numeri (2) characteristici $L = 9$ f. reddit: (1) Datis lateribus (2) Dato numero laterum polyhedri, (3) dato numero Polyhedrorum | similiter signatorum erg. | aequivalem datumque numerum hedrarum habentium, (a) et similiter (b) et similiter sig (4) Dato numero Tesserarum, (a) et (aa) laterum (bb) lat (cc) latera numeri dati ejusdem, eademque similiter signata habentium, (b) eundem ... habentium, (aa) similiterque inscriptarum, aequiv (bb) similiterque inscriptarum in (cc) iisdemque characteribus (aaa) inscriptarum (bbb) similiter $L = 13$ diversis (1) polyhedris ut (2) Tesseris $L = 14$ f. vel magnitudine erg. $L = 15$ sola erg. $L = 16$ a. b. c. d. e. f. (1) supponendo majusculos albo, alteros nigro colore scriptos, (2) patet $L = 17$ sint (1) duae (2) 5 $L = 19$ vicibus 4. (1) Problema ita solvetur (2) vel $L = 21$ f. duplicationum. (1) 2 (2) A numero ... duplicationum | vicinali erg. L , streicht Hrsg. |, $4 - 2 = 2$.

unitates in numero duplicationum, hoc loco, 2, nempe 3. 4. Hi numeri ducantur in se invicem. Factus ex ipsis dividatur per factum ex totidem numeris unitate differentibus quorum minimus unitas, multiplicetur 1. 2, nempe 2, $\frac{12}{2} = 6$. Quotiens 6 multiplicatus per potestatem numeri numero laterum unitate minoris, hoc loco 5, cuius exponens differentia 5 numeri tesserarum et vicium $2[.]$ seu 5^2 , seu $6 \cdot 5^2 = 150$.

[Teil 3]

Problema

Dato numero L a t e r u m ,	6
(Tessera enim si[t] Cubica, Hexaedros)	
10 Tessera r u m ut	4 (6)
ut si 4 (vel 6) tesseris simul jaciendum sit,	
et R e p e t i t i o n u m ,	2 (4)
ut si quaerantur jactus, in quibus eadem punctorum configuratio,	
ut $\ddot{\bullet}\bullet$ (nam omnium par ratio) bis (vel quater) reperiatur	
15 i n v e n i r e n u m e r u m f a c i e r u m , id est invenire numerum jactuum a se invicem differentium, in quibus dato Viciu m numero repetitur configuratio proposita. Diversitas autem jactuum oritur tum ab ipsis punctis jactis, ut si duabus tesseris jaciamus nunc IV et 5, nunc IV et 3, tum a tesseris quibus fit jactus, ut jactus IV et 5 differet a jactu V, 4, si quod majusculis characteribus exhibetur, unius tesserae, quod minusculis alterius esse	
20 intelligatur: quod appareret, si tesserae plures coloribus, vel aliis notis discernerentur. Nec vero tantum eorum quae jaciuntur, sed et tesserarum quibus fit jactus ratio habenda	

3 unitas (1). Quotiens multiplicetur per (2), multiplicetur $L = 7f.$ | Distinctius erg. u. wieder gestr. | Problema (1): Dato numero Tesserarum ut 4. (6) eundem ac datum laterum numerum $\dots 6$. habentium | et ubique ac similiter inscriptarum erg., i n v e n i r e N u m e r u m f a c i e r u m , in quibus aliquid character | inscriptus erg. | vel punctorum configuratio, ut $\ddot{\bullet}\bullet$ aliave (nam omnium eadem ratio) dato vicium numero, v. g. vicibus $\dots 2$. (4) reperiatur. brevius: (2) Dato $L = 11$ sit, (1) i n v e n i r e (2) et R e p e t i t i o n u m $L = 14$ ut (1) $\ddot{\bullet}\bullet$ (vel $\ddot{\bullet}\bullet$) bis (vel quater) reperiatur (2) $\ddot{\bullet}\bullet$ (nam $L = 15$ invicem (1) sive apparentia eorum quae jaciuntur, sive ipsis tesseris jactis, (2) differentium $L = 17f.$ nunc (1) 4. et 5. (2) IV. et 5. (a) vel (b) nunc \dots ut (aa) IV a 5. (bb) jactus (aaa) 4 (bbb) IV. et 5. $L = 20$ qvod | apparebet ändert Hrsg. |, si L

est. Quia problema nostrum servire debet ad solutionem alterius problematis quod ita conceptum est: Si convenerit inter duos ut quoties 5 quatuor Tesseris jecerit certum capiat $\langle\text{numer}\rangle$ um denariorum, contra, quoties 5 abfuerit, certum solvat, quaeritur quid debeat esse porportio inter capiendum et solvendum, ut aequalitas servetur. Non est hic sermo.

Solutio

5

A Numero Tesserarum T , $\sqcap 4$ (vel 6) subtrahatur numerus Repetitionum $R \sqcap 2$ (vel 4), supererit $T - R \sqcap 4 - 2 \sqcap 2$ (vel $6 - 4 \sqcap 2$). Huic residuo $T - R$, addatur unitas, fiet $T - R + 1 \sqcap 3$ (vel 3).

Scribantur totidem Numeri continue sola unitate crescentes, quorum minimus $T - R + 1$, sive 3 (vel 3) nempe $T - R + 1$, $T - R + 2$, $T - R + 3$ etc. quot sunt unitates in numero repetitionum R , sive in 2 (4) nempe 3. 4. (vel 3. 4. 5. 6.).

Hi numeri continue crescentes unitate ducantur in se invicem: Productum 12 (360) dividatur per factum, ex totidem numeris sola unitate differentibus, seu sumtis deinceps

ab unitate, 1 in 2 $\sqcap 2$ (1 in 2 in 3 in 4 $\sqcap 24$) fiet $\frac{12}{2} \sqcap 6 \left(\begin{array}{r} 12 \\ 360 \cancel{f} 15 \\ 244 \\ 2 \end{array} \right)$.

Quotiens ducatur in numerum laterum tesserae, unitate minutum, hoc loco 5, toties in se ductum, quot in $T - R$, differentia Numeri Tesserarum et Repetitionum 2 (2) sunt unitates id est in 5^2 (5^2) $\sqcap 25$ (vel 25) fiet $6^{\wedge} 25 \sqcap 150$ ($15^{\wedge} 25 \sqcap 375$). 15

2 quoties 5 (1) tribus (2) quatuor L 6 Repetitionum (1) 2 (2) $R \sqcap 2$, (a) (4) fiet (b) (vel 4) supererit $L \quad 8$ f. $\sqcap 3$ (| vel erg. | 3). (1) Ducantur in (2) Scribantur $L \quad 10$ $T - R + 1$, (1) qvot (2) sive 3 vel (3) $L \quad 12$ f. invicem: (1), fiet: (6) (2) Productum ... per (a) totidem (b) factum, L 13 seu sumtis erg. $L \quad 15$ ducatur (1) in numerum laterum te(r) (2) in (a) $\langle\text{Qvadratum}\rangle$ (b) | qvi est nicht gestr. | numerus (c) numerum L

1 alterius problematis: Bei diesem handelt es sich vermutlich um das im Titel erwähnte Problem des Herzogs von Roannais. Die Lösung für den hier genannten Fall mit vier Würfeln lässt sich Tab. 5 auf S. 66 entnehmen. 6 (vel 6): Die eingeklammerten Zahlenangaben und Berechnungen in der *Solutio* fügt Leibniz nachträglich hinzu, um so ein zweites konkretes Beispiel für die Lösung des Problems zu geben. 17 Diese korrekte, bereits auf S. 69 f. beschriebene Lösung lässt sich modern wie folgt ausdrücken: Beim Wurf von T unterscheidbaren Würfeln ist die Zahl der Ausgänge, die genau R mal eine zuvor festgelegte Augenzahl zeigen, gleich $\binom{T}{R} 5^{T-R}$.

[*Französische Zusammenfassung*]

Le nombre des dez (6), et des repetitions (4) estant donnés trouver le nombre des doublets (375), suivant la repetition donnée (4) sans se servir d'aucune table, calcul de suite.

- 5 Du nombre des dez osterz le nombre des repetitions, adjoutez l'unité à ce qui reste (2). Et faites que ce qui provient (3) soit le moindre d'autant de nombre[s] croissans par l'unité (3. 4. 5. 6), qu'il y a d'unitez dans le nombre des Repetitions (4). Multipliez tous ces nombres l'un par l'autre de suite. Et divisez le produit (360) par le produit (24) [d']autant de nombres croissans par 1 et commençans par 1 (1. 2. 3. 4) ce qui se
10 peut toujours faire sans reste. Multipliez le quotient (15) par la puissance de 5 (25) dont l'exposant (2) est la difference du nombre des dez et des repetitions. Et le produit (375) satisfera à la demande.

3 f. sans ... suite *erg. L* 5 repetitions, (1) (reste 2) adjoutez y l'unité (3) Et vous aurez un nombre, qvi sera le moindre, d'autant de nombres croissans par l'unité (2) le qvel doit estre multiplié pa (3) adjoutez *L* 8 f. le produit (24) *erg. L* 9 croissans par (1) l'unité, ou le moindre soit l'unité même (2) 1. et *L*

2 (6): Auch die französischsprachige Kurzfassung ergänzt Leibniz nachträglich um die in Klammern gesetzten Zahlenwerte eines konkreten Beispiels.

11. DE ANALYSEOS HISTORIA

[Oktober 1674 – Januar 1675]

Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 VIII 14 Bl. 1–2. 1 Bog. 2°. 4 S.

Cc 2, Nr. 793

Datierungsgründe: Leibniz' Ausführungen in diesem Stück setzen inhaltlich seine Studien zur Algebra in den Jahren 1673 und 1674 voraus. Ein erster *terminus post quem* ist durch die Erwähnung des *Horologium oscillatorium* von Huygens (erschienen im Frühjahr 1673) gegeben; ein erster *terminus ante quem* lässt sich aus dem Umstand ableiten, dass Rafael Bombelli, mit dessen *Algebra* sich Leibniz seit dem Frühjahr 1675 beschäftigt (vgl. VII, 2 N. 49), im Stück nicht genannt wird. Diese Eingrenzung kann weiter präzisiert werden: So schließt die Verwendung eines Ergebnisses aus dem zwischen Dezember 1673 und Juni 1674 verfassten Stück VII, 7 N. 7 eine Niederschrift vor Ende 1673 aus. Und die Bemerkungen zu Sluses *Mesolabum* deuten darauf hin, dass Leibniz das Stück erst verfasst, nachdem er Mitte 1674 jenes Werk exzerpiert (VII, 7 N. 16) und für seine eigenen Arbeiten erschlossen hat; die vorherige Lektüre der Rezension des *Mesolabum* in den *Philosophical Transactions* hätte ihm nicht die gleiche Sicherheit des Urteils verschaffen können. In seiner Bemerkung zu Boulliau schließlich bezieht sich Leibniz mit ziemlicher Sicherheit auf das Gespräch mit diesem am 3. Oktober 1674 (VII, 5 N. 6 S. 31). Ein weiteres Indiz für eine Niederschrift nicht vor Oktober 1674 ist die Erwähnung Gosselins, denn Leibniz' Exzerpte aus und Marginalien in Gosselins *De arte magna* (VII, 3 N. 41) sind gesichert nicht vor Oktober 1674 (und wahrscheinlich nicht nach Januar 1675) entstanden. Die Erwähnung der *Geometriae pars universalis* von Gregory erhärtet eine Datierung auf diese Periode weiter, denn Leibniz' erste bisher bekannte Nennung dieses Werkes stammt aus dem Dezember 1674 (vgl. VII, 1 N. 13 S. 130f.). Die Erwähnung von Girards *Invention nouvelle* spricht nicht gegen diese Datierung. Zwar wird Leibniz' bisher früheste Erwähnung dieser Publikation (VII, 2 N. 17 S. 189) auf März bis Mai 1675 datiert, und ihre erste Erwähnung im Briefwechsel ist die in Oldenburgs Brief vom 22. April 1675 (III, 1 N. 49 S. 242), doch wird sie in Schootens Appendix erwähnt, den Leibniz bereits seit Herbst 1674 zitiert (VII, 2 N. 3 S. 32). Insgesamt betrachtet ist unser Stück also sicher nicht vor Oktober 1674 und wohl eher nicht nach Januar 1675 entstanden.

5

10

15

20

25

De Analyseos Historia

Calculum literalem in locum numeralis primus omnium credo introduxit Franciscus Vieta, tametsi enim Gosselinum quendam aliquosque obscuriores Algebrae scriptores

27 De Analyseos Historia erg. *L*

28 introduxit: Vgl. Fr. VIÈTE, *In artem analyticem isagoge*, 1591 (= VO S. 1–12), Bl. 7 r° (VO S. 8).

29 Gosselinum: Vgl. G. GOSSELIN, *De arte magna*, 1577, etwa auf Bl. 82 v° u. 84 v°. 29 obscuriores:

Dies trifft etwa auf Jean Borrel zu; vgl. J. BUTEO, *Logistica*, 1559, Bl. 189 r°.

literis nonnunquam usos videam, tamen nec in exemplum eorum valuit autoritas; et ad novae scientiae formam longe aliis praeterea observationibus opus erat. Vieta autem cum videret antecessores suos in quaestionibus implicatiōribus pluribus una incognitis oblatis duabus unitatibus fictitiis uti; satius credidit numeros cognitos incognitosque literis 5 exprimere. Ita enim et lineis accommodari posse easdem ratiocinationes, et Arithmeticae cum Geometria consensum apparere, exemplo Geometrarum, qui in doctrina de rationibus magnitudines literis designant et alioquin rectam extra figuram positam, ad propositionem tamen pertinentem, una litera notatam separatim exhibere solent. Idem primus rationem ostendit excitandi ex radicibus aequationem quandam propositae similem, ut ex ejus genesi propositae analysis appareret; unde factum quoque est ut Analytica 10 appelletur, quam alii speciosam vocant. Ego Calculum Symbolicum appellare malim.

Porro Vieta neminem Artis suae oppugnatorem habuit, praesertim cum de ejus usu modeste sentiret ipse. At Cartesius, ut erat inventorum alienorum in rem suam accommodandorum artifex insignis, cum ope calculi duo in Geometria praestitisset egregia; 15 digestionem in classes locorum sive linearum calculi capacium, quarum intersectione aequationes construerentur, et inventionem tangentium, per aequationes duarum radicum aequalium. Dissimulato prorsus aut contemto Vieta, in totius scientiae autorem erigere se posse credidit, cui ut pollicitationum magnitudine pretium faceret; libro edito scribere ausus est, nullum esse problema quod methodo sua solvi non possit. Cumque animadver-

2 f. cum (1) observasset (2) videret L 4 credidit (1) pro qvalibet q (2) qvantitates literis (3) numeros L 6 f. in doctrina ... alioqvin erg. L 11 qvam (1) alibi (2) alii L 14 in Geometria erg. L 15 f. digestionem (1) locorum sive linearum Geometricarum in Classes, (2) in ... linearum (a) Analyseos, (b) calculi capacium | qvarum intersectione (aa) problemata (bb) aeqvationes construerentur erg. |, et L 16 tangentium, (1) ope duarum radicum aeqvalium (2) per L 17 in (1) novae (2) totius L 18 faceret; (1) jactavit in lib (2) in libro (3) libro L 19–75,1 animadverteret (1) Methodos suas (2) eam L

9 ostendit: Fr. VIÈTE, *De aequationum recognitione et emendatione tractatus duo*, 1615, insbesondere S. 128 f. (VO S. 158). 11 speciosam: DERS., *In artem analyticem isagoge*, 1591, Bl. 5 r° (VO S. 4) unterscheidet das Rechnen mit Buchstaben als *logistica speciosa* von der *logistica numerosa*, dem reinen Zahlenrechnen. 16 construerentur: Vgl. R. DESCARTES, *Geometria*, 1659, DGS I S. 1–106.

16 tangentium: Vgl. ebd., S. 40–49. 19 nullum: Vgl. ebd., S. 1 u. 118. Eine ähnliche Kritik an Descartes übt Leibniz bereits im Sommer 1673 in seinem Stück *Fines geometriae* (VII, 4 N. 25, S. 594 f.). Das Postulat „nullum non problema solvere“ geht allerdings auf Fr. VIÈTE, *In artem analyticem isagoge*, 1591, Bl. 9 r° (VO S. 12) zurück.

teret eam ad curvilineorum dimensiones non porrigi, impossibile pronuntiavit rectam exhibere curvae aequalem, quod scilicet nulla tunc $\varepsilon\dot{\nu}\theta\upsilon\nu\sigma\iota\varsigma$ extaret.

Ea Viri confidentia ipsi pariter Artique adversarios paravit. Erant tunc in Gallia duo Geometrae insignes, Fermatius et Robervallius, quorum ille paraboloidum omnium quadraturas, et methodum de maximis et minimis (qua et tangentes continebantur) dederat. Hic cycloidis et solidi ejus circa axem exhibuerat dimensionem; aliaque problemata praeclera produxerat, quae manifestum erat Cartesianae Methodo non subjici, quod scilicet ad aequationes revocari non possent. Hi ergo praeterquam quod jactantiam manifeste absurdam ferre non possent; etiam illud non probabant, calculi praetextu a quibusdam constructiones Geometricas negligi, quarum elegantiae veteres cum primis operam dedisse constabat.

Thomas Hobbes a Cartesio in *responcionibus ad objectiones Metaphysicas* indigne habitus; edito libro *de Corpore*, occasionem nactus de calculo ita censuit; modeste satis;

3 Viri (1) arrogantia (2) fiducia (3) confidentia L 6 axem (1) dederat (2) exhibuerat L
 6 f. praeclera (1) solverat (2) produxerat L 7 Methodo (1) solvi non posse, (2) non L 9 praetextu (1) elegantes veterum (2) a quibusdam L 12 indigne (1) tracta (2) habitus L 13 nactus de (1) symbolica (2) calculo L

1 pronuntiavit: Vgl. R. DESCARTES, *Geometria*, 1659, DGS I S. 39. 5 dederat: Fermats Extremwertmethoden wurden in P. HERIGONE, *Supplementum cursus mathematici*, 1642 u. 1644, S. 59–69, dargestellt, später auch in Fr. v. SCHOOTEN, *Commentarii*, 1659, DGS I S. 253–255. Über die Existenz von Fermats Quadratur höherer Parabeln war Leibniz durch Roberval unterrichtet (vgl. VII, 6 N. 491 S. 507); vgl. auch den Brief von Fermat an Mersenne von Februar/März 1642, tlw. gedr. in M. MERSENNE, *Tractatus mechanicus*, 1644, praefatio, § IV, Bl. a1 v°–a2 r° (FO I S. 195–198; M. MERSENNE, *Correspondance* XI, S. 55–58). 6 exhibuerat: Vgl. den Brief von M. Mersenne an R. Descartes vom 28. April 1638, in: R. DESCARTES, *Lettres*, Bd 3, 1667; S. 380–384 (DO II S. 116–122; M. MERSENNE, *Correspondance* VII, S. 173–179). — Robervals Quadratur der Zykloide erwähnt Leibniz bereits im Sommer 1673 (vgl. VII, 4 N. 36 S. 595). 12 responcionibus: Descartes' *Meditationes de prima philosophia* von 1641 waren als Beilage die brieflichen Einwürfe (*Objectiones*) von philosophischen Gegnern, darunter Gassendi und Hobbes, und deren Beantwortungen (*Responiones*) angefügt. In diesen wird ein grundlegendes Unverständnis gegenüber Hobbes' Positionen deutlich. 13 censuit: Leibniz hat Hobbes' *De corpore* sowohl in der Erstausgabe von 1655 wie in der überarbeiteten Ausgabe von 1668 studiert (vgl. U. GOLDENBAUM, *Indivisibilia vera. How Leibniz Came to Love Mathematics*, in: DIES. u. D. JESSEPH (Hrsg.), *Infinitesimal Differences*, 2008, S. 53–94). Hier bezieht Leibniz sich vermutlich auf die Formulierung der Erstausgabe: „Estque Analytiae, ut ita dicam, brachygraphia, ars quidem non docendi neque discendi Geometriam, sed inventa Geometrarum celeriter et compendio in Commentarios redigendi. Nam etsi inter propositiones longe dissitas, facilis sit per Symbola discursus, an tamen is discursus, cum fiat

etsi inter res longe dissitas facilis sit per symbola discursus, cum tamen fiat sine ipsarum rerum ideis, an valde utilis existimandus sit, se nescire. Postea vero a Wallisio Oxoniensi Mathematico scholarum ab Hobbio contumeliose tractatarum propugnatore durius acceptus, in ipsam ejus Methodum bilem effudit, edito libro de *Emendatione Mathematicae hodiernae*, ubi non contentus inutilem pronuntiare, etiam erroneam ostendere, posse sibi visus est. Ei vero ita a Wallisio satis mea sententia factum ut de Calculi symbolici veritate possimus esse securi; solaque de utilitate disceptatio supersit.

De Utilitate autem Analyseos quem vocant, variant sententiae doctorum quoque Virorum: alii nullam agnoscant, alii velut inveniendi principium in pretio habent, ad

2 an (1) satis (2) valde utilis (a) existimanda (b) existimandus L 4 in (1) methodum eius, id est calculum symboli (2) in (3) ipsam L 6 sibi erg. L 6 f. factum (1) est (2) ut de (a) eius (b) Calculi symbolici (aa) usu in (bb) veritate ... securi; (aaa) nec nisi (bbb) solaque L 8 Utilitate (1) Calculi Analytici (2) autem ... vocant, (a) duae p (b) variant L

sine ipsarum rerum Ideis valde utilis existimandus sit, certe nescio.“ (*De corpore*, 1655, cap. 20, S. 181.) 1668 hatte Hobbes den ersten Teil der Aussage bereits verschärft: „At Symbolica, qua permulti hodie utuntur putantes esse Analyticam, nec Analytica est nec Synthetica, sed calculationum Arithmeticarum quidem vera, Geometricarum autem falsa Brachygraphia ars quidem non docendi neque discendi Geometriam, sed inventa Geometrarum celeriter et compendio in Commentarios redigendi.“ (*De corpore*, 1668, S. 157; *HOL* I, S. 257f.) 3 propugnatore: Leibniz bezieht sich hier wahrscheinlich u. a. auf die 1654 anonym veröffentlichte Streitschrift *Vindiciae academiarum*, welche von Wallis' Kollegen in Oxford, dem Astronomieprofessor Seth Ward und John Wilkins, dem Warden von Wadham College, verfasst worden war. Sie richtete sich gegen die Kritik an den Universitäten in Th. HOBBS, *Leviathan*, 1651, S. 179f. (*HEW* I, S. 330–332). Wallis mischte sich mit seiner Schrift *Elenchus geometriae hobbiana*, 1655, in diese Kontroverse ein. 5 ostendere: Th. HOBBS, *Examinatio et emendatio mathematicae hodiernae*, 1660 (*HOL* III, S. 1–232). 6 factum: Vgl. J. WALLIS, *Hobbius heauton-timorumenos*, 1662, sowie DERS., *Animadversions of Dr. Wallis, upon Mr. Hobbs's Late Book, De principiis et ratiocinatione geometrarum*, in: *Philosophical Transactions* I, Nr. 16 vom 6./16. August 1666, S. 289–294; DERS., *Thomae Hobbes quadratura circuli confutata*, 1669; DERS., *Thomae Hobbes quadratura circuli denuo refutata*, 1669; DERS., *An Answer of Dr. Wallis to Mr. Hobbes's Rosetum Geometricum in a Letter to a Friend in London, Dated July 16.*, in: *Philosophical Transactions* VI, Nr. 73 vom 17./27. Juli 1671, S. 2202–2209; DERS., *An Answer to Four Papers of Mr. Hobbs*, in: *Philosophical Transactions* VI, Nr. 75 vom 18./28. September 1671, S. 2241–2250; DERS., *Dr. John Wallis his Answer, by Way of Letter to the Publisher, to the Book, Entituled Lux Mathematica, etc.*, in: *Philosophical Transactions* VII, Nr. 87 vom 14./24. Oktober 1672, S. 5067–5073. — Zumindest die Artikel und Rezensionen in den *Philosophical Transactions* waren Leibniz mit Sicherheit bekannt. Seine Haltung zu Hobbes' Positionen entwickelte sich entsprechend von fast euphorischer Zustimmung (vgl. seinen ersten Brief an Hobbes, 13./23. Juli 1670; II, I N. 25 S. 90 ff.) hin zu einer differenzierteren Sichtweise (vgl. Leibniz an Hobbes, 1674; II, I N. 119 S. 385).

demonstrandum parum valere existimant. Sunt contra qui prae symbolica linearem Methodum spernunt; a quibus omnibus diversa mihi ratio ineunda videtur. Nam qui prorsus inutilem putant experientia refutantur. Ope Analyseos Albertus Girardus vedit trisectionem anguli et aequationem quandam cubicam eodem reduci. Ope analyseos problemata ad duo loca reduci posse infinitis modis, quorum intersectione solvantur, ut Cartesius primum et egregie in primis Slusius ostendit. Cartesius paeclararam inventionem duarum mediarum proportionalium ex hoc fonte duxit, per Circulum et Parabolam, et proprietatem Hyperbolae ad usum dioptricum. Calculo debetur paeclarum Hugenii inventum de Isochronismo Cycloidis, ego quoque qui primus Circulum reduxi ad progressionem numerorum rationalium illud de me fateor, sine symbolorum usu, per tantos anfractus 5 quod inveni ne quaesiturum quidem fuisse.

Cl^{mo} Viro Ismaeli Bullialdo illud largior, sola Cartesiana methodo ne simplicissimam quidem quadraturarum, parabolicam, deprehendi posse; et ratio est, quia Cartesius non nisi aequationum resolutiones et constructiones tradidit; problemata autem quadraturarum ad aequationes reducere nemo docuit. Idem tamen fatebitur, locorum analyticam, si accedant principia Archimedis aut Cavalieri ad ipsas quoque quadraturas magni usus esse.

3 refutantur. (1) Ope Analyseos Cartesius dedit paeclararam constructionem duarum mediarum proportionalium (2) Ope L 4 analyseos (1) loca (2) problemata L 5 posse (1) constat (2) infinitis L 5f. Cartesius primum et erg. L 7 per (1) Analysis (2) Circulum L 7f., et proprietatem ... dioptricum erg. L 12 sola erg. L 14 resolutiones (1) sive (2) et L 14f. quadraturarum (1) non possunt redu (2) ad (a) aeqvationem (b) aeqvationes reducere (aa) non docuit (bb) nemo L 15 tamen (1) fateor (2) fatebitur locorum (a) doctorum (b) analyticam L

3 vedit: A. GIRARD, *Invention nouvelle*, 1629, D2 v°–D3 v°. — Vgl. Fr. van SCHOOTEN, *Appendix de cubicarum aequationum resolutione*, 1659, *DGS I* S. 345–368. 5 reduci: Vgl. R. DESCARTES, *Geometria*, 1659, *DGS I* S. 1–106; R.-Fr. de SLUSE, *Mesolabum*, 1668, insbesondere *Pars altera de analysi*, S. 51–95 (von Leibniz Mitte 1674 in VII, 7 N. 16 exzerpiert). Vgl. auch das im letzten Quartal 1674 verfasste Stück VII, 7 N. 40 S. 426. 6 inventionem: Vgl. R. DESCARTES, *Geometria*, 1659, *DGS I* S. 67–69. 7f. proprietatem Hyperbolae: Vgl. DERS., *La dioptrique*, 1637, S. 89–121 (*DO VI*, S. 165 bis 196). 9 Isochronismo: Vgl. Chr. HUYGENS, *Horologium oscillatorium*, 1673 [Marg.], S. 42–58 (*HO XVIII* S. 158–187). 9 reduxi: Vgl. die in Band VII, 6 zusammengefassten Handschriften zur arithmetischen Kreisquadratur. 12 largior: Leibniz bezieht sich hier sehr wahrscheinlich auf das Gespräch mit Boulliau am 3. Oktober 1674 (VII, 5 N. 6 S. 31), in dem dieser bestritten hatte, dass die Resultate von Archimedes, zu denen auch die hier erwähnte Quadratur der Parabel gehört, allein mit den Mitteln der Algebra erzielt werden könnten.

Analyticen demonstrare posse non est cur dubitemus, nam doctrina est de Magnitudine in universum, qua numeris, spatiis, temporibus, motibus communia traduntur; de magnitudine autem in universum demonstrationes extare nemo credo in controversiam revocabit.

5 Omnis calculi ratiocinatio non nisi axiomatum Euclideorum, si aequalibus (proportionalibus) addas (auferas) aequalia (proportionalia) fieri aequatio (proportionalia): aequalium aequimultipla esse aequalia; totum parte majus esse, aliorumque id genus catena est: non minus quam demonstrationes lineares: ita ut plerumque alterae ab alteris non magis distare videantur, quam idem sensus verbis nunc latinis nunc Gallicis redditus
 10 10 a se ipso. Cum addere aut subtrahere calculus jubet, tu lineas ducis, cum ille multiplicat, tu rationes componis; cum dividit, cum regulam auream exercet, quaeris tertiam quartamve proportionalem. Cum ad potestates puras aut potestatum purarum radices assurgit, tu medias proportionales investigas. Hactenus alter alterum pari passu secutus est. Sed ubi ille ad affectum gradum protulit, ubi divisores aequationum inquirit, ubi
 15 15 per aequationes plurium incognitarum, inter se junctas ex similium comparatione natas per abrupta sibi viam facit; et rebus quodammodo vim infert; tu impar sequendi, velut inter nubes condentem caput vix oculis comitere. Nam saepe quae unius plagulae calculo exhibentur, vix justo volumine per lineas repraesentaveris: nullo profecto fructu; cum sub rerum multitudine lassa fatiscat imaginatio cuius potissimum causa linearum ductus
 20 20 adhibentur.

2 numeris, (1) lineis, motibus, communia traduntur figuris (2) spatiis L 4f. revocabit. (1) Qvare (a) demonstratio (b) pracepta Analytica Geometrice demonstrare velle, perinde est, (aa) ac pracepta (bb) ac (aaa) demonstrationes (bbb) theoremata Geometricas per Empiricae qvoddam genus ostendere, qvod doctissimus Geometra Joachimus Jungius in tironum usum eleganter instituerat. Qvod ut suo usu non caret, ita necessarium nunquam (aaaa) etsi (bbbb) et nisi (aaaaa) cum (bbbb) in illis exemplis ubi peculiari elegantia praestari potest, supervacuum (2) Omnis L 6 (proportionalia): (1) aeqvimultiplorum aeqvalium (2) aeqvalium L 7 esse, (1) etc. (2) aliorumqve L 8 plerumqve (1) Geom (2) alterae L 9 non (1) maius (2) magis L 11f. dividit, |cum ... exercet erg. | qvaeris tertiam (1) proportionalem (2) quartamve L 12 puras erg. L 12 purarum erg. L 14 ad (1) affectas aeqvations (2) | affectas ändert Hrsg. | gradum protulit, | ubi ... inqvirit erg. | ubi | per erg. | aeqvations L 16 vim (1) facit (2) infert; tu (a) e (b) longinqvo (c) non nisi (d) impar L 17 comitere. Nam (1) im (2) ea saepe operationum multitudo unius plagulae calculo comprehenditur, ut lineis exhibere velle (3) Nam L 18 vix (1) integri voluminis (2) justo L 19 sub erg. L 19f. ductus (1) exhibentur (2) adhibentur L

5 axiomatum: Vgl. die Liste der Axiome in EUKLEIDES, *Elementa*, I. 17 inter ... oculis: P. VERGILIUS Maro, *Aeneis*, IV, 177. 24 instituerat: Vgl. J. JUNGIUS, *Geometria empirica*, 1627.

Fateor equidem saepe fieri, ut quae prolixo calculo invenimus demonstrari possint paucis linearum ductibus. Sed tunc rursus distinguendum arbitror. Compendium enim aut verum est aut apparens. Verum cum totam ratiocinationem lineis exhibemus valde contractam, apparens cum inter demonstrandum ad alias propositiones alibi demonstratas lectorem remittimus quae rursus ex aliis pendent, ut junctis in unum omnibus futura sit demonstratio linearis ipso calculo prolixior. Cum apparens est brevitas rursus distinguo nam propositiones quibus utimur inter demonstrandum aut pulchrae sunt atque elegantes ac dignae velut ad perpetuam rei memoriam condi Archivis Geometrarum; quo casu utilis est demonstratio Geometrica veritatis calculo inventae. Calculi fructus, non in praesens tantum problema, sed in perpetuum valit ut egregia ratiocinandi compendia inter calculandum inventa theorematis inclusa serventur in usum. Sin quod ego calculo inveni, tu lineis exhibes, inversa tantum calculi vestigia describentibus; operam tuam laudare non possum. Hoc enim admisso infinitis voluminibus sine ratione Geometria onerabitur. Quando autem evenit ut demonstratio linearis vere brevis sit, nec nisi pauca lemmata, aut theorematata alibi demonstrata, requirat, tum vero plerumque eveniet, ni fallor, ut eadem brevitate per calculum quoque possit absolviri. Ibi ergo eligendi libertas esto scriptori. Ego certe malim autorem mihi analysin suam quam synthesis dare; nam eadem opera et inventionis rationem patefaciet, quae inter linearum ductus non aeque tralucet: scriptoris autem interest aliquando lineis potius quam calculis uti; nam ita et profanos longe a scientiae mysteriis arcebit, et inventis suis plus admirationis conciliabit. Ita enim plerumque comparatum est, ut quae minus intelligimus magis suspiciamus. Eoque consilio non est dubitandum ab Archimede usum indivisibilium, ab Apollonio et Pappo calculi vestigia supressa esse, praesertim cum artes illae non nisi paucis et magnis

1 f. possint (1) paucis verbis (a) ac (b) sed tunc (2) paucis (a) linearum ductibus; idqve praesertim sagaci Analytico saepe monstrat ipse Calculi exitus; qvo casu adeo non improbo (b) linearum ... tunc (aa) illud (bb) rursus L 2 Compendium (1) autem (2) enim L 3 Verum (1) si (2) cum (a) nihil extra (b) totam L 4 f. ad (1) aliam propositionem (2) alias propositiones | alibi (a) demonstrationes (b) demonstratas erg. | lectorem L 7 inter demonstrandum erg. L 8 dignae (1) memorari; (2) velut L 9 inventae. (1) Cum hic sit potissimum (2) calculi (a) non fructu (b) fructus, L 10 perpetuum (1) utilis et valit (2) valit L 13 possum. (1) Ita enim infinitis (2) Hoc L 13 sine (1) usu (2) ratione L 15 pauca (1) aliunde (2) vel (3) lemmata, aut | theorematata erg. | alibi demonstrata, (a) | adhibeat nicht gestr. | (b) reqvirat, tum (aa) maxime ea (bb) vero L 16 brevitate (1) lineis (2) per L 16 possit (1) exhiberi. (2) absolviri. Ibi (a) vero (b) ergo L 21 f. magis (1) admiremur (2) suspiciamus (a) Idqve (b) Eoqve L 23 calculi (1) compendia (2) vestigia L

viris notae, apud vulgus Geometrarum erroris suspicione cauturæ non fuissent; quod nunc minime metuendum est, rebus in clariore luce collocatis.

Caeterum cum soleant homines suam quisque artem plus aequo admirari, mirum non est analyticos ex adverso linearium demonstrationum usum elevasse. Neque enim nisi magnis viris et ad omnia paratis competit aequa de rebus omnibus judicia ferre. Ex quibus Schotenius eo usque provectus est, ut libros theorematum inutiles pronuntiaret, cum inquit, eadem suo quisque marte per calculum investigare possit, intellectis semel *Elementis* Euclidis, et praceptis Analyticis. Itane vero? Tu admiranda Archimedis inventa, et pulchra Apollonii theorematata, et exquisitas Pappi *Collectiones* inutiles pronuntias. Poteras eodem jure dicere, praeter Euclidem et Cartesium, et tuos in eum *Commentarios* omnes de Geometria libros supervacuos esse. Ego vero ita sentio hunc potissimum esse calculi fructum, ut propositiones, quae nihil aliud quam elegantia calculi compendia sunt, in aerarium publicum referantur, quo aliis imposterum quaerendi labor minuatur. Quare nec Cartesii consilium probo quod ipsum scio non secutum, qui duobus tantum uti suadebat Theorematis; (triangulorum similium latera proportionalia esse; et in Triangulo rectangulo quadratum hypotenusa quadratis duorum reliquorum laterum aequari). Nam expertus scio, ad ingentes saepe calculos, reductu difficiles attolli, quae per inventa theorematata nullo negotio conficiuntur. Adde quod saepe ne in mentem quidem nobis veniret, ejusmodi propositiones quaerere, quarum ubi aliis inventae sunt demonstrationem postea vel calculo vel lineis investigare plerumque non arduum est.

1 Geometrarum *erg. L* 4 adverso (1) linearis Geometriæ usum (2) linearium *L* 4 f. Neqve ... ferre *erg. L* 8 Itane vero? *erg. L* 10 dicere, (1) | post *nicht gestr.* | (2) praeter *L* 11 libros (1) inutiles (2) supervacuos *L* 12 ut (1) elegantia ca (2) propositiones *L* 13 referantur (1). Ita (2), qvo *L* 15 uti (1) se ajebat (2) suadebat *L* 15 latera (1) homologa (2) proportionalia *L* 17 ad (1) immensos saepe (2) ingentes saepe calculos (a) assurgi, (b), reductu *L* 18–20 Adde ... investigare (1) saepe nec (2) plerumqve ... est *erg. L*

7 inquit: Vgl. z. B. Fr. van SCHOOTEN, *Praefatio ad lectorem*, in: R. DESCARTES, *Geometria*, 1659, DGS I Bl. 2 r° („Nec enim video, quid impraesentiarum, post mediocrem in Arithmeticae et Geometriæ elementis exercitationem, calculique, eadem Introductione explicati, notitiam, Lectori moram injicere possit, quo minus inoffenso pede ad hanc Geometriam accedat“), sowie Fr. van SCHOOTEN, *Commentarii*, 1659, DGS I S. 206 f. 15 duobus ... Theorematis: R. DESCARTES, *Lettres*, Bd 3, 1667, S. 461 (DO IV S. 38); bei den Theoremen handelt es sich um EUKLEIDES, *Elementa*, I, 47 u. VI, 4.

Ego igitur media sententia antecedendum arbitror; egregias propositiones in literas referri, et quod hinc sequitur, ubi res postulat adhiberi debere arbitror. Proposito problemate primum elementa experiunda, antequam ad calculum accedatur qui non nisi difficilioribus i n v e n i e n d i s servari debet. De demonstrationibus jam inventorum si literalis pariter ac linearis, suas quaeque peculiares elegantias habeat, posse utramque exhiberi, quemadmodum nihil prohibet, duas ejusdem theorematis dari demonstrationes lineares; si alterutra earum elegans videatur, altera simplicem calculi tramitem sequatur praefterri debere. Si neque literae neque lineae quicquam singulare exhibeant inter demonstrandum; literales demonstrationes lectori, lineares scriptori utiliores.

Exemplum subjiciam unicum a me observatum: Dixerat Cartesius ex calculo sibi constare: si Circulus parabolam secet, demissarum ex punctis intersectionis in axem parabolae perpendicularium ab uno latere summam; summae perpendicularium ab altero latere aequari. Schotenius ut theorematis veritatem calculo investigaret, tres credo paginas in suis *Commentariis* complevit; hoc cum animadvertisset Jac. Gregorius Scotus, demonstrationem investigavit Geometricam sic satis elegantem. Ego vero reperi, per analysin demonstrari posse tribus verbis: eademque opera etiam detexi qua ratione Theorema tam elegans invenerit Cartesius, et qua ratione innumera alia similia in aliis curvis, sese

1 f. egregias (1) theorematata (2) propositiones in literas (a) referenda (b) referri *L* 2 f. postulat (1) adhibendas cum fructu (2) adhiberi (a) posse (b) debere arbitror. (aa) De qvo (bb) De demonstrationibus | (autem jam inventorum) erg. | cum ita sentio (aaa) literalem (bbb) si literalis pariter ac linearis (cc) proposito (aaa) ad inveniendum (bbb) problemate *L* 8 neqve (1) calculus (2) literae *L*
 9 demonstrandum; (1) calculus (2) literas (3) literales *L* 11 f. secet (1) in punctis (2) demissarum (a) in (b) ex ... perpendicularium (aa) summam, unius (bb) ab uno ... ab (aaa) uno (bbb) altero *L*
 13 ut (1) theorema hoc (2) theorematis *L* 15 Geometricam (1) prolixius (2) non admodum (3) sic satis *L* 16 ratione (1) prob (2) Theorema *L* 17 curvis, (1) inter se (2) sese *L*

10 Dixerat: Vgl. R. DESCARTES, *Geometria*, 1659, *DGS* I S. 92. 14 complevit: Vgl. Fr. van SCHOOTEN, *Commentarii*, 1659, *DGS* I S. 330–343. 15 demonstrationem: Vgl. J. GREGORY, *Geometriae pars universalis*, 1668, prop. 70, S. 130–132. 15 reperi: Ein kurzer algebraischer Beweis macht sich zunutze, dass sich die Schnittpunkte von Kreis und Parabel über eine Gleichung 4. Grades, bei welcher der kubische Term fehlt, berechnen lassen. Aus der Multiplikation der Linearfaktoren aber ergibt sich, dass der Koeffizient dieses kubischen Terms gleich der negativen Summe der vier Wurzeln dieser Gleichung ist, womit diese gleich Null sein muß. Bei seinen Überlegungen zur *constructio aequationum* stellt Leibniz eine Gleichung für die Schnittpunkte von Kreis und Kegelschnitt auf (vgl. VII, 7 N. 7 S. 43–48), von welcher die für den genannten Beweis benötigte ein viel einfacherer Spezialfall ist.

invicem aut circulum secantibus, aliis rectis in axis locum cum opus est adhibitis, concinnari possint, quod neque Schotenius calculo suo, neque Gregorius linearum ductu praesitterint. Quod si ergo haec propositio in aerarium theorematum referri deberet: nemo prudens in dubium revocabit; analyticam demonstrationem caeteris praestare: cum et 5 inventi rationem detegat. Imo si mihi id negotii datum esset, ego problematis instar ita conciperem: Datis duabus curvis se secantibus, invenire lineam rectam in quam demissae ex punctis intersectionis unius lateris angulo dato, simul sumtae; sint rectis alterius lateris simul sumtis aequales. Cujus problematis solutio generalis ostendet in parabola, 10 rectam quaesitam esse ipsum axem; et si angulus datus sit rectus. Hoc ergo theorema, problematis generalis non nisi corollarium erit.

Quoniam ergo de propositionum Geometricarum Aerario, mentio semel iterumque hic incidit: adjiciam paucis: inter potissima Mathematicae doctrinae desiderata a me censeri, librum, omnes propositiones geometricas elegantes hactenus inventas, quanta licet brevitate demonstratas, ipso demonstrandi ordine continentem. Demonstrationes 15 autem tales esse debere, cum licet, ut eadem opera inveniendi rationem ostendant. Usus ingens foret tum ad inveniendum, (theorematis paeclaris omnibus velut in conspectu positis), tum ad demonstrandum. Multa enim apud Archimedem et ejus commentatorem Eutocium; apud Apollonium, Pappum; et alias veteres paeclare demonstrantur. Adjici-

1 locum (1) exhibitis, (2) exhiberi (3) cum L 2 ductu (1) invenissent (2) praestiterint L
 5 ego (1) theorematis (2) problematis L 6 duabus (1) curvis (2) curvis se (3) lineis (4) curvis L
 6f. lineam (1) in qvam ductae ex uno latere ex punctis intersectionis rectae angulo dato (2) rectam L
 9 et (1) angulum esse rectum. d (2) si angulus L 12 potissima (1) scientiae huius (2) Mathematicae | doctrina ändert Hrsg. | desiderata L 13 geometricas erg. L 14 demonstratas | continentem
 streicht Hrsg. |, ipso L 15 ostendant. (1) Possis Euclidis continuationem appellare (2) Usus L
 18–83,3 demonstrantur. (1) Adjecta sunt insignia qvaedam theorematata (2) Adjectae sunt insignes propositiones (3) Adjiciendae ... a (a) Galilaeo (b) Commandino, | Clavio erg. | ... | Stevino erg. | ... Gregorio
 a S. V. (aa) Robervall (bb) Cartesio (aaa) Robervallio (bbb) Fermatio ... | Pascalio erg. | ... | Slusio,
 Robervallio erg. | | Huddenio erg. | ... Heuratio |, Huddenio streicht Hrsg. |; aliis; L

17 Archimedem: Vgl. etwa ARCHIMEDES, *De sphaera et cylindro*; DERS., *Dimensio circuli*; DERS., *De spiralibus*; DERS., *De planorum aequilibris*; DERS., *De conoidibus et sphaeroidibus*; DERS., *De planorum aequilibris*; DERS., *Quadratura parabolae*. 18 Eutocium: Vgl. EUTOKIOS, *Commentarii in libros Archimedis*. 18 Apollonium: Vgl. APOLLONIOS, *Conica*. 18 Pappum: Vgl. PAPPOS, *Mathematicae collectiones*.

endae sunt insignes propositiones a Commandino, Clavio, Vieta, Stevino, Luca Valerio, Galilaeo, Guldino, Cavaliero, Gregorio a S. V., Cartesio, Fermatio, Torricellio, Pascasio, Hugenio, Slusio, Robervallio, Huddenio, Wrenno, Wallisio, Heuratio; aliis; quibus saepe lubens uterer inter demonstrandum compendii causa, nisi a ratione alienum videretur; lectorem unius tuae demonstrationis intelligendae causa ad tot alios autores non omni-

1 Commandino: Federico Commandino besorgte eine Anzahl lateinischer Übersetzungen von mathematischen Werken der griechischen Antike, die er zum Teil auch kommentierte. 1 Clavio: Gemeint ist wohl Clavius' Euklidausgabe *Elementorum libri XV*, 4. Ausg. 1607 [Marg.]. Clavius war aber auch Autor eines eigenständigen, von Leibniz rezipierten Werkes zur Geometrie; vgl. Chr. CLAVIUS, *Geometria practica*, 1604.

1 Vieta: Vgl. Fr. VIÈTE, *Supplementum geometriae*, 1593 (VO S. 240–257); DERS., *Variorum de rebus mathematicis responsorum liber VIII*, 1593 (VO S. 347–435); DERS., *Ad Adr. Romani problema responsum*, 1595 (VO S. 305–324). 1 Stevino: Vgl. S. STEVIN, *Problematum geometricorum libri V*, 1583, sowie die von Albert Girard herausgegebene und kommentierte Werkausgabe *Les oeuvres mathematiques de Simon Stevin*, 1634, Tl. III, *La pratique de géometrie* (S. 341–432).

1 Luca Valerio: Vgl. L. VALERIO, *De centro gravitatis solidorum*, 1604; DERS., *Quadratura parabolae*, 1606. 2 Galilaeo: Vgl. G. GALILEO, *Discorsi e dimostrazioni matematiche*, 1638 (GO VIII S. 39–318); M. MERSENNE, *Les nouvelles pensées de Galileo*, 1639. 2 Guldino: Vgl. P. GULDIN, *Centrobaryca*, 1636–41. 2 Cavaliero: Vgl. B. CAVALIERI, *Geometria indivisibilibus promota*, 1635; DERS., *Exercitationes geometricae*, 1647. 2 Gregorio a S. V.: Vgl. Gr. de SAINT-VINCENT, *Opus geometricum*, 1647.

2 Cartesio: Vgl. R. DESCARTES, *Geometria*, 1659, DGS I. 2 Fermatio: Zu Lebzeiten veröffentlichte Pierre de Fermat selbst keine seiner mathematischen Schriften. Ohne ihn als Autor zu nennen, wurde 1660 *De linearum curvarum* publiziert. Eine Reihe seiner Manuskripte, deren Ergebnisse Pariser Mathematikern oftmals schon seit längerem bekannt waren, wurde posthum in P. de FERMAT, *Varia opera*, 1679 [Marg.], abgedruckt. Darunter waren auch solche zur Geometrie, etwa die 1657–58 entstandene Schrift *De solutione problematum geometricorum* (*Varia opera* S. 110–114, FO I S. 118–132). 2 Torricellio: Vgl. E. TORRICELLI, *Opera geometrica*, 1644 (TO I, 1 S. 1–230 u. TO I, 2 S. 101–232). 2 Pascasio: Vgl. Bl. PASCAL, *Essay pour les coniques*, 1640 (PO I S. 252–260); DERS., *Histoire de la roulette*, 1658, lat.: *Historia trochoidis*, 1658 (PO VIII S. 195–223); sowie die unter dem Pseudonym Amos Dettonville verfassten *Lettres de A. Dettonville contenant quelques-unes de ses inventions de géométrie*, 1658–59 (PO VIII S. 323–384 u. IX S. 1–149). 3 Hugenio: Vgl. etwa Chr. HUYGENS, *Theorema de quadratura hyperbolae, ellipsis et circuli*, 1651 (HO XI S. 281–337); DERS., *De circuli magnitudine inventa*, 1654 (HO XII S. 113–181); DERS., *Réduction de la rectification de la parabole*, 1657 (Ms.); DERS., *Recherches sur les propriétés géométriques de la cycloide*, 1658 (Ms.); DERS., *Recherches sur la théorie des développées*, 1659 (Ms.) (HO XIV S. 387–405); DERS., *Demonstratio regulae de maximis et minimis*, 1667 (Ms.) (HO XX S. 229–241); DERS., *Regula ad inveniendas tangentes linearum curvarum*, 1667 (Ms.) (HO XX S. 243–255); DERS., *Horologium oscillatorium*, 1673 [Marg.], S. 42–58 (HO XVIII S. 158–187).

3 Slusio: Hier dürfte neben dem *Mesolabum* von 1668 insbesondere Sluses Tangentenbrief in den *Philosophical Transactions* von 1672/73 gemeint sein. 3 Robervallio: Bereits M. MERSENNE, *L'optique et la catoptrique*, 1651, S. 117, hatte Gilles Personne de Roberval als „Nostre Geometre“ bezeichnet und dabei dessen geometrische Arbeiten über die Oberflächen verschiedener Brennspiegel genannt. Leibniz erwähnt diese Bemerkung Mersennes im Oktober 1674 (vgl. VII, 5 N. 74 S. 91).

bus obvios remittere: ita cogimur saepe inviti, eadem denuo demonstrare, taedio nostro pariter et lectorum peritorum. Cui malo mederetur liber si quis producet aliquando quo continuarentur quodammodo Euclidis *Elementa*, qui versaretur in omnium manibus, et quem a doctis accurate examinatum, tuto postea allegari posse constaret. Et tale quidam ab Academia Scientiarum Regia expectare videtur orbis, quod ad Gloriam ejus dudum florentem magnopere pertineret. Quanquam autem Euclidis exemplo doctrinam Analyticam generalem seu de rationibus, doctrinam de magnitudinum commensurabilitate aut incommensurabilitate seu de numeris, ac denique doctrinam de spatiis et de motibus quibus spatia aut eorum partes designantur, quae mere Geometrica est comprehendti uno opere necesse sit, scientiae enim istae non nisi ab ignaris divellerentur: ausim dicere duabus artibus, scilicet novorum quorundam symbolorum ad Geometricas designationes accommodatione, et multorum casuum particularium revocatione ad propositiones generales, effici posse, ut formae quadratae mediocris (in quarto vocant) librum non exeat volumen nulli facile praestantia et fructu cessurum. Aequitatis etiam erit cuilibet propositioni adscribi autorem suum si modo extra controversiam sit quod unum saepe pretium laboribus suis postulant Viri summi, et tum inventa tum inventores ab oblivione et plagiriorum malitia vindicari; et thesaurum quendam publicum condi, qui novis quotidie eruditorum collationibus locupletetur.

5 qvod (1) ut plurimum (2) ad Gloriam L 7 Analyticam (1) geometri (2) generalem L
 8 f. et de (1) spatiorum mutationibus seu motibus (2) motuus (3) motibus L 11 artibus (1) altera
 (2) scilicet L 12 accommodatione, (1) altera (2) et (a) part (b) multorum L 15 adscribi (1)
 inventorem (2) autorem L 15 si modo ... sit erg. L 17 et plagiriorum malitia erg. L

11,3 Huddenio: Die Tangentenmethode von Hudde findet sich in J. HUDD, *Epistolae duae*, 1659, *DGS* I S. 507–516. Huddes geometrische Lösung von Gleichungen 3. und 4. Grades mit sich abwechselnden Vorzeichen gibt Schooten in seinem Kommentar zu Descartes' *Geometria* wieder; vgl. Fr. v. SCHOOTEN, *Commentarii*, 1659, *DGS* I, S. 325–328. **11,3** Wrenno: Vgl. Chr. WREN, *Generatio corporis cylindroidis hyperbolici*, 1669. Ergebnisse von Wren wurden auch publiziert in J. WALLIS, *Tractatus duo*, 1659, S. 70–76 (*WO* I S. 533–537), sowie in DERS., *Mechanica*, 1670–71, S. 556–567 (*WO* I S. 929 bis 938). **11,3** Wallisio: Vgl. J. WALLIS, *Tractatus duo*, 1659 [Marg.] (*WO* I S. 489–569); DERS., *Opera mathematica*, 2 Bde, 1656–57; DERS., *Mechanica*, 1670–71 (*WO* I S. 570–1063). **11,3** Heuratio: Vgl. H. van HEURAET, *Epistola de transmutatione curvarum linearum in rectas*, 1659, *DGS* I S. 517–520.

12. GENERATIO CIRCULI

[November 1675 – Januar 1676]

Überlieferung: *L* Notiz: LH 4 IV 13c Bl. 33. 1 Streifen ca 20×5 cm. 3 Z. unten auf Bl. 33 r^o. Darüber die Aufzeichnung VI, 3 N. 29₁. Der Streifen hing ursprünglich zusammen mit LH 35 X 8 Bl. 1 (= VII, 5 N. 57).
Cc 2, Nr. 1405 tlw.

5

Datierungsgründe: Die Aufzeichnung dürfte kurz nach dem von den Herausgebern auf November 1675 – Januar 1676 datierten VII, 5 N. 57 entstanden sein.

Videtur simplicius intelligi generatio circuli quam rectae. Sit figura quaedam certo sui puncto manens in certo loco, eo modo mutans locum, ut sibi semper ipsi similis appareat respectu eorundem extra ipsum, certum aliquod punctum in ea sumtum describet arcum circuli. Imo Δ . Opus ut sit plana figura. Δ .

10

9 Sit (1) Linea rigida qvaecunqve (2) qv (3) figura *L* 11 respectu ... ipsum *erg. L* 12 sit (1) planum (2) plana *L*

13. CYLINDER SINUUM EX APPLICATIS PARABOLICIS
 [Sommer 1673]

Überlieferung: L Notiz: LH 42 V Bl. 7. Ca $\frac{2}{3}$ eines Bl. 2°, von dem die linke untere Ecke abgeschnitten und die rechte untere Ecke ausgerissen sind. 9 Z. auf Bl. 7 r°. Darunter eine Aufzeichnung zur Rechenmaschine (Druck in Reihe VIII vorgesehen). Bl. 7 v° leer.

5

Cc 2, Nr. 00

Datierungsgründe: Das Wasserzeichen des Papiers ist für Ende 1672 bis Herbst 1673 nachgewiesen. Die inhaltlichen Bezüge zu VII, 4 N. 26 u. VII, 4 N. 31 deuten auf eine Entstehung im Sommer 1673 hin.

$$\sqrt{ax} \wedge \sqrt{ax} \text{ vel } \sqrt{ax} \wedge \sqrt{a^2 - ax} = \sqrt{a^3x - a^2x^2}, \cup a = \sqrt{ax - x^2}. \text{ Sinus.}$$

$$\begin{array}{c} \wedge \quad \wedge \\ x \quad a - x \end{array}$$

Ergo parabolicae applicatae in se inverse ductae cylindro sinuum aequantur.

$$a^2 -, a - x \square. fiet a^2 - a^2 - x^2 - 2ax.$$

$$\begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ a^2 + x^2 - 2ax \end{array}$$

$$\sqrt{\frac{\beta a}{\gamma} x} = \sqrt{\frac{\beta^2 a^2}{\gamma^2} - \frac{\beta a x}{\gamma}} \wedge [\sqrt{]} a x = \sqrt{\frac{\beta^2 a^3 x}{\gamma^2} - \frac{\beta a^2 x^2}{\gamma}}. \text{ Divisum per } a \text{ dat}$$

$$\begin{array}{c} \wedge \\ \frac{\beta a}{\gamma} - x \end{array}$$

$$\sqrt{\frac{\beta^2 a}{\gamma^2} - \frac{\beta}{\gamma} x^2} = z \text{ applicata Ellipseos quia } z^2 = \frac{\beta^2 a}{\gamma^2} - \frac{\beta x^2}{\gamma}. \text{ Ergo } \frac{\beta z^2}{\gamma} = v^2 = \frac{\beta a}{\gamma} - x^2.$$

9 $\cup a$: Leibniz rechnet hier und in der Folge fortlaufend. 11 Ergo ... aequantur: Vgl. VII, 4

N. 26 prop. 2 S. 426 sowie VII, 4 N. 31 S. 550. 12 $-2ax$: Richtig wäre $+2ax$. 16 $\sqrt{\frac{\beta^2 a}{\gamma^2}}$: Richtig

wäre $\sqrt{\frac{\beta^2 a x}{\gamma^2}}$. Leibniz rechnet konsequent weiter und setzt dann irrtümlich eine Gleichung für $\frac{\beta z^2}{\gamma}$ statt

für $\frac{\gamma z^2}{\beta}$ an. Die Versehen beeinträchtigen die Rechnungen, jedoch nicht die allgemeine Aussage.

14. DE MODIS EXPRIMENDI SERIES

[Herbst 1672 – Anfang 1673]

Überlieferung: *L* Notiz: LH 35 V 3 Bl 8. 1 Zettel ca. 19,3 × 5,8 cm. 1 S.
Cc 2, Nr. 00

Datierungsgründe: Zum „fundamentum“ einer Folge vgl. VII, 3 N. 1, 4, 6, 8. [noch]

5

D e m o d i s e x p r i m e n d i s e r i e s ,
s e u d e e a r u m r e g u l i s f u n d a m e n t a l i b u s

Progressiones aliae sunt fundamenti simplicis, aliae fundamenti compositi, fundamentum simplex est: cum dato termino uno, inveniri potest sequens, fundamentum compositum est, cum opus est pluribus terminis antecedentibus ad inveniendum sequentem; et prout multis terminis opus est, fundamentum est compositum primi, secundi[,] tertii gradus. Fundamentum maxime compositum est, cum opus est omnibus terminis praecedentibus cognitis, ad inveniendum sequentem.

10

9 inveniri (1) possunt seqventes (2) potest *L*

15. EXEMPLA AEQUATIONIS QUADRATICAET BIQUADRATICAET
[10.–11. Oktober 1675]

Überlieferung: L Konzept: LH 35 XIII 1 Bl. 408–409. Rest eines Bog. 2°: Von Bl. 408 fehlt oben ein Ausschnitt von ca $20 \times 18,5$ cm, im unteren Drittel ein Streifen von ca $17,5 \times 1,5$ cm; von Bl. 409 fehlt unten ein Streifen von ca $19,5 \times 4$ cm. 9 Z. gegenläufig auf Bl. 408 v°. Die ersten 8 Zeilen sind vom Schluss des Textes von VII, 7 N. 55 überschrieben, die Zahlenbeispiele am Ende von Z. 20 stehen unterhalb des herausgeschnittenen Streifens.
— Auf dem Rest des Trägers N. 16 sowie VII, 5 N. 33; VII, 6 N. 10; VII, 7 N. 55.
Cc 2, Nr. 00

10 Datierungsgründe: Bei dem vorliegenden Stück handelt es sich um Notizen, die Leibniz vor N. 16 und vor VII, 7 N. 55 verfasste. Sie sind dem Duktus nach vermutlich zusammen mit den Aufzeichnungen von VII, 6 N. 10 entstanden, die wahrscheinlich nach VII, 5 N. 32 vom 10. Oktober 1675 und vor dem auf den 11. Oktober 1675 datierten VII, 5 N. 33 verfasst sind.

$$x^4 \boxed{+px^3} + qx^2 + rx + s \sqcap 0.$$

$$\begin{array}{rcl} 15 \quad x - 3 \sqcap 0 & x - 3 \sqcap 0 & x + 4 \\ x + 4 \sqcap 0 & x + 4 & x + 4 \sqcap 0 \\ \hline & x^2 - 3x & x \sqcap -4 \\ x + b & \frac{+4x - 12}{x^2 + 1x - 12 \sqcap 0} & x^2 + 1x \sqcap 12 \\ x + c & \hline & \\ 20 \quad x^2 + bx & \langle 9 \rangle + 3 - 12 \sqcap 0 & \frac{x+1}{\langle 1 \rangle} \sqcap \frac{12}{x} \quad \frac{-4+1 \sqcap -3}{1} \sqcap \frac{12}{-4} \quad \frac{3+1}{1} \sqcap \frac{12}{3} \\ & + c \bullet +bc & \end{array}$$

14 Darüber: $p \sqcap s \sqcap -10$

16. INSTRUMENTUM AD CONSTRUCTIONEM AEQUATIONUM
 [Mitte bis Ende Oktober 1675]


Überlieferung: L Konzept: LH 35 XIII 1 Bl. 408–409. Rest eines Bog. 2°: Von Bl. 408 fehlt oben ein Ausschnitt von ca $20 \times 18,5$ cm, im unteren Drittel ein Streifen von ca $17,5 \times 1,5$ cm; von Bl. 409 fehlt unten ein Streifen von ca $19,5 \times 4$ cm. 7 Z. auf Bl. 408 r°. — Auf dem Rest des Trägers die Aufzeichnung zur Gleichungslösung N. 15 sowie VII, 5 N. 33; VII, 6 N. 10; VII, 7 N. 55.

Cc 2, Nr. 1069

5

10

Datierungsgründe: Bei dem vorliegenden Stück handelt es sich um Notizen, die Leibniz nach den in N. 15 und in VII, 6 N. 10 gedruckten Aufzeichnungen und vermutlich kurz nach der auf den 11. Oktober 1675 datierten Studie VII, 5 N. 33 verfasste. Sie ist vor VII, 7 N. 55 geschrieben.



[Fig. 1]

12 Über der Figur: $x^3 - px^2 \sqcap qx + r$

Ope catenularum delicatarum, et lineae logarithmicae in materia solida descriptae in qua assurgere aliquid ac descendere possit, possunt construi omnes aequationes, catenulae ibunt *BAECDGF*. Sed pro exactioribus operationibus adhibendaे essent regulae. Credo tamen catenulas bene elaboratas satis aptas tolerabilibus operationibus, imo in magno instrumento etiam exactis.

Forte hoc instrumento solvi poterunt etiam aequationes plurium incognitarum, ut:
 $x^2 + y^2 = c$, $cy + bx^2 + dx = e$. Δ .

$$7 \text{ n. e. } (1) x^2 - c \quad (2) x \nmid \frac{c - y^2}{x} \text{. et } x \nmid \frac{e - cy}{bx + d} \quad (3) \Delta L$$

17. DE CONOEIDIBUS

[1673 (?)]

Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 VII 1 Bl. 80. 1 Bl. 8°. 1 S.
Cc 2, Nr. 00

Datierungsgründe: [noch]

5

Trouver une ligne, surface plane, courbe, solide homogene, à une ligne[,] surface, solide. Par exemple les Elemens du Conoeide Parabolique sont en raison des appliquées du Triangle. Eodem modo inveniri potest solidum, cuius Elementa seu plana secundum axem sint in ratione applicatarum hyperbolae, seu in ratione altitudinum reciproca. Hoc erit Conoeides Hyperboloidicum generatum esse rotatione circa suum axem figurae, cuius applicatae sunt in ratione altitudinum reciproca subduplicata, nam harum applicatarum quadrata, erunt in ratione altitudinum reciproca. Ergo et circuli applicatarum rotatione facti. Habemusque sic Methodum generalem solvendi hoc problema: Datae figurae planae conoeides proportionale exhibere. Nimirum Figura plana cuius Elementa sint in subduplicata ratione figurae planae datae, rotetur circa suum axem; et Conoeides productum erit figurae planae datae proportionale. Hinc habemus Methodum datae cuilibet figurae planae exhibendi solidum proportionale. Superficiem autem conoeidicam datae figurae proportionalem exhibemus ipsius figurae datae descripto Conoeide. Itaque etiam cuilibet figurae planae superficiem curvam proportionalem exhibere possumus. Lineae etiam cuilibet proportionalem figuram curvam exhiberi posse constat. Hoc autem conoides secando aliter habebuntur aliae series quae ad priorem reducentur.

10

15

20


6 Trouuer (1) un solide homogene à un plan. (2) | une erg. Hrsg. | ligne *L* 7 sunt *L* ändert Hrsg.

18 exhibemus: Die Mantelfläche des Konoids ist nicht proportional zur Fläche unter der erzeugenden Kurve. Damit ist auch die Folgerung unbegründet.

18. QUADRATURA PER FIGURAE COMPLEMENTUM
 [Herbst 1675 (?)]

Überlieferung: L Konzept: LH 35 VII 1 Bl. 25. 1 Zettel von max. 19,4 × 4,3 cm. 10 Z.
 auf Bl. 25 r°. Am unteren Rand Gleichung mit binomischer Formel ohne Bezug zum Text:
 5 $y^3 \sqcap x^3 + a^3 + 3a^2x + 3ax^2$.
 Cc 2, Nr. 00

Datierungsgründe: [Wz-Rest; noch]




[Fig. 1]

10 Trianguli quaeritur area, seu summa omnium x . seu summa omnium AB . seu summa
 omnium BC . Hoc ut fiat necesse est ut in considerationem intret etiam finitam esse
 lineam ABD . trianguli altitudinem. Bisecetur in E . compleatur rectangulum $ADFG$, id
 est quadratum GA , quia supposui $AB \sqcap BC$. Producatur BCH dum ipsi FG occurrat in
 H . Eodem modo ducatur MNL , posito $DM \sqcap AB \sqcap GH$ erit $HC \sqcap MN$. et $BC \sqcap LN$.
 Ergo $BC + MN \sqcap GA$. et in quibuslibet aliis punctis binis simul semper fiet GA . Ergo
 15 ubi ad E ventum erit, cessabitur, et fiet rectang. $GAE \sqcap$ Triangulo ADF .

10 omnium | AC ändert Hrsg. | Hoc L 14 fiet | GH ändert Hrsg. | ergo L

9 Trianguli quaeritur area: Vgl. VII, 1 N. 36 S. 227 f. sowie VII, 3 N. 19 S. 246.



[Fig. 2]

Haec et cycloidi et infinitis aliis idgenus applicari possunt si AB arcus \sqcap applicatae BC , et sit infra portio priori aequalis, et similis $FME \sqcap ABE$ et $MN \sqcap$ arcui AEM erit rursus $MN + BC \sqcap$ curvae Totae.

2 cycloidi: Vgl. H. FABRI, *Synopsis geometrica*, 1669, S. 382f. und die zugehörige Figur 24 auf Tafel 3 [Marg.] (Vermerk in VII, 4 N. 1 S. 21) sowie VII, 5 N. 74.

19. LALOUVERAE SPECULATIONES GEOMETRICAE
1673

Überlieferung: *L* Notiz: LH 35 III A 22 Bl. 5. 1 Zettel max. 18,5 × 3,5 cm. 5 Z. auf Bl. 5 v°.
Bl. 5 r° leer.

5 La l o u v e r a , nepos Jesuitae, qui in Helvetia nunc est cum Domino de S. Romain,
Legato Regis Franciae 1673, habet speculationes Geometricas, quibus promittit omnia
revocare ad demonstrationes faciles et manifestas.

6 Legato ... 1673 erg. *L*

5 Lalouvera: S. de La Loubère. 5 Jesuitae: A. de La Loubère. 6 Legato: Der Gesandte
M. de Harod de Senevas, Marquis de Saint-Romain, war am 18. November 1672 in Solothurn eingetroffen.
6 speculationes: vgl. S. DE LA LOUBÈRE, *De la résolution des équations, ou de l'extraction de leurs
racines*, 1732.

20. TABULA PYTHAGORICA IN MANU NOSTRA INSCRIPTA
[nach Mitte 1674]

Überlieferung: L Konzept: LH 35 I 14 Bl. 86. 1 Streifen von ca 18,5 cm × 7 cm. 1 S. auf Bl. 86 v°, Vorderseite leer.
Cc 2, Nr. 496

5

Datierungsgründe: [noch]

T a b u l a p y t h a g o r i c a i n m a n u n o s t r a i n s c r i p t a

Das Einmahl eins oder die Multiplication in den Händen:
Zwey Zahlen v. g. 7, et 8. deren keine großer als 10, sind gegeben in einander zu multipliciren. Thue die finger alle nieder, oder mache beyde hände zu. Alsdann hebe an der einen hand soviel finger auff, als die differenz der einen zahl 7 von 10 macht v. g., 3 an der anderen hand, soviel als die andre, 8 (differt) v. g. 2. Zehle alle finger so nieder, sind 5, multiplicire die differentien in einander sind, 6, das productum 56. Dieses muste auch angehen zum großen einmahl eins.

10

$$\begin{array}{rcl} 10 - 7 \sqcap 3. & 10 - 8 \sqcap 2. & 10 - a - b \\ 10 - a & 10 - b & 10 \\ ab & \sqcap & \overline{100 - 10a - 10b} + 100 - 10a - 10b + ab \end{array}$$

15

Unde patet difficultatem transferri a multiplicatione numerorum datorum ad mutliplicationem differentiarum a 10; ideoque non habere usum nisi quando numeri dati notabiliter majores sunt differentiis suis, seu valde accedunt ad 10. Idem est de 100. Observatio haec cum sua demonstratione est in *nouveaux Elemens de Geometrie*.

20

7 T a b u l a ... i n s c r i p t a erg. L 14f. eins. | 44, ^ 43, 100 - 44 \sqcap 56, 100 ^ 43 \sqcap 55
gestr. | 10 - 7 \sqcap 3. L

15–17 Leibniz stellt das Verfahren auf die Probe, indem er das Beispiel 7×8 verallgemeinert. Allerdings macht er einen Fehler an der Zehnerposition: Es müsste in Z. 15 nicht $10 - a - b$, sondern $10 - (10 - a) - (10 - b)$ heißen. Nach Multiplikation mit 10 ergäbe sich in Z. 17 statt $100 - 10a - 10b$ dann $-100 + 10a + 10b$, und nach Addition von $100 - 10a - 10b + ab$ bliebe dann ab übrig, was korrekt ist. 21 *nouveaux*: [A. ARNAULD], *Nouveaux elemens de geometrie*, 1667, liv. I, § LXIII, S. 14 f.

21. CALCULUS PER DIVISIONES

29. Oktober 1675

Überlieferung: L Konzept: LH 35 IV 13 Bl. 19. Ca. $\frac{1}{3}$ Bl. 2°. 1 S.
Cc 2, Nr. 1093

5 29. Octob. 1675.

Calculus per divisiones loco multiplicationum $\frac{a}{\frac{b}{c}}$ loco $\frac{ac}{b}$

Observatio venit in mentem, qua possint omnia reduci ad meros terminos simplices continuarum divisionum, cum contra reducere soleamus omnia ad terminos continuarum multiplicationum.

10 Sit: $\frac{a}{c} + \frac{d}{f} + \frac{g}{l} \sqcap x$. Reducamus. Multiplicantur omnes termini per cfl . fiet: $\frac{afl}{b} + \frac{cdl}{e} + \frac{cgl}{h} \sqcap cflx$.

Rursus multiplicetur producta aequatio per beh. fiet: $aeflh + bcdhl + bcegl \sqcap bcefhlx$. Prior autem expressio aptior ad constructiones lineares.

Sed video id ineptum esse, si hoc modo explicetur, in $\frac{a}{\frac{b}{c}}$. ipsam c . dividere ipsam
15 $\frac{a}{b}$. Tunc enim $\frac{a}{b} \sqcap \frac{a}{bc}$. Itaque sic explicabimus quasi esset: $\frac{a}{\frac{b}{c}}$. Nam et continuari posset
hoc modo $\begin{pmatrix} a \\ \frac{b}{c} \\ \frac{c}{d} \end{pmatrix}$. Sed sufficiet nos uti his tribus, nam in rei veritate $\frac{a}{\frac{b}{c}} \sqcap \frac{ca}{b}$. et vero statim

6 Calculus ... loco $\frac{ac}{b}$ erg. L 10 Sit: (1) $\frac{b}{c} + \frac{e}{f}$ (2) $| \frac{a}{b} + \frac{d}{e} + \frac{g}{h} \ddot{\text{a}}ndert Hrsg. | \sqcap x L$
 $\frac{d}{c} \qquad \frac{f}{e} \qquad \frac{l}{1}$

10 per | dfl. ändert Hrsg. | fiet L 13 prior ... lineares erg. L

11 $+ \frac{cgl}{h}$: Richtig wäre $+ \frac{cfg}{h}$ und in der folgenden Zeile $+ bcefg$ statt $+ bcegl$. Das Versehen wirkt sich nicht weiter aus.

reduci potest ut $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}$ idem est quod $\frac{ac}{bd}$. Interim hoc modo exprimendo evitaremos omnes

multiplicationes, sive sic diceremus $\frac{a}{\frac{b}{c}}$ sive sic $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}$. Quorum illud $\frac{ac}{b}$, hoc $\frac{a}{bc}$.

Verum jam hinc ostendit natura rerum non divisionem sed multiplicationem esse naturalionem et aptiorem, quia in ipsa nullae lineoleae necessariae ad exprimendam va-

rietatem. Interim leges calculi hujusmodi tradi possent nempe si $\frac{ac}{b}$ velimus reducere ad

meras divisiones, non poterimus aliter quam scribendo sic: $\frac{a}{\frac{b}{c}}$. et $\frac{a}{bc}$ sic: $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}$.

Sed videndum quid in compositis sive comprehensionibus, ut $b+c \cap b-c \sqcap a^2$. Tunc
vero apparent incommoditas divisionis fiet enim $b+c \sqcap \frac{a^2}{b-c}$. Sed non potest $\frac{a^2}{b-c}$ reduci
ad terminos simplices, nisi infinitos; nec potest fieri nominator simplex, quemadmodum
numerator.

5

10

3 f. esse (1) rectam, qvia (2) naturaliorem | et erg. Hrsg. | aptiorem L

22. CARTESII COGITATIONES PRIVATAE

1. u. 5. Juni 1676

Überlieferung: *E* Erstdruck nach nicht aufgefunderer Abschrift von Leibniz aus einer verschollenen Handschrift von Descartes: (mit frz. Übers.) FOUCHER DE CAREIL, *Oeuvres inédites de Descartes*, Bd I, 1859, S. 2–57. (Unsere Druckvorlage.) — Weitere Drucke: 1. (nach *E* mit zahlreichen Korrekturen) *DO X*, 1908, S. 213–276; 2. (teilw., nach 1.) *JB I*, 1939, S. 360–364; 3. (teilw., in engl. Übers.) DESCARTES, *Philosophical Writings* (Anscombe), 1954 (u. ö.), S. 3 f.; 4. (teilw., in frz. Übers.) DESCARTES, *Oeuvres philosophiques* (Alquié), I, 1963, S. 45–51; 5. (teilw., in japan. Übers.) DESCARTES, *Shisaku shiki-Yakukai*, 1978, S. 1–22; 1980, S. 1–37; 1982, S. 1–50; 1984, 1–31; 6. (teilw., in engl. Übers.) DESCARTES, *Philosophical Writings* (Cottingham), Bd I, 1985, S. 2–5; 7. (teilw., in japan. Übers.) DESCARTES, *Dekaruto zenshu*, Bd IV, 1993, S. 429–452; 8. (teilw., mit frz. Übers.) DESCARTES, *Les Olympiques*, 1995, S. [41]–44; 9. (teilw., in finn. Übers.) DESCARTES, *Teokset* (Jansson), Bd I, 2001, S. 33–38; 10. (niederl. Übers.) DESCARTES, *Bibliotheek Descartes*, Bd I, 2010, S. 163–194; 11. (nach 1. mit dt. Übers.) DESCARTES, *Cogitationes* (Wohlers), 2011, S. 189–233; 12. (teilw. und in anderer Anordnung) DESCARTES, *Etude du bon sens* (Carraud), 2013, S. 39–160; 13. (teilw., in türk. Übers.) DESCARTES, *Kişisel Düşünceler* (Altuner), 2014, S. 13–20; 14. (mit ital. Übers.) DESCARTES, *Opere postume* (Belgioioso), 2014, S. 1060–1095; 15. (teilw.) *DOC I*, 2016, S. 198–214, 270–274; 16. (japan. Übers.) [DESCARTES], *Shisaku shiki*, 2018, S. 79–109.

Cc 2, Nr. 00

Datierungsgründe: Leibniz hat spätestens im Februar 1676 Zugang zum Nachlass von Descartes erhalten, wie sich aus der auf den 24. Februar 1676 datierten Abschrift der *Remedia et vires medicamentorum* (VIII, 2 N. 76; *DO XI*, S. 641–644) ergibt. Einen Bericht über einen Besuch mit E. W. von Tschirnhaus bei Cl. Clerselier, dem Besitzer des Nachlasses, enthält die Aufzeichnung VI, 3 N. 34. Den im Text (s. u. S. 122 Z. 1–6) beschriebenen Zirkel zur Winkelteilung haben Leibniz und Tschirnhaus bereits in einer Gesprächsnote vom 28. März 1676 skizziert (VII, 1 N. 24 S. 182). Laut den Angaben in *E* notierte Leibniz am Beginn seiner Exzerpte am Rand das Datum des 1. Juni 1676, für die Fortsetzung seiner Abschrift den 5. Juni 1676 (s. u. S. 112 Z. 12). Die Textwiedergabe bei Foucher de Careil weicht von der von Leibniz in dieser Zeit verwendeten Orthographie ab. Die hier vorgenommene Angleichung an die entsprechende Schreibweise von Leibniz sowie in der Ausgabe üblichen Gepflogenheiten wurde ohne zusätzliche Dokumentation im Variantenapparat vorgenommen. Abgesehen von der Überschrift, die von Leibniz oder von Foucher de Careil stammt, werden die in *E* zitierten Randbemerkungen von Leibniz und Einschübe im Text, die dort Leibniz zugeschrieben werden oder vermutlich von Leibniz stammen, als Fußnoten wiedergegeben. Parallelstellen bzw. Paraphrasen zu den Exzerpten finden sich in einigen zeitgenössischen Drucken: POISSON, *Commentaire* (die entsprechenden Abschnitte sind wieder abgedruckt in: *DO X*, S. 197–198, 255, 476); BAILLET bzw. BAILLET, *Abregé* (Auszüge sind abgedruckt in *DO X* S. 179–204). Außerdem befinden sich Parallelstellen in einer Abschrift von weiteren Exzerpten mit dem Titel *Cartesius* im Leibniz-Nachlass (LH 4 I 4k Bl. 19–22, gedr.: *DO XI*, S. 647–653; erneut gedr.: CARRAUD, *Cartesius*). Diese Abschrift wurde von Leibniz' Amanuensis J. D. Brandshagen angefertigt.

Das Wasserzeichen des Papiers ist auch für andere Abschriften von Brandshagen aus dem Herbst 1679 belegt, so dass vermutet werden kann, dass *Cartesius* auf einer Vorlage von Tschirnhaus, der sich auf seiner Rückreise von Paris Mitte Oktober 1679 in Hannover aufhielt, beruht. Eine Textstelle wurde nach dem Druck von Exzerten aus der Handschrift von Descartes in BAILLET geändert.

Cartesii Cogitationes privatae

5

1619. Calendis Januarii.

Ut comoedi, moniti ne in fronte appareat pudor, personam induunt; sic ego hoc mundi theatrum consensurus, in quo hactenus spectator exstiti, larvatus prodeo.

Juvenis, oblatis ingeniosis inventis, quaerebam ipse per me possemne invenire etiam non lecto auctore: unde paulatim animadverti me certis regulis uti.

10

Scientia est velut mulier, quae, si pudica apud virum maneat, colitur; si communis fiat, vilescit.

Plerique libri, paucis lineis lectis figurisque inspectis, toti innotescunt, reliqua chartae implendae adjecta sunt.

5 Cartesii Cogitationes privatae: Die Überschrift stammt von Leibniz oder Foucher de Careil. Laut E notierte Leibniz am Rand den 1. Juni 1676 als Datum des Beginns seiner Abschrift des Textes.

11 f. Scientia . . . vilescit: Vgl. R. DESCARTES, *Regulae ad directionem ingenii*, 1701, S. 11 (DO X, S. 376): „Hanc vero postea ab ipsis Scriptoribus perniciosa quadam astutia suppressam fuisse crediderim, nam sicut multos artifices de suis inventis fecisse compertum est, timuerunt forte, quia facillima erat et simplex, ne vulgata vilesceret“.

Polybi i cosmopolitani Thesaurus mathematicus in quo traduntur vera media ad omnes hujus scientiae difficultates resolvendas, demonstraturque circa illas ab humano ingenio nihil ultra posse praestari, ad quorumdam qui 5 nova miracula in scientiis omnibus exhibere pollicentur vel cunctionem provocandam et temeritatem explodendam; tum ad multorum cruciabiles labores sublevandos qui, in quibusdam hujus scientiae nodis Gordiis noctes diesque irretiti, oleum ingenii inutiliter absument; totius 10 orbis eruditis et specialiter celeberrimis in G. F. R. C. denuo oblatus.

8 Hinter qui, von Leibniz oder Foucher de Careil ergänzt: (F. Ros. Cruc.)

10 Hinter G., von Leibniz oder Foucher de Careil ergänzt: (Germania)

1 Polybiis E ändert Hrsg. nach DO

1–11 Polybi i ... oblat us: Vgl. auch Descartes' Ankündigung gegenüber I. Beeckman in seinem Brief vom 26. März 1619, eine „scientia penitus nova“ vorzustellen (*DO* X, S. 154–160, hier S. 156; *JB* IV, S. 58–61, hier S. 59). Der Titel kann als Anspielung auf eine anonym publizierte Schrift verstanden werden: *Mysterium arithmeticum, sive, cabalistica et philosophica inventio, nova admiranda et ardua, qua numeri ratione et methodo computentur, mortalibus a mundi primordio abdita, et ad finem non sine singulari omnipotentis Dei provisione revelata. Cum illuminatissimis laudatissimisque; Fraternitatis Roseae crucis famae viris humiliter et sincere dicata*, 1615. Vgl. hierzu den Hinweis bei GOUHIER, *Les premières pensées*, S. 132. Zu einer anderen Einschätzung für die Bezeichnung „Polybius cosmopolitanus“ gelangt E. Mehl; vgl. MEHL, *Descartes en Allemagne*, S. 139–146. Auffallend ist, dass J. FAULHABER, *Miracula arithmeticorum*, 1622, S. 59, auf den bevorstehenden Druck eines Werkes seines Freundes „Carolus Zolindius (Polybius)“ in „Venedig oder Pariß“ hinweist. Vgl. hierzu HAWLITSCHÉK, *Johann Faulhaber*, S. 67–70; SCHNEIDER, *Johannes Faulhaber*, S. 98 f. u. S. 181–186; MANDERS, *Descartes et Faulhaber*, S. 7–9. Zur Erwähnung von Venedig als möglichen Aufenthaltsort vgl. im Text selbst S. 103 Z. 6. Die Bedeutung von „denuo“ am Schluss des skizzierten Titels ist in der Forschung umstritten. Möglicherweise ist das Wort Resultat eines Lesefehlers, z. B. für *dono* oder für eine kontrahierte Form von *devotione*. Zur Kontraktion von *devotione* vgl. CAPPELLI, *Dizionario*, S. 96.

Larvatae nunc scientiae sunt quae, larvis sublatis, pulcherrimae apparerent: Catenam scientiarum pervidenti non difficilium videbitur eas animo retinere quam seriem numerorum.

Praescripti omnium ingenii certi limites, quos transcendere non possunt. Si qui principiis ad inveniendum uti non possint ob ingenii defectum, poterunt tamen verum scientiarum pretium agnoscere, quod sufficit illis ad vera de rerum aestimatione judicia preferenda.

Vitia appello morbos animi, qui non tam facile dignoscuntur ut morbi corporis, quod saepius rectam corporis valetudinem experti sumus, mentis nunquam.

Adverto me, si tristis sim aut in periculo verser et tristia occupent negotia, altum dormire et comedere avidissime; si vero laetitia distendar nec edo, nec dormio.

On peut faire en un jardin des ombres qui representent diverses figures, telles que des arbres et les autres: Item, tailler des palissades, de sorte que de certaine perspective elles representent certaines figures: Item, dans une chambre faire que les rayons du soleil, passant par certaines ouvertures, representent divers chiffres ou figures: Item, faire paroistre, dans une chambre des langues de feu, des chariots de feu et autres figures en

10 f. Adverto me si in tristibus sim, aut in periculo verser, aut tristia occupem negotia, altum dormire et comedere avidissime; si vero laetitia distendar non edo nec dormio. *E ändert Hrsg. nach BAILLET, Bd 2, S. 449 (BAILLET, Abregé, S. 339; DO X, S. 215).*

1f. Catenam scientiarum: Vgl. das bei POISSON, *Commentaire*, S. 73 (DO X, S. 255), abgedruckte Zitat: „Quippe sunt concatenatae omnes scientiae, nec una perfecta haberi potest, quia aliae sponte sequantur, et tota simul encyclopedia apprehendatur“. 8f. Vitia ... nunquam: Vgl. hierzu auch die Parallelstelle in *Cartesius*: „Morbi corporis facilius agnoscuntur, quam morbi mentis: quia saepius rectam corporis valetudinem sumus experti; mentis, nunquam.“ (CARRAUD, *Cartesius*, S. 5; DO XI, S. 653). — Die Charakterisierung der Laster als Krankheiten der Seele geht zurück auf PLATON, *Timaios*, 86b bis e. Descartes dürfte bereits im Jesuitenkolleg von La Flèche mit der Diskussion über dieses Thema in Berührung gekommen sein. Vgl. z. B. die 6. Disputation (*De affectionibus animi, quae passiones vocantur*) im einschlägigen Aristoteles-Kommentar *In libros ethicorum Aristotelis ad Nicomachum aliquot Conimbricensis cursus disputationes* (in der Ausgabe Lyon, 1608, Spalte 47–60, insbesondere 57 f.).

12–102,7 On ... chambre: Vgl. VI, 3 Nr. 34, S. 387 Z. 14–17 sowie G. B. PORTA, *Magiae naturalis libri XX*, 1589, lib. XVII, cap. 1–17 u. lib. XX, cap. 9, S. 259–276 u. 302; vgl. die Hinweise bei G. RODIS-LEWIS, „Machineries et perspectives curieuses“, in: *XVIIè siècle. Bulletin de la Société d'étude du XVIIè siècle*, 32 (1956), S. 461–474, sowie bei SHEA, *The Magic of Numbers and Motions*, S. 107 f., Anm. 50.

l'air; le tout par de certains miroirs qui rassemblent les rayons en ces points-là: Item, on peut faire que le soleil, reluisant dans une chambre, semble toujours venir du mesme costé, ou bien qu'il semble aller de l'occident à l'orient, le tout par miroirs paraboliques, et fault que le soleil donne au-dessus du toist, dans un miroir ardent, duquel le point de
5 la reflexion soit au droit d'un petit trou et donne dans un autre miroir ardent, lequel a le mesme point de reflexion aussi au droit de ce petit trou, et rejettera ses rayons en lignes paralleles dedans la chambre.

Anno 1620, intelligere coepi fundamentum inventi mirabilis.

Somnium 1619 nov. in quo carmen, cujus initium:

10 *Quod vitae sectabor iter? ... A u s o n.*

Ab amicis reprehendi tam utile quam ab inimicis laudari gloriosum, et ab extraneis laudem, ab amicis veritatem exoptamus.

15 Sunt quaedam partes in omnium ingeniis quae vel leviter tactae fortes affectus excitant: ita puer forti animo, objurgatus, non flebit, sed irascetur; aliis flebit. Si dicatur infortunia multa et magna accidisse, tristabimur; si quem malum in causa fuisse addatur, irascemur. Transitus a passione in passionem per vicinas; saepe tamen a contrariis validior transitus, ut si in convivio hilari tristis casus repente nuntietur.

20 Ut imaginatio utitur figuris ad corpora concipienda; ita intellectus utitur quibusdam corporibus sensibilibus ad spiritualia figuranda, ut vento, lumine: unde altius philosophantes mentem cognitione, possumus in sublime tollere. Mirum videri possit quare

9 in quo carmen 7 cujus initium *E ändert Hrsg. Hrsg. nach DO* 20 Cognitione, [mentem] possumus *E ändert Hrsg. nach DO*

8 Anno ... mirabilis: Vgl. das Zitat einer Randbemerkung von Descartes bei BAILLET, Bd 1, S. 51 (*DO X*, S. 179): „XI. Novembris 1620. caepi intelligere fundamentum Inventi mirabilis“; vgl. auch die Bemerkung von Leibniz in den *Notata quaedam G. G. L. circa vitam et doctrinam Cartesii* (VI, 4 N. 376 S. 2057 f.). Zur Problematik der Datumsangabe sowie hinsichtlich der Frage, welche Erfindung gemeint sein könnte, vgl. zusammenfassend GOUHIER, *Les premières pensées*, S. 76–78. 10 *Quod ... A u s o n.:* D. M. AUSONIUS, *Eclogarum liber*, II, 1. Vgl. auch BAILLET, Bd 1, S. 80–86 (*DO X*, S. 180–188) sowie G. W. LEIBNIZ, *Notata quaedam G. G. L. circa vitam et doctrinam Cartesii* (VI, 4 N. 376 S. 2057). — Die Autorenangabe wurde möglicherweise erst von Leibniz oder in *E* eingefügt. 20–103,4 Mirum ... eluent: Vgl. die Paraphrase bei BAILLET, Bd 1, S. 84 (*DO X*, S. 184): „Car il ne croioit pas qu'on dût s'étonner si fort de voir que les Poëtes, même ceux qui ne font que niaiser, fussent pleins de sentences plus graves, plus sensées, et mieux exprimées que celles qui se trouvent dans les écrits des Philosophes.“

graves sententiae in scriptis poetarum magis quam philosophorum. Ratio est quod poetae per enthusiasmum et vim imaginationis scripsere: sunt in nobis semina scientiae, ut in silice, quae per rationem a philosophis educuntur, per imaginationem a poetis excutiuntur magisque eluent.

Dicta sapientum ad paucissimas quasdam regulas generales possunt reduci. 5

Ante finem novembris Lauretum petam, idque pedes e Venetiis, si commode et moris id sit; sin minus saltem quam devotissime ab ullo fieri consuevit.

Omnino autem ante Pascha absolvam tractatum meum, et si librariorum mihi sit copia dignusque videatur, emittam ut hodie promisi, 1620, 23 Febr.

Una est in rebus activa vis, amor, charitas, harmonia. 10

Sensibilia apta concipiendis olympicis: ventus spiritum significat, motus cum tempore vitam, lumen cognitionem, calor amorem, activitas instantanea creationem. Omnis forma corporea agit per harmoniam. Plura humida quam sicca, et frigida quam calida, quia alioqui activa nimis cito victoriam reportassent, et mundus non diu durasset.

Deum separasse lucem a tenebris, Genesi est separasse bonos angelos a malis, quia non potest separari privatio ab habitu: quare non potest litteraliter intelligi. Intelligentia pura est Deus. 15

Tria mirabilia fecit Dominus: res ex nihilo, liberum arbitrium et Hominem Deum.

Cognitio hominis de rebus naturalibus, tantum per similitudinem eorum quae sub sensum cadunt: et quidem eum verius philosophatum arbitramur, qui res quaesitas felicius assimilare poterit sensu cognitis. 20


Ex animalium quibusdam actionibus valde perfectis suspicamur ea liberum arbitrium non habere.

8 librorum *E ändert Hrsg. nach DO* 9 23 septembbris *E ändert Hrsg. nach BAILLET*
13 Plura frigida quam sicca, et humida quam calida *E ändert Hrsg. nach DO*

6 Lauretum: Zum Plan einer Wallfahrt nach Loreto vgl. BAILLET, Bd 1, S. 120 (*DO X*, S. 188).
8 f. Omnino ... 23 Febr.: Vgl. BAILLET, Bd 1, S. 86 (*DO X*, S. 187 f.)

Contigit mihi ante paucos dies familiaritate uti ingeniosissimi viri, qui tales mihi quaestionem proposuit: *Lapis, aiebat, descendit ab A ad B una hora: attrahitur autem a terra perpetuo eadem vi, nec quid deperdit ab illa celeritate quae illi impressa est priori attractione, quod enim in vacuo moveretur semper moveri existimabat: Quaeritur quo tempore tale spatium percurrat.*

Solvi quaestionem:



[Fig. 1]

In triangulo isoscelo rectangulo, *ABC*: Spatium motum reprezentat: Inaequalitas spatii a puncto *A* ad basin *BC* motus inaequalitatem: Igitur *AD* percurrit tempore quod *ADE* reprezentat; *DB* vero tempore quod *DECB* reprezentat; ubi est notandum minus spatium tardiorum motum reprezentare. Est autem *AED* tertia pars *DECB*:

10 f. Dazu, laut *E* von Leibniz angemerkt: si *AD* dimidia ipsius *AB*


8 In triangulo isocelo *E* ändert Hrsg. nach *DO* 8 motum erg. Hrsg. nach *DO* 10 DB.
vero semper *E* ändert Hrsg. nach *DO* 10 DEBC *E* ändert Hrsg. 11 DEBC *E* ändert Hrsg.
7,12 ipsius DB *E* ändert Hrsg.

1 ingeniosissimi viri: I. Beeckman. 2 proposuit: Vgl. zur Fragestellung *DO X*, S. 58–61 u. 75 bis 78 (*JB I*, S. 260–263 u. *JB IV*, S. 49–51). 8 Spatium motum: Vgl. dagegen *DOC I*, S. 198 sowie die Anm. 6, S. 580 f., wo die alternativen Konjekturen *Spatium tempus reprezentat* bzw. *area spatium reprezentat* diskutiert werden.

Ergo triplo tardius percurret AD quam DB . Aliter autem proponi potest haec quaestio, ita ut semper vis attractiva terrae aequalis sit illi quae primo momentos fuit: nova producitur, priori remanente. Tunc quaestio solvetur in pyramide.

Ut autem hujus scientiae fundamenta jaciam, motus ubique aequalis linea repraesentabitur vel superficie rectangula vel parallelogramma vel parallelipipedo, quod augetur ab una causa triangulo, a duabus pyramide ut supra, a tribus, aliis figuris. 5


Ex his infinitae quaestiones solventur. Verbi gratia, lapis in aere descendit *viresque acquirit eundo*; quandonam incipiet aequali celeritate moveri? Quod solvetur.



[Fig. 2]

Haec linea repraesentet gravitatem lapidis in primo instanti: curvatura linearum AEG et CFH inaequalitates motus: a puncto enim E, F aequaliter moveri incipiet, quia AEG non est curva nisi ab A ad E ; ab E ad G est recta. 10


1–3 Dazu, laut E von Leibniz angemerkt: obscure



11 CFA E ändert Hrsg. nach DO 11 a puncto enim BF aequaliter E ändert Hrsg. nach DO


7f. *viresque ... eundo*: P. VERGILIUS Maro, *Aeneis*, 4, 175. 8 quandonam ... moveri?: Vgl. JB I, S. 150, 174, 263–268.

Item si fax accensa in aere descendat ut etiam ignis magna levitas de gravitate ali-
quid tollat, cum levitatis quantitas sit nota. Item etiam gravitatis totius facis et aeris
impedimentum, si quaeratur quo instanti celerrime descendat et quo instanti non descen-
dat, ubi etiam notum esse oportet quid de face singulis momentis comburatur, aliaeque
5 innumerae quaestiones sunt ex geometrica pariter et mathematica progressionē.



[Fig. 3]


Ad talia pertinet quaestio de reditu redditum, g. v., mutuo accepi AB , post tempus AC , debeo CD : post tempus AE , debebam tantum EF , si BFD ducta sit linea propor-
tionum. Linea proportionum cum quadratrix conjugenda: oritur enim [quadratrix] ex
10 duobus motibus sibi non subordinatis, circulari et recto.



[Fig. 4]

Petiti a me Isaacus Middelburgensis an funis acb affixus clavis a , b , sectionis conicae
partem describat, quod non licet per otium nunc disquirere.


9 f. Dazu, laut E von Leibniz angemerkt: id est ex numero non analyticarum



6 Fig. 3: Die Linie BFD gibt den Sachverhalt (es handelt sich um eine Exponentialkurve) nur qualitativ wieder; vgl. die Rekonstruktion bei BOS, *Redefining Geometrical Exactness*, S. 245–248.


7–9 Ad ... proportionum: Vgl. DO X, S. 78 (JB 1, S. 51). 9 [quadratrix]: Eckige Klammern in E .
12 f. Petiti ... describat: Vgl. JB I, S. 43–45 u. 354–359.

Idem suspicatur nervos in testudine eo celerius moveri quo acutiores sunt, ita ut duos motus edat octava acutior dum unum gravior; item quinta acutior $1\frac{1}{2}$, etc.



[Fig. 5]

Idem advertit quare in motu projectorum quae e manu exeunt, per vim circularem statim ad motum rectum deflectant, quod scilicet pars *aa* majorem describat circulum quam *bb*, ideoque celerius movetur: unde fit ut, dum e manu exit, partem *b* praecedat et eam post se trahat. Unde sequitur aliquid projici posse circulariter hoc modo:



[Fig. 6]

A punto *e* pendeat pondus *a* agiteturque libere per circulum *abcd*: quia omnes partes ponderis aequaliter moventur, ideo si funis *ea* frangatur, perget moveri circulariter; id licebit experiri si in aquam decidat.

1f. Idem suspicatur ... etc.: Vgl. *DO X*, S. 52–54 (*JB I*, S. 244 u. 246 f.). 4–11 Idem advertit ... decidat: Vgl. *JB I*, S. 167, 253–257.

Idem me monet aquam congelatam plus loci occupare quam solutam; idem expertus est glaciem in medio vasis rariorem esse quam in extremitatibus: Quod fit, inquit, quia spiritus ignei qui locum occupant, initio a frigore ad medium vasis detrahuntur, unde tandem cum exeunt etiam frigore impellente, locum in medio vacuum relinquunt. Imo 5 etiam glaciem sublevant, cum exeunt, unde fit ut majorem locum occupet glacies quam aqua.

Idem quoque dixit acus in his regionibus fieri tam acutas ut monetam argenteam perforent et tam tenues, ut aquae supernatent: Quod fieri posse existimo; parvae enim res ejusdem materiae non tam facile aquam dividunt quam magnae, quod sola superficies 10 aquam premit, quae major est proportione in exiguo corpore quam in magno.

In s t r u m e n t d e m u s i q u e f a i t a v e c u n e p r e c i s i o n m a t h e -

1–6 Idem . . . aqua: Vgl. *JB* I, S. 21 f., 60 f., 155, 215, 281. 7–10 Idem . . . magno: Vgl. *JB* I, S. 233 f. 11–109,1 In s t r u m e n t . . . m a t h e m a t i q u e: Ein weiteres von ihm entworfenes „perfektes“ Instrument stellt Descartes in einem Brief an C. Huygens vor, der wohl auf das Jahr 1646 datiert werden kann (vgl. R. DESCARTES, *Lettres*, Bd 3, 1667, S. 587 f. = *DO* IV S. 678–683). Das beschriebene Spinett weist in einer Oktave insgesamt 19 anstelle der auch zu dieser Zeit üblichen 12 Tasten auf.

m a t i q u e. — Pour toucher une mandoline exactement selon mes regles de musique,

1 mandoline: *Mandoline* ist für die Entstehungszeit des Texts nicht als Bezeichnung eines Musik-instruments belegt. Als ältester Beleg für das Auftreten der ähnlich lautenden italienischen Wortform *mandolino* gilt eine Notiz auf dem Rechnungsbeleg Bibl. Vat. Arch.Barb.Gius.2016, die in F. HAMMOND, *Girolamo Frescobaldi and a Decade of Music in Casa Barberini: 1634–1643*, in: F. LIPPmann (Hrsg.): *Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte XII*, Analecta Musicologica 19, 1979, S. 105 Fn. 44 wiedergegeben ist. Ende des 16. Jh. und zu Beginn des 17. Jh. war vornehmlich in Frankreich ein üblicherweise mit Bünden versehenes Instrument mit vier Saiten verbreitet, das heute basierend auf seiner französischen Bezeichnung zumeist als Mandore oder den italienischen Namensvarianten folgend als Mandora oder Mandola bezeichnet wird und einen Vorläufer der heutigen Mandoline darstellt. Charakteristisch für die Mandore ist eine Quint-Quart-Quint-Stimmung, wobei auch Variationen des Grundtons, der Saitenzahl oder des Abstands der höchsten Saite belegt sind (vgl. beispielsweise M. MERSENNE, *Harmonie universelle, Livre second des instruments*, 1636, S. 93 und M. PRAETORIUS, *Syntagma musicum II*, 1619, S. 28 u. S. 53). Durch Praetorius' *Syntagma musicum II* sind die deutschsprachigen Formen *Mandürichen* (a. a. O. Inhaltsverzeichnis, S. 28 u. S. 53), *Manduriniche* (a. a. O. S. 53) sowie *Mandörigen* (a. a. O. Tafel XVI) als Bezeichnungen für ein in Frankreich verbreitetes Instrument, das heute als Mandore identifiziert wird, für das Jahr 1619 belegt. Als weitere Namen nennt Praetorius *Pandurina* (a. a. O. Inhaltsverzeichnis u. S. 53), *Mandoér* (a. a. O. S. 53) und *Bandürichen* (a. a. O. S. 10 u. S. 53). Alessandro Piccinini berichtet in seiner auf Italienisch verfassten *Intavolatura di liuto* von 1623, dass in Frankreich ein Instrument namens *Mandolla* genutzt wird (A. PICCININI, *Intavolatura di liuto*, 1623, S. 7). Die wenigen angedeuteten Eigenschaften treffen auf eine Mandore zu. Die im vorliegenden Text auftretende Form *mandoline* kann als französische Diminutivform von *mandola* oder *mandole* verstanden werden.

1 exactement ... musique: Hauptquelle zu Descartes' Musiktheorie ist seine Schrift *Musicae compendium*, die, obwohl bereits 1618 verfasst, erst in seinem Todesjahr gedruckt wurde (R. DESCARTES, *Musicae compendium*, 1650 (DO X S. 89–141)). Einzelne Hinweise finden sich zudem in seinem Briefwechsel, insbesondere mit I. Beeckman, C. Huygens und M. Mersenne. — Descartes vertritt ein modales System, bei dem ein von ihm festgelegtes Tonsystem in insgesamt 12 verschiedenen *modi* (heute: Kirchentonarten) genutzt wird (a. a. O. S. 139f.). Bewegt sich eine in einem *modus* gesetzte Melodie aus dem Tonumfang einer *vox* (ein Hexachord, dem in der Solmisation die Tonsilben *ut, re, mi, fa, sol* und *la* zugewiesen sind) hinaus, findet ein Wechsel in die eine Quint höher bzw. tiefer angesetzte *vox* statt, wobei den Tonstufen die Silben der neuen *vox* zugeordnet werden. Descartes' Festsetzung der (relativen) Höhen der Töne des Tonsystems gründet auf der Überzeugung, dass Konsonanz und Wohlklang erreicht wird, wenn Oktaven, Quinten, Quarten sowie große und kleine Terzen einfache Proportionen der ihnen entsprechenden schwingenden Saitenlängen aufweisen. Da die gewählten Bedingungen keine Festsetzung der Tonhöhen zulassen, bei der Erweiterungen des Tonraums durch Wechsel in benachbarte *voces* und durch Oktavierungen durchgängig gleiche Ergebnisse liefern, legt Descartes für das *re* der tieferen und das *sol* der jeweils höheren *vox* leicht voneinander abweichende Positionen fest, sodass die Verhältnisse der den Tonhöhen der *voces* entsprechenden Saitenlängen identisch bleiben. Im System von Descartes sind die Wechsel auf die *vox mollis* (auf *F*), *vox naturalis* (auf *C*) und die *vox dura* (auf *G*) beschränkt. Entsprechend gibt es für *D* und *G* je zwei Ansetzungen der Tonhöhen (a. a. O. S. 116–122, insb. S. 122). — In der Praxis werden Bünde von Saiteninstrumenten zur Zeit Descartes' üblicherweise gemäß einer gleichstufigen Stimmung positioniert. Anders als Descartes' Vorschlag einer reinen Stimmung gilt das den Saiteninstrumenten zugrundeliegende Tonsystem aus Sicht der zeitgenössischen Musiktheorie nicht als exakt und mathematisch präzise.

il faut diviser l'espace depuis le sillet jusqu'au chevalet en 192 parties égales pour le *a*; en ôter 12 et mettre le *b*, puis 18 pour le *c*, 2 pour le *d*, 16 pour le *e*, et 9 pour le *f*, puis accorder les cordes alternativement à la quinte et à la quarte comme on fait ordinairement: Le *c* et le *d* serviront pour le *ré* mobile, et toute musique se pourra 5 jouer sur cette mandoline pourvu qu'il n'y ait point de dièzes irreguliers aux cordes non destinées aux nuances.

6 destinées aux nuances *E* ändert Hrsg. nach DO


1–3 il . . . le *f*: Die Längen der Abstände der resultierenden Teilungspunkte zum Steg betragen 180, 162, 160, 144 und 135 Einheiten. Zusammen mit dem Wert von 192 Einheiten für die Länge zwischen Sattel und Steg entsprechen sie somit den die Tonhöhen repräsentierenden Werten für *C*, *D*, *E* und *F* in Descartes' *Compendium*, wobei für *D* beide zur Erreichung einer reinen Stimmung festgesetzten Werte aufgeführt sind (*a. a. O.* S. 116–127, insb. S. 120 u. S. 125). — Die hier genutzte Bezeichnung des Sattels und der benachbarten Teilungspunkte des Griffbretts mit den ersten Kleinbuchstaben des Alphabets entspricht der Kennzeichnung der zu greifenden Töne in der zeitgenössischen im französischen Sprachraum verwendeten Tabulaturnotation (vgl. beispielsweise M. MERSENNE, *Harmonie universelle, Livre second des instruments*, 1636, S. 93–95, insb. Figur S. 93). 3 f. accorder . . . ordinairement: Versteht man die für die *mandoline* angegebene Länge zwischen Sattel und Steg von 192 Einheiten wie im *Compendium* als $b\frac{1}{2}$, ergeben sich aufgrund der Teilungspunkte bei einer eine Quint tiefer oder eine Quart höher und somit auf *E* gestimmten Saite die in Descartes' Ansatz geforderten Proportionen der Tonhöhen von *E*, *F*, *G*, *A* und *B* (*DO X* S. 116–127). Insbesondere überträgt sich die Dopplung des Tons *D* der $b\frac{1}{2}$ -Saite wie in Descartes' Musiktheorie vorgesehen auf *G*, den dritten Ton der *E*-Saite. Die auf der $b\frac{1}{2}$ - und *E*-Saite auftretenden Töne entsprechen genau denjenigen des Tonsystems des *Compendiums*. 4 ré mobile: Descartes bezeichnet im *Compendium* *D* und *G*, auf die er sich hier über die Bezeichnungen *c* und *d* für die Teilungspunkte des Griffbretts bezieht, als beweglich bzw. als Töne, die bewegt werden (*a. a. O.* S. 117 u. S. 119). *D* und *G* stellen in der *vox mollis* bzw. *vox naturalis* jeweils die Tonstufe *re* dar. 5 f. pourvu . . . nuances: Als *muance* (lat. *mutatio*) werden die in S. 000 Z. 000–000 beschriebenen Wechsel zwischen benachbarten *voces* bezeichnet. Da weitere um einen Halbton tiefer bzw. höher gesetzte Töne nicht Teil des Tonsystems sind, treten bei Musik, die Descartes' Regeln folgt, die *dieses b* und \sharp , mit denen diese Alterationen in der zeitgenössischen Notenschrift üblicherweise gekennzeichnet werden, lediglich beim *B* (= *fa* der *vox mollis*) und gegebenenfalls beim $b\frac{1}{2}$ (= *mi* der *vox dura*) auf der entsprechenden Linie (lat. *chorda*) der Notenzeile auf (*a. a. O.* S. 124–126).

Si, partant de Bucolia, on veut aller droit en Chemmis ou quelque autre port de l’Egypte que ce soit, il faut remarquer exactement, avant que de partir, en quel endroit Pythius et Pythias sont opposés l’un à l’autre à l’embouchure du Nil; puis apres, en quelque lieu que ce soit, si l’on veut trouver son chemin, il faut regarder seulement où est Pythias et de quelles servantes de Psyché elle est accompagnée, car par ce moyen, connaissant combien elle est éloignée du lieu où elle estoit à Bucolia, on trouve son chemin.

1–7 *Dazu, laut E von Leibniz angemerkt:* Bucolia lieu du départ, Egypte globe de la terre, embouchure du Nil lieu de départ, Pythius et Pythias ☉ et ☽, les servantes de Psyché les fixes

3 *Zu l’embouchure du Nil, laut E von Leibniz angemerkt:* (+ c’est-à-dire au départ +)

1–7 Si … chemin: Descartes hat Beeckman in seinem Brief vom 26. März 1619 mitgeteilt, dass er eine Methode zur Längengradbestimmung gefunden habe (*DO X*, S. 154–160, hier S. 159 f. u. *JB IV*, S. 58 bis 61, hier S. 60). Die von Descartes hier verwendete Codierung seiner Monddistanzmethode beruht auf Motiven aus zwei antiken Romanen: Bucolia bezeichnet eine Gegend im Nildelta, Chemmis eine Stadt in Oberägypten. Beide Orte liegen auf der Reiseroute der Protagonisten Theagenes und Charikleia in den *Aithiopiká* des HELIODOROS von Emesa (vgl. I,5 u. V,9). Die beiden Protagonisten benutzen zeitweise die Tarnnamen Pythius und Pythias — Beinamen von Apollo und Artemis, die auch für Sonne und Mond stehen können —, um im Falle ihrer Trennung auf der Reise den jeweiligen Codenamen an markanten Stellen mit Tag und Stunde zu notieren (vgl. III,11 u. V,4–5). Zur Verbreitung dieses Romans innerhalb des gelehrten Diskurses des 16. und 17. Jahrhunderts vgl. z. B. Chr. RIVOLETTI, St. SEEGER (Hrsg.), *Heliodorus redivivus. Vernetzung und interkultureller Kontext in der europäischen Aithiopika-Rezeption*, Stuttgart 2018. Das zweite literarische Motiv, das der Codierung dient, die „servantes de Psyché“, ist aus APULEIUS, *Metamorphoses*, V,3, entnommen. Leibniz hat die Verschlüsselung dahingehend aufgelöst, dass er die Dienerinnen der Psyche mit den Fixsternen identifiziert, was mit den Angaben von Descartes im oben genannten Brief (*DO X*, S. 159) übereinstimmt. Offenbar wurde dieses literarische Motiv mit der platonischen Vorstellung von den Fixsternen als Sitz der nicht mit einem Körper verbundenen Seelen verschmolzen. Descartes’ Codierung ist in das Umfeld der Rezeption der neuplatonischen Diskussion um die Seelenwanderung und den Seelenwagen einzurordnen, vgl. PLATON, *Timaios*, 41d–e.



[Fig. 7]

Petit e Stevino Isaacus Middelburgensis quomodo aqua gravitet in fundo vasis *b* aeque ac in fundo vasis *c* et *a*; item, totum vas *c* non magis gravitet quam *a* cuius pondus medium affixum est et immobile. Respondi aquam aequaliter pellere omnia circum
 5 quaeque corpora, quibus sublati aequa descendit si aliqua pars fundi aperiatur, atque fiet in vase *c*; ergo aequa premit fundum. Objicitur, si pars inferior vasis *b* et *c* aperiatur simul, aquam in *c* magis descensuram quam in *b*, quoniam est naturalis modus celeritatis in descensu aquae qui deberet excedi ab aqua existente in tubo vasis *b* ut repleret locum relictum ab inferiore aqua. Ubi respondeo inde sequi in motu semper minus celeriter de-
 10 scendere aquam vasis *b* quam *c*; atqui gravitatio non e motu sumitur, sed ab inclinatione ad descensum in ultimo instanti ante motum, ubi nulla est ratio celeritatis.

Q u a e s t i o i n g n o m o n i c a . — Sit sub linea aequinoctiali horizontali horologium faciendum cujus linea aequinoctialis est data, ac praeterea tria puncta ad quae umbrae extremitas debeat pertingere, dum sol est in tropico Capricorni, quomodo cum
 15 que data sint, modo ne in rectam lineam incident, centrum solis horologii reperire est et

12 Zu Beginn des Abschnitts, laut E von Leibniz angemerkt: 5 juin 1676.

2–11 Petit … celeritatis: Zum hydrostatischen Paradox vgl. S. STEVIN, *De Beghinselen des Waterwichts*, 1586, S. 20–22 u. 56 f.; vgl. die Beeckman im Juni 1619 mitgeteilte Untersuchung; R. DESCARTES, *Aquae comprimentis in vase ratio redditu* (*DO* X, S. 67–74; *JB* IV, S. 52–55). 12–113,2 Q u a e s t i o ... incident: Zum dargestellten Problem vgl. MARONNE, *Une autre géometrie*, S. 313–341; zum Herausgebereingriff in den Text vgl. S. 317. 14 dum … Capricorni: zur Wintersonnenwende.

longitudinem styli. Hoc reducitur ad circulum tres alios inaequales tangentem, quorum centra in rectam lineam non incident.

Nulla figura est in tota extensione in qua et circa quam circulus duci possit, quomo-
docunque figura fiat praeter triangularem, quae Divinitatis hieroglyphicon.

In omni quadrato quadrati semper ultima nota est 1, 6, 5.

5

In omni quaestione debet dari aliquod medium inter duo extrema, per quod con-
jungantur vel explicite vel implicite, ut circulus et parabola, ope coni. Item per duos
motus compossibilis describentur. Ut motus ad [spiralem] dicendus non est cum circulari
compossibilis.

Si funis mathematicus admittatur, is erit communis mensura recti et obliqui. Verum
dicimus admitti hanc lineam posse, sed a mechanicis tantum: ea scilicet ratione qua uti
possumus statera ad aequandam cum pondere, vel nervo ad eandem comparandam cum
sono; item spatio in facie horologii contento ad metiendum tempus, et similibus in quibus
duo genera conferuntur.

10

Perlegens Lamberti Schenkelii lucrosas nugas (lib. *De arte memoriae*) cogitavi facile
me omnia quae detexi imaginatione complecti: quod fit per reductionem rerum ad causas,
quae omnes cum ad unam tandem reducantur, patet nulla opus esse memoria ad scientias
omnes. Qui enim intelliget causas, elapsa omnino phantasmata causae impressione rursus

15

2 rectam lineam incident *E ändert Hrsg. nach DOC*

5 In ... 1, 6, 5: Möglich wäre auch die 0 als Endziffer, aber in diesem Fall muss bereits die Basis der Potenz die 0 als Endziffer besitzen; vgl. auch COSTABEL, *L'initiation mathématique*, S. 641 f.

8 [spiralem]: eckige Klammern in *E*. 15–114,10 Perlegens ... fictitiae: Vgl. die Überlegungen zur *ars memoriae* in *Cartesius* (CARRAUD, *Cartesius*, S. 3; DO XI, S.649); L. SCHENCKEL, *De memoria libri duo*, [...] *In secundo est, ars memoriae* [...], 1593; DERS., *Gazophylacium Artis Memoriae.*, 1609; DERS., *Brevis tractatus de utilitatibus et effectibus admirabilibus artis memoriae*, 1614. — Die Gedächtniskunst Schenckels wurde mit dessen Einverständnis auch von Faulhaber unterrichtet; vgl. J. FAULHABER, *Wahrhaftige und Gründliche Solution oder Aufflösung einer hochwichtigen Frag*, 1618, S.26: „Ich underschribner / Bekenne in Crafft diß gegenwertigen / von Herrn Johann Faulhabern / Mathematico und Modisten / Burgern in Ulm / das er die Kunst der gedächtnuß etc. Auch neben andern allhie zu Ulm meinen Lectionen, so von mir Lateinisch gehalten worden / beygewohnt / unnd ob er wol in Lateinischer Sprach nit vil versteht / jedoch wegen der Scharpffsinigkeit seines verstandts / hat er [...] den Innhalt der praecepten, so Ich fürgetragen / erlangt / derohalben [...] ihme [...] gebühre / was orths er sey / unverhindert zu reden [...] Lambertus A. etc. Schenkelius Dusilmius.“ — Vgl. auch J. FAULHABER, *Zwey und Vierzig Secreta*, 1622, § XXX: „Artem Memoriae Teutsch“.

facile in cerebro formabit: quae vera est ars memoriae illius nebulonis arti plane contraria, non quod illa effectu careat, sed quod chartam melioribus occupandam totam requirat et in ordine non recto consistat: qui ordo in eo est ut imagines ab invicem dependentes efformentur. Hoc ille omittit, nescio an consulto, quod est clavis totius mysterii. Ipse
 5 excogitavi alium modum, si ex imaginibus rerum non inconnexarum addiscantur novae imagines omnibus communes, vel saltem si ex omnibus simul una fiat una imago, nec solum habeatur respectus ad proximam, sed etiam ad alias, ut quinta respiciat 1° per hastam humi projectam, medium vero per scalam ex qua descendens, et secunda per telum quod ad illam projiciat, et tertia simili aliqua ratione in rationem significationis
 10 vel verae vel fictitiae.

Aiunt pisces capi facilius cum tedula in rete demissa. Quidni candela in vitro conclusa?

Si esset corpus quod pro aetate ♂ mutaret pondus, daret motum perpetuum. Fiat talis rota ♀ ubi nigrum sit alterius formae ♂ non subditae et tota rota, ita in axe librata
 15 ut utraque forma in naturali statu aequalis sit ponderis, haud dubie perpetuo movebitur juxta motum ♂.

Ponatur statua aliquid ferri habens in capite et pedibus, ponatur super funem vel virgam ferream exiguum, sed vi magnetica tinctam; item supra caput ejus alia sit, vi etiam magnetica tincta, quae altior sit et quibusdam in locis majori vi distincta. Statua
 20 autem habeat in manibus baculum oblongum ad modum funambulis, qui sit excavatus et in eo nervo contentus, cui interea principium motus automati intus inclusi, quo levissime tacto statua omnis pedem promoveat, quoties tangitur et in locis majore vi magnetis in summo tactis sponte scilicet cum pulsabuntur instrumenta.

14 subditae ex tota E ändert Hrsg.

11 f. Aiunt ... conclusa?: Vgl. G. B. PORTA, *Magiae naturalis libri XX*, 1589, lib. XV, cap. 5, S. 241 f.; vgl. SHEA, *The Magic of Numbers and Motions*, S. 107 f., Anm. 50. 13 Si ... pondus: Vgl. G. B. PORTA, *Magiae naturalis libri XX*, 1589, lib. I, cap. 9, S. 10. 17–23 Ponatur ... instrumenta: Vgl. POISSON, *Commentaire*, S. 156; vgl. auch G. B. PORTA, *Magiae naturalis libri XX*, 1589, lib. VII, cap. 27, S. 139.


Columba Architae molas vento versatiles inter alas habebit, ut motum rectum deflectat.

Si tria trianguli latera ducuntur in se invicem et productum per areae quadruplum dividatur, habebitur semidiameter circuli, quarto triangulo circumscripti. Sunt latera a , b , c , area e , semidiameter erit $\frac{abc}{4e}$; ut fiant latera 13, 14, 15, et area 84; semidiameter est $\frac{65}{8}$.
5

Describi potest sectio conica tali circino:


1 Columba arditea E ändert Hrsg. nach DO

1 f. Columba ... deflectat: Vgl. die entsprechende Erwähnung bei POISSON, *Commentaire*, S. 156. — Vgl. ebenso *Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesu, In octo libros Physicorum Aristotelis Stagirita*, lib. II, cap. I, quaestio VI (in der Ausgabe Lyon, 1594, S. 217 f.); G. B. PORTA, *Magiae naturalis libri XX*, 1589, lib. XX, cap. 10, S. 302 f. — Vgl. auch die Leibniz'sche Handschrift *Columba Architae resuscitata* vom Juni 1678 (LH 38, Bl. 91). 3–6 Si ... est $\frac{65}{8}$: Das Dreieck mit den Seitenlängen 13, 14, 15 ist in der geometrischen Literatur der Zeit verbreitet: Zur Berechnung der Dreiecksfläche aus den gegebenen Seiten vgl. z. B. den Hinweis von COSTABEL, *L'initiation mathématique*, S. 642, auf Chr. CLAVIUS, *Geometria practica*, 1604, S. 175 f.; bei L. VAN CEULEN, *Fundamenta arithmeticæ et geometricæ*, 1615, S. 122 f. u. 158 (Berechnung des Umkreisdurchmessers). — Ein Dreieck mit den Seitenlängen 13, 14, 15 wird z. B. auch von N. TARTAGLIA, *General trattato*, 1560, Teil 4, Buch 2, Bl. 34 v° bis 36 r°, im Beispiel einer Berechnung des Tetraedervolumens verwendet (vgl. SCHNEIDER, *Johannes Faulhaber*, S. 126); ebenso bei N. MAROLOIS, *Opera mathematica*, 1614, Teil 4, § 53. 4 quarto: Das Wort *quarto* ergibt an dieser Stelle keinen Sinn (vgl. *DOC* I, S. 587, Anm. 37). Vielleicht geht es auf eine tentative Lesung einer vermuteten Kontraktion wie 4°, q° oder qu° zurück; vgl. z. B. die Kontraktionen von *ipsi* oder *quaesiti* bei CAPPELLI, *Dizionario*, S. 186 u. S. 305. 7–116,8 Describi ... distabit: MANDERS, *Descartes et Faulhaber*, S. 3 f., verweist auf das von Johann Remmeli am 9. Dezember 1620 abgelegte Zeugnis über den Besitz noch nicht öffentlich bekannter Proportionalzirkel bei Faulhaber: „Nemlich / vier neue ProportionalZirckel / mit welchen man zwischen zwey andere media Proportionalia, Geometrisch finden solle. Item / Wie jeder winckel auff einem Circkelriß in drey gleiche partes Geometrisch zu theilen. Deßgleichen wie alle Conische / Cylindrische Sectiones Geometrisch zu vollbringen / von welchen andere authores grosse Bücher geschriben.“ (J. REMMELIN, *Copiae Eines über die Inventiones, Secreta unnd Wissenschaften Herrn Johann Faulhabers / ertheilten Testimonii*, in: J. FAULHABER, *Appendix oder Anhang der Continuation deß Newen Mathematischen Kunstspiegels*, 1621, S. [4 f.]).




[Fig. 8a]

Sit AD perpendicularis superficies obliqua AB . Sit pes circini immobilis, volvatur BC supra planum obliquum, ita tamen ut CB possit brevior fieri, si imaginetur per C ascendere.




[Fig. 8b]


5 Sectio cylindri eodem pacto circino duci potest ita: sit $ACDE$ circinus, cujus pes immobilis est, linea DE descendet vel ascendet libere per punctum D prout a plano distabit.




1+5 Fig. 8a u. 8b 2 obliqua CD E ändert Hrsg. nach DO
 3–6 fieri. Si imaginetur per B ascendere, sectio E ändert Hrsg. nach DO 6 sit AC, DE circinus, hujus pes E ändert Hrsg. nach DO




[Fig. 9]




2 Fig. 9: Wegen des Textbezugs auf die Figur in S. 118 Z. 2 wurde die Reihenfolge der Figuren 9 und 10 gegenüber E vertauscht. Die in E abgedruckte Figur unterscheidet sich in der Ausgestaltung deutlich von den anderen Skizzen zu den Gleichungszirkeln und stimmt nicht komplett mit dem zugehörigen Text überein. Es ist zu vermuten, dass Foucher de Careil sie, gestützt auf die Anmerkungen von Leibniz, nach dem Druck des Proportionalzirkels in der *Géometrie* von Descartes übernommen hat. Dem Text entsprechend kann die Figur folgendermaßen rekonstruiert werden:



Inveni aequationes inter talia: 1φ et $7^4 + 14$, et simile hoc. 1° Reduco ad $1^4 + 2$ aequ. φ vel $+1\varphi$, quem postea multiplicabo per 7 primi circini; deinde alium circinum habere oportet quorum duae partes sunt tales:



[Fig. 10a]




[Fig. 10b]

- 5 Prima habet lineam bc firmiter annexam ad angulos rectos lineae af , lineam autem de ad angulos quidem rectos, sed mobilem per lineam fb . Linea fb habet praeterea in

2 Zu primi circini, laut *E von Leibniz angemerkt*: Erat circinus qualis est mesolabi in *Geom. Cart.*, scilicet pars ex mesolabi duabus proportionalibus.

1 f. talia 15 et $7^4 + 14$ et simile hoc. 1° Reduco ad $12 + 2 + c$ vel $+1c$ quam postea *E ändert Hrsg.*



1–120,4 Inveni ... quaesitus: Descartes unterlaufen offenbar bei den algebraischen Lösungsversuchen in den Beispielen kubischer Gleichungen systematische Fehler. Die instrumentelle Lösung mit Kombinationen der ihm zur Verfügung stehenden Gleichungszirkel ist jedoch möglich. Zu den Gleichungszirkeln vgl. BOS, *Redefining Geometrical Exactness*, S. 237–245. **19,7** circinus: Vgl. J. REMMELIN (s. o. die Erl. zu S. 115 Z. 7) sowie R. DESCARTES, *Geometria*, 1659, DGS I S. 67–69.

puncto d stylum fixum quo lineam describat; in puncto f etiam unum sed mobilem quo aliam lineam describat hoc pacto. Secunda pars $dcegh$ constans lineis firme invicem annexis fluat supra lineam ap , ubi affixa est prima pars, in puncto a immobili; punctum c impellit lineam bc et ita efficiet ut tota secunda pars descendat, linea autem cd , trahit lineam de per spatium fb juxta varietatem intersectionum et tum stylus d lineam primi circini describet. Linea autem gh intersecabit etiam lineam de aliamque lineam curvam stylo e mobili describet quae ultima linea secabit ap in quo ae est cubus inveniendus si ab primae partis sit unitas, ce vero secundae numerus absolutus, qui in exemplo est binarius.

Fit praeterea aequatio inter talia, φ , \mathcal{Z} , \mathcal{V} , dummodo quot sint \mathcal{Z} tot \mathcal{V} , et hoc modo: 10
 1φ aequ. $6\mathcal{Z} - 6\mathcal{V} + 56$. 1° Reduco ad numerum radicum ternarium, habeboque $\frac{1}{2}\varphi$ aequ.
 $3\mathcal{Z} - 3\mathcal{V} + 28$. Deinde ex N tollo unitatem, ex residuo cubum formo cuius radici unitatem addo et quod cubice extra producitur ex illa radice est $\frac{1}{2}\varphi$ quod si multiplicetur per 2 producet cubum quaesitum.

Sed si non sunt tot \mathcal{Z} quot \mathcal{V} , reducemos ad fractiones, ita ut horum numeri superiores sint aequales hoc pacto: ut $36 + 3\mathcal{Z} - 6\mathcal{V}$ aequ. 1φ reducam ad $9 + \frac{3}{4}\mathcal{Z} - \frac{3}{2}\varphi$; quo facto 15


2 Nach hoc pacto, laut E (wohl Verweis auf Fig. 9): \odot

5 f. Zu lineam primi circini, laut E von Leibniz angemerkt: illam mesolabi seu produabus mediis de qua in *Geometria Cartesii*

1 describat in puncto etiam unam sed mobilem *E ändert Hrsg.* 2 describat f hoc pacto \odot . *E ändert Hrsg.* 4 tota prima pars ändert *Hrsg. nach DO* 7 stylo c mobili *E ändert Hrsg.*
 7 quo ad est *E ändert Hrsg. nach DO* 10–12 talia 5, 3, 4. Nummodo quot sint 3 tot 4 et hoc modo 15 + 63 + 64 + 56. 1° Reduco ad numerum radicum ternarium habeboque $1/2\mathcal{Z} + 24 + 28$. Deinde ex N tollo unitates *E ändert Hrsg. nach DO* 13 radice est $1/2\mathcal{Z}$ quod *E ändert Hrsg. nach DO*
 15 sunt tot 3 quot 4, reducemos *E ändert Hrsg. nach DO* 16 hoc pacto: ut $36 + 3\mathcal{Z} + 64 + 1g$ reducam ad $9 | \frac{3}{4}\mathcal{Z} - \frac{3}{2}4$ pro facto *E ändert Hrsg. nach DO*

7 stylo e mobili: Zum Herausgebereingriff in den Text vgl. Bos, *Redefining Geometrical Exactness*, S. 244, Anm. 26. 20,18 mesolabi: R. DESCARTES, *Geometria*, 1659, DGS I S. 67–69.

si ex N tollatur 1 et eadem hujus residui radici cubicae addatur et productum cubice multiplicetur, fiet $\frac{1}{4}\varphi$ aequalis 27, sive φ erit 108. Item sit 1φ aequ. $26 - 3z - 34$. Addo unitatem numero absoluto, deinde ex radice producti unitatem demo, et producitur ex radice cubus quae situs.



[Fig. 11]


5

1 tollatur 1 ex eadem E ändert Hrsg.
26 - 3z - 34. Addo E ändert Hrsg. nach DO

2 fiet $1/4g$ aequalis 27 sive c erit 216. Item sit $1g$ et

5 Fig. 11

E ändert Hrsg.



Alius circinus ad aequationes cubicas 1φ & $O\mathcal{Z}ON$. — Si inveniendus sit cubus aequalis ON dg et quadrato uni incognito, talis circinus fabricetur 5
dce fluit supra ap fluendo pellit bc in puncto c adigitque ut descendat simulque af cui affixa est bc ad angulos rectos describitque intersectione af et cd lineam circini mesolabi. Praeterea trahit secum lineam dm quae impacta est lineae af , ita tamen ut moveatur, trahit etiam dg quae est numerus absolutus et fluit supra af ; item dg trahit gm quod impactum est lineae ak ad angulos rectos, ita ut sine illa moveri non possit, adeoque retrocedit rursus \mathcal{Z} . Intersectio autem linearum gm et dm describit aliam lineam quae intersectat ap in puncto quaesito. Ab illo m ad a est φ inveniendus. Sit enim, verbi gratia, $d\gamma ON$ loco dg . Quia intersectio de et γe cadit in ap dico cubum ae esse aequalem quadrato ad et $ON d\gamma$. Nam triangulus γae est isoceles propter lineam ak quae impacta est ad angulos rectos lineae γe ex constructione. ab autem est unitas etiam ex constructione, ac vero radix cubi inventi. Ex his inveniri possunt aequationes inter 1φ et $O\mathcal{Z} - ON$ item $ON - O\mathcal{Z}$ ut ex praecedenti inveniri potest inter 1φ et $O^4 - ON$, item $ON - O^4$, sed viam aperuisse sufficiat. 10

15


10 Zu $d\gamma ON$, laut E von Leibniz angemerkt: id est absolutus

13 Zu radix cubi inventi laut E von Leibniz angemerkt: puto inveniri primum cubum quaesitum inde ejus radicem

1 cubicas $1c$ et $0z$ on E ändert Hrsg. nach DO 4 est vc ad E ändert Hrsg. nach DO
 6 trahit gmqd E ändert Hrsg.; nach gmqd laut E von Leibniz angemerkt: (+ non video q. in figura +)
 7 sine ulla E ändert Hrsg. nach DO 8 rursus z E ändert Hrsg. 9 quaesito ab illo in ada est C. Inveniendus sit E ändert Hrsg.; zum ersetzen Text, laut E von Leibniz angemerkt: obscure
 9f. gratia, dy ON loco dy quia intersecto de et ye cadit E ändert Hrsg. 10 cubum ac esse E ändert Hrsg. 12 lineae ge ex E ändert Hrsg. 13f. aequationes inter $1g$ et $0z - ON$ item $ON - 0z$ ut E ändert Hrsg. nach DO 14 potest inter $1g$ et $04 - ON$ item $ON - 04$, sed E ändert Hrsg. nach DO
22,18 ejus radium E ändert Hrsg. nach DO


4 lineam circini mesolabi: a. a. O. **22,20** non ... figura: Leibniz hat offenbar die Buchstaben qd , die wir als Kontraktion von *quod* interpretieren, für zwei Punktbezeichnungen gehalten, zu denen er den Punkt q in der Figur nicht finden konnte.

Circinus ad angulum in quotlibet partes dividendum.
Sit talis circinus




[Fig. 12a]

*ab/ae/ad/ac sunt aequales laminae divisae pariter in punctis $flki$, item fg aequalis
5 est af , etc. Unde fit ut tres anguli bae , ead et dac sint semper aequales, nec unus possit
augeri vel minui quin alii etiam mutentur.*




4 laminae divisis *E ändert Hrsg. nach DO; zu divisis laut E von Leibniz angemerkt: (+ an divisae? +)
4 punctis feki E ändert Hrsg.*

1 Circinus ... dividendum: Vgl. das Zeugnis von J. REMMELIN (s. o. die Erl. zu S. 115 Z. 7) sowie die Aufzeichnung *Sectio anguli per instrumentum* von Leibniz, dat. 28. März 1676, mit den zugehörigen Figuren von Tschirnhaus (VII, 1 N. 24 S. 182). — Zur Funktionsweise des Winkelteilungsinstruments vgl. Bos, *Redefining Geometrical Exactness*, S. 237–239.



[Fig. 12b]

Si igitur angulus $\beta\alpha\kappa$ dividendus, applico lineam ac supra $\alpha\kappa$, qua ibi manente immobili, elevo lineam ba in partem β quae secum trahit ae et ad , lineaque describetur a puncto g talis $\gamma\delta\epsilon$. Deinde sumatur $\eta\alpha$ aequalis af et ex punto η ducatur pars circuli $\theta\delta o$ ita ut $\eta\theta$ sit etiam aequalis fg , dico lineam $\alpha\delta$ dividere angulum in tres partes aequales; ita potest dividi angulus in plures, si circinus constet pluribus laminis. 5



2 angulus $\alpha x E ändert Hrsg.$ 2 supra $\alpha x E ändert Hrsg.$ 3 partem b $E ändert Hrsg.$ 3 trahit ac $E ändert Hrsg.$ 4 sumatur $n\alpha E ändert Hrsg.$ 4 puncto n ducatur $E ändert Hrsg.$ 5 ut $n\theta E ändert Hrsg.$ 5 lineam $a\delta E ändert Hrsg.$ 6 constet plurimis $E ändert Hrsg.$ nach DO

Si subtrahatur numeri triangularis quadratus ex quadrato sequentis triangularis, restat cubus ut 10. 15: tolle 100 ex 225 restat 125, ex 5.

Ex progressionе 1 | 2 || 4 | 8 || 16 | 32 || habentur numeri perfecti 6. 28. 496.


Vidi commodum instrumentum ad picturas omnes transferendas: constat in pede 5 cum circino bicipiti. Aliud quoque ad omnia horologia depingenda, quod per me possum invenire: Tertium ad angulos solidos metiendos; quartum argenteum ad plana et picturas metiendas, pulcherrimum aliud ad picturas transferendas, aliud affixum viatoris

2 restat 120, ex. E ändert Hrsg. 7–125,1 affixum oratoris tibiae E ändert Hrsg.

1 f. Si ... ex 5: Die Aussage ergibt sich aus der Umkehrung des bereits bekannten Theorems, dass die Summen der Kubikzahlen gleich den Quadraten der Triangularzahlen sind; vgl. die Tafel mit den Spalten *G* der Kubikzahlen und *H* der Quadrate der Triangularzahlen auf dem Titelblatt von J. FAULHABER, *Schrifftlich Memorial*, 1622, sowie die eingehende Analyse bei SCHNEIDER, *Johannes Faulhaber*, S. 131–135. 3 Ex ... 496: Vgl. den Hinweis bei COSTABEL, *L'initiation mathématique*, S. 640 f., auf EUKLEIDES, *Elementa*, IX, 36, sowie den zugehörigen Kommentar in Chr. CLAVIUS, *Opera mathematica*, Bd I, 1611, S. 378. 4–125,1 Vidi ... dirigenda: Beim ersten und fünften Instrument der Liste handelte es sich wohl um einen Pantographen (vgl. B. BRAMER, *Bericht und Gebrauch eines Proportional Lineals*, 1617; D. SCHWENTER: *Geometriae practicae novae tractatus* I, 1618, S. 255–257; Chr. SCHEINER, *Pantographice, seu ars delineandi*, 1631); beim zweiten um ein Instrument zur Konstruktion von Sonnenuhren (vgl. z. B. Chr. CLAVIUS, *Fabrica et usus instrumenti ad horologiorum descriptionem peropportuni*, 1586; B. LEEMANN, *Sonnen Uhren zuo ryssen*, 1587; DERS., *Instrumentum instrumentorum: Horologiorum sciotoricorum*, 1604); das dritte diente zum Messen räumlicher Winkel (vgl. B. BRAMER, *Kurtzer Bericht, Eines Schreg, oder Winckel Instruments*, 1615); das vierte war ein Planimeter (vgl. z. B. L. HULSIUS, *Erster Tractat Der Mechanischen Instrumenten Levini Hulsii: Gründtlicher, augenscheinlicher Bericht dess newen geometrischen grunteissenden Instruments, Planimetra genandt*, 1604; J. FAULHABER, *Ein sehr nützlicher new erfundener Gebrauch eines niderländischen Instruments zum Abmessen und Grundtlegen*, 1610; DERS., *Newe geometrische und perspectivische Inventiones etlicher sonderbahrer Instrument*, 1610; B. BRAMER, *Trigonometria planorum mechanica*, 1617); das sechste Instrument war ein Schrittzähler (vgl. z. B. L. HULSIUS, *Vierdter Tractat der Mechanischen Instrumenten Levini Hulsii. Gründtliche Beschreibung des Diensthafften unnd Nutzbahrn Instruments Viatorii oder Wegzählers*, 1605); das siebte war ein Geschützaufsat mit einer Visiereinrichtung, die eine bei Tageslicht vorgenommene Ausrichtung einer Kanone nachts reproduzieren konnte (vgl. den Hinweis bei MEHL, *Des cartes en Allemagne*, S. 49–52, auf L. HULSIUS, *Ander Tractat Der Mechanischen Instrumenten Levini Hulsii: Gründlicher unterricht des neuen BüchsenQuadrants, wie derselbe, das grosse Geschütz, bey Tag oder bey Nacht zurichten, gebraucht sol werden*, 1603; vgl. auch J. FAULHABER, *Weitere Continuation deß Privilegirten Mathematischen Kunstspiegels*, 1626, S. 20–21).


tibiae ad momenta metienda, aliud ad tormenta bellica noctu dirigenda. — Petri Rothen
Arithmetica philosophica. — Benjamin Bramerus.

Lux quia non nisi in materia potest generari, ubi plus est materiae, ibi facilius generatur caeteris paribus; ergo facilius penetrat per medium densius quam per rarius, unde fit ut refractio fiat in hoc a perpendiculari, in alio ad perpendiculararem, omnium autem maxima refractio esset in ipsa perpendiculari si medium esset densissimum a quo iterum exiens radius egrederetur per eundem angulum. 5




[Fig. 13]

Sit $abcd$ medius densissimus, radius ef per fg perpendiculariter transbit per fg in gh , ita ut bfe et cgh sunt aequales anguli. Reflexio autem nihil est aliud quam productio 10




1f. Petri ...philosophica: P. ROTH, *Arithmetica Philosophica, Oder schöne neue wollegründte Über-auß Künstliche Rechnung der Coß oder Algebrae*, 1608. 2 Benjamin Bramerus: B. Bramer.

lucis a superficie opaca in partem inversam, quoniam in rectum non potest, v. g. superficies afb producit radium reflexum fi quem surrectum gh produxisset superficies cgd . Locus imaginis est in linea recta ab oculo ad primum reflexionis vel refractionis punctum producta, in quo autem illius puncto sit; hoc non apparet nisi ex situ aliorum punctorum quia distantia objecti non aliter advertitur; vel dici potest esse in perpendiculari ab objecto, id enim unum fit per accidens in quibusdam et non ex eo quod sit concursus perpendicularis.



[Fig. 14]



Hrsg.

Dantur adb et aeb , invenire ac et cb , differentiam inter ad ductum per ae et db ductum per be ; divido per differentiam inter quadrata ex ae et db , et productum si ducatur per ae facit ac , si per db facit bc est enim ut ae ad db ita ce ad dc atque ut db ad ae ita cb ad ca .

Nuper cum aliquas chartas comburerem, et ignis in quo comburebantur, esset acrior, animadverti characteres integros manere et tam lectu faciles quam antea: e contrario scripta vidi cum atramento sulfure mixto intra viginti quatuor horas evanescere.

Regula generalis ad aequationes quatuor terminorum completa s. — Reducatur numerus quadratorum ad ternarium per divisionem; deinde si illis addita sit nota + tollantur 3 ex toto numero et loco illorum reponantur 3⁴, et tollatur unitas, ac praeterea addantur tot unitates quot sunt 4 et 3, deinde procedatur ad aequationem inter $O\varphi$ et $O^4 + ON$. Qua inventa, addatur unitas radici inventae, et illa radix erit quae quaerebatur. Si vero quadratis addita sit nota —, tollantur 3 et loco illorum addantur 3⁴ et unitas[:] deinde tollantur adhuc tot unitates quot sunt 4 et 3, ac postea si extrahatur radix ex invento nostro et ex illa extrahatur unitas, habebitur radix quae sit initio.

1 Datur E ändert Hrsg. nach DO 1 per ae et ab E ändert Hrsg. nach DO 2 ex ad et cb
 E ändert Hrsg. nach DO 3 utque E ändert Hrsg. nach DO 3 f. cb ad ea E ändert Hrsg. nach DO 10 tollantur (\checkmark) E ändert Hrsg. nach DO 10 reponantur 34 E ändert Hrsg. nach DO 11 sunt 4 E ändert Hrsg. nach DO 12 inter 06 et 04 ON E ändert Hrsg. nach DO 12 f. radici, inventa et illa radix erit quae quae (bis) quaerebatur. E ändert Hrsg. nach DO 13–15 tollantur et loco illorum addantur 34 et unitas deinde addantur adhuc tot unitates quot sunt 4, ac (bis) postea E ändert Hrsg. nach DO

1–4 Dantur ... ad ca : Die Aussagen gelten nur für Punkte a, b, d, e , die auf einem Kreis liegen und folgen aus dem Sekantensatz. In den Dreiecken adb und aeb mit den von Descartes in der Beispieldiagramm angegebenen Seitenlängen ist diese Bedingung erfüllt: Die Eckpunkte liegen alle auf dem Halbkreis mit der Basis ab . (Vgl. EUKLEIDES, *Elementa*, III, 36, und den zugehörigen Kommentar in Chr. CLAVIUS, *Opera mathematica*, Bd I, 1611, S. 146–148, insbesondere S. 148 die Umkehrung des ersten Korollars, sowie das 2. Beispiel in der Handschrift *Calcul de Mons. Descartes* (HANNOVER GWLB Ms IV 381, Bl. 23, gedr. DO X, S. 674 f.); vgl. auch die Aufzeichnungen von Leibniz und Tschirnhaus zu Kreisvierecken vom 2. Februar 1676, VII, 1 N. 23, S. 181, und VII, 2 N. 76, Teil 2, S. 849–851). 5–7 Nuper ... evanescere: Vgl. G. B. PORTA, *Magiae naturalis libri XX*, 1589, lib. XVI, cap. 2, S. 248 f.; vgl. SHEA, *The Magic of Numbers and Motions*, S. 107 f., Anm. 50.

In tetraedro rectangulo basis potentia aequalis est potentiis trium facierum simul: v. g. sint basis tria latera $\sqrt{8}$, $\sqrt{20}$, $\sqrt{20}$; tria vero latera supra basin, 4, 2, 2, area basis erit 6; trium facierum, 2, 4, 4, quorum quadrata sunt 36, [et] 4, 16, 16, quae tria aequipollent priori. Item sunt latera basis $\sqrt{13}$, $\sqrt{20}$, 5 et supra basin, 2, 3, 4, area basis erit 5 $\sqrt{61}$; facierum vero 3, 4, 6, quorum quadrata sunt 61 et 9, 16, 36, aequalia priori. Hinc plurimae quaestiones ignotae solvi possunt circa tetraedra rectangula et non rectangula per relationem ad rectangula.

Haec demonstratio ex Pythagorica procedit, et ad quantitatem quoque quatuor dimensionum potest ampliari, in quo quadratum solidi angulo recto oppositi aequale est quadratis ex 4 aliis solidis simul. Sit ad hoc paradigma processionum in numeris 1, 2, 3, 4; in figuris l , q , c , qq , β ; in angulis rectis duarum linearum, trium, quatuor.

Data basi pyramidis rectangulae, facile inveniuntur latera super basin, sint, v. g. latera basis $\sqrt{13}$, $\sqrt{20}$ et 5; pro primo latere supra basin ponatur 1^4 ; pro altero $\sqrt{13 - 13}$;

11 Zu l , q , c , qq , β laut *E* von Leibniz angemerkt: (latus, potentia, cubus, quoque)

3 f. tria sequi pollent *E* ändert Hrsg. nach DO 11 figuris cp. cgq , β in angulis *E* ändert Hrsg. 13–129,1 ponatur 14; pro altero $13 - 1z$, et pro tertio $\sqrt{20} - 1z$ quorum *E* ändert Hrsg. nach DO

1–11 In ... quatuor: Vgl. J. FAULHABER, *Miracula arithmeticæ*, 1622, Kap. 45, S. 73–76.
 8–11 Haec ... quatuor: Der Abschnitt enthält einige Aufzählungen mit drei, vier, wohl sogar fünf, Termen, die Descartes in Analogie zur Folge der Zahlen 1, 2, 3, 4 setzt. Die Analogie besteht darin, dass sich jede dieser aufsteigenden Folgen beliebig fortsetzen lässt. — Die in *E* gedruckte Textstelle „cp. cgq , β “ ist verderbt, aus dem Zusammenhang des Satzes lässt sich jedoch erschließen, dass es sich in der Vorlage um eine Wiedergabe einer aufsteigenden Folge von Potenzen handelte. Vom graphischen Befund her ist diese aber kaum mit der Folge der ersten drei (in *DO* gedruckten) oder vier cossischen Zeichen „ 4 , \mathfrak{Z} , \mathfrak{z} , $\mathfrak{Z}\mathfrak{Z}$ “ (in Analogie zu den Zahlen 1, 2, 3, 4) in Übereinstimmung zu bringen. Zieht man darüber hinaus die in *E* dazu abgedruckte Anmerkung von Leibniz („latus, potentia, cubus quoque“) hinzu, so wäre erklärendesbedürftig, warum Leibniz erst an dieser Stelle und nicht schon vorher die cossischen Zeichen in die entsprechenden mathematischen Begriffe übersetzt hat. Plausibler erscheint, dass Leibniz hier das Auftreten einer weiteren Bezeichnungsweise notierte, nämlich der Symbole l , q , c , qq , β für *latus*, *quadratus* bzw. *potentia*, *cubus*, *quadratoquadratus*, *sursolidus*: Beispiele aus diesen alternativen Symbolen verwendet Descartes in der unmittelbar darauf folgenden Rechnung, nämlich q und qq sowie qc für *quadratocubus* (vgl. *DO* X, S. 247, Anm. b). Es muss wohl offen bleiben, ob es sich bei dem Wort „quoque“ in der Anmerkung von Leibniz nicht sogar um eine irrtümliche Auflösung von qq für *quadratoquadratus* handelt.

et pro tertio, $\sqrt{20 - 13}$; quorum duorum potentia, quia aequalis potentiae lateris est aequalis $33 - 23$ vel 13 aeq. 4. Ergo nota basi et angulo opposito totam pyramidem possumus agnoscere ut de triangulo Euclides demonstrat. Tetraedri rectanguli latera ad basin $a\beta\gamma$ supra basin erunt

$$\sqrt{\frac{1}{2}\alpha q + \frac{1}{2}\gamma q - \frac{1}{2}\beta q}; \sqrt{\frac{1}{2}\alpha q + \frac{1}{2}\beta q - \frac{1}{2}\gamma q}; \sqrt{\frac{1}{2}\beta q + \frac{1}{2}\gamma q - \frac{1}{2}\alpha q};$$

5

areae facierum

$$\begin{aligned} & \sqrt{\frac{1}{16}\alpha qq + \frac{1}{8}\beta q\gamma q - \frac{1}{16}\beta qq - \frac{1}{16}\gamma qq}; \\ & \sqrt{\frac{1}{16}\beta qq + \frac{1}{8}\alpha q\gamma q - \frac{1}{16}\alpha qq - \frac{1}{16}\gamma qq}; \\ & \sqrt{\frac{1}{16}\gamma qq + \frac{1}{8}\alpha q\beta q - \frac{1}{16}\alpha qq - \frac{1}{16}\beta qq}; \end{aligned}$$

1 f. aequalis, $33 - 22$ vel $1z$ aeq. 4 E ändert Hrsg. nach DO 4 basin $a\beta\nu$ supra E ändert Hrsg.

nach DO 4-130,5 erunt $\sqrt{\frac{1}{2}} = +\frac{1}{2}\sqrt{q} - \frac{1}{2}(3q\sqrt{\frac{1}{2}} = +\frac{1}{2}\beta q\sqrt{\frac{1}{2}}\sqrt{q}; \sqrt{\frac{1}{2}\beta q} + \frac{1}{2}\sqrt{q} - \frac{1}{2}aq;$ areae

facierum $\sqrt{\frac{1}{16}aqq + \frac{1}{8}(3q\sqrt{-\frac{1}{16}\beta qq} - \frac{1}{16}\sqrt{qq})} - \sqrt{\frac{1}{16}\beta qq + \frac{1}{8}} = \sqrt{q} - \frac{1}{16}aqq - \frac{1}{16}\sqrt{qq}, \sqrt{\frac{1}{16}\sqrt{qq} + \frac{1}{8}} =$

$\beta q - \frac{1}{16} = qq - \frac{1}{6}\beta qq.$ Area basis $\sqrt{aq} \quad \beta q - \frac{1}{16} aqq$
 $\frac{1}{8}aq \quad \sqrt{q} \quad \beta qq$
 $\beta q \quad \sqrt{q} \quad \sqrt{qq}$

Totum corpus tetraedri est: $\sqrt{\frac{1}{288}aqq\beta q} + \frac{1}{288}aqq\sqrt{q} + \frac{1}{288}\beta qq\sqrt{q} + \frac{1}{288}\sqrt{qq}aqq + \frac{1}{288}\sqrt{qq}\beta q - \frac{1}{144}aqBq\sqrt{q} \frac{1}{288}aq - \frac{1}{288}\beta qc - \frac{1}{288}\beta\nu qc.$ Invenitur E ändert Hrsg. nach DO

3 demonstrat: Die Aussage gilt nur für gleichschenklige Dreiecke und folgt aus EUKLEIDES, *Elementa*, I, 26, eine Analogie zu den von Descartes betrachteten rechtwinkligen Tetraedern besteht jedoch nicht.

Area basis

$$\sqrt{\frac{1}{8} \begin{matrix} \alpha q \beta q \\ \alpha q \gamma q \\ \beta q \gamma q \end{matrix} - \frac{1}{16} \begin{matrix} \alpha q q \\ \beta q q \\ \gamma q q \end{matrix}}$$

Totum corpus tetraedri est:

$$\sqrt{\frac{1}{288} \alpha q q \beta q + \frac{1}{288} \alpha q q \gamma q + \frac{1}{288} \beta q q \alpha q + \frac{1}{288} \beta q q \gamma q + \frac{1}{288} \gamma q q \alpha q + \frac{1}{288} \gamma q q \beta q - \frac{1}{144} \alpha q \beta q \gamma q - \frac{1}{288} \alpha q c - \frac{1}{288} \beta q c - \frac{1}{288} \gamma q c}$$

5 Invenitur corpus pyramidis ex tribus lateribus ad basin solis cognitis, si assumatur media pars summae ex tribus illorum quadratis aggregatae et rectangula radix trium quantitatum in se ductarum, quibus illa media summa excedit quadrata singulorum laterum separatimque continet sexies totum corpus hexaedri. Sint, v. g. tria latera ad basin $\sqrt{13}$, $\sqrt{20}$, 5, media pars summae ex tribus quadratis est 29, excedens 13, 20, et 25, numeris
10 16, 9, 4, quae per se ducta faciunt 576 cujus radix est 24 et hujus sexta pars est 4. Ergo corpus pyramidis est 4.

6 aggregatae et rectangulæ radix *E ändert Hrsg. nach DO* 10 24 et cujus sexta *E ändert Hrsg. nach DO*

23. DE CONDENDIS TABULIS ANALYTICIS

Januar 1675

Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 XIII 1 Bl. 440. 1 Bl. 2°. $\frac{2}{3}$ S. auf Bl. 440 r°. Rückseite leer. — Gedr.: LDK, 1980, S. 146 f.
Cc 2, Nr. 898

5

Januar. 1675.

De Condendis Tabulis Analyticis

Tabulas habemus Numerorum, Tabulas literarum, sive Combinationum dedit nemo. Quaerenda ergo ratio est condendi Tabulas ejusmodi, ut earum usus quam latissime pateat.

10

Pars I^{ma} de aequationum unius incognitae radicibus indefinitis

Hic recensebuntur ordine omnes aequationes unius incognitae ad gradum usque vicesimum si placet, et quidem generaliter atque indefinite; v. g. pro gradu tertio $x^3 + bx^2 + a^2cx + a^2d \sqcap 0$ cujus radices irrationales generaliter, et una formula (ope signorum ambiguorum) exhiberi potest; idem fiat in caeteris aequationibus omnibus, si modo id fieri potest.

15

Pars II. de aequationum tractationibus

Methodus investigandi aequationum divisores rationales atque irrationales gradu inferiores Tabulaeque quales Huddenianae. Methodus tollendi ex aequatione terminos quot

8 Numerorum, (1) restant Tabulae (2) Tabulas *L* 9 ejusmodi, (1) qvo (2) ut *L* 9–11 latissime (1) fundatur (2) pateat. (a) Pars I^{ma} de Formulis | sive Aeqvationibus *erg.* | unius incognitae (aa) ibi (bb) Praemittatur omnibus Methodus investigandi divisores Rationales pariter atque irrationales, | sed dimensione inferiores; aeqvationum unius incognitae nicht gestr. | (b) Pars I^{ma}: de (aa) Aeqvationibus (bb) Aeqvationum unius incognitae, (cc) Aeqvationum *L* 11 f. radicibus | indefinitis *erg.* | (1) In (2) Hic *L* 13 indefinite; | Earumque gestr. | v. g. *L* 13 f. tertio (1) $x^3 + a$ (2) $a^4 + a^3bx + a^4$ (3) x^4 (4) $x^3 + (a)ba^2$ (b) abx^2 (c) $bx^2 + (aa)a^2cx$ (bb) $acx + a^2d$ *erg.* | $\sqcap 0$ *L* 15 omnibus, (1) Sed qvoniam in altioribus in primis aeqvationibus (a) incognitae (b) aeqvations mult (c) radices irrationales multis exprimi possunt modis, suppositis (2) si *L* 17 aeqvationum (1) form (2) tractationibus *L* 19 Tabulaeque quales Huddenianae *erg.* *L* 19 Methodus (1) transformandi (2) tollendi *L*

19 tabulaeque ... Huddenianae: J. HUDDER, *De reductione aequationum*, Regel XI, DGS I S. 439 bis 458.

licet, praescriptis in eam rem formulis generalibus ut res sine calculo fiat. Methodus reducendi aequationes locorum parium ad proxime inferiores locorum imparium. Methodus efficiendi ut omnium aequationum radices fiant verae; Methodus reducendi aequationes ad alias inferiores ope quarundam intervenientium.

- 5 Regulae de aequationum limitibus; de resolutionibus aequationum in Analogias et formularum in portiones, sed hoc ope calculorum qui sequentur seu ope formularum plurium incognitarum. Huc alia id genus.

Pars III. de Aequationibus plurium incognitarum reducendis ad aequationes unius

Sit aequatio ascendens ad solidum incognitum; conjungatur p r i m u m cum alia quae
10 non ascendet nisi ad lineam incognitam, d e i n d e cum ea in qua linea et planum inco-
gnita, t e r t i o cum pari.

Totum ejusmodi Tabulae condenda artificium in eo consistet, ut sequentia praecedenti-
bus perpetuo juventur; itaque primum simplicibus admodum utendum est aequationibus,
sed multis.

2 locorum (1) parium (2) imparium L 3 verae; | item, *gestr.* | Methodus L 5 in (1) Analy
(2) Analogias L 6 ope (1) Rela (2) formularum L 9 ad (1) cubum; (2) quadratum incogni (3)
solidum L 10 ad (1) rect (2) lineam L 10 qva | non nisi *gestr.* | linea L

8 De ... unius: vgl. z. B. die Studie *De aequationibus pluribus ad unam reducendis* (VII, 2 N. 77)
vom 7. Februar 1676.

24. SCHEDIASMA DE CONSTRUCTORE

Dezember 1674

Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 I 17 Bl. 11–15, 17. 3 Bog. 2°. 12 S. Textfolge Bl. 11, 17r°, 17v° (untere zwei Drittel), 12–15. Ersetzte Vorstufen von Figuren werden nicht wiedergegeben. — Auf dem oberen Drittel von Bl. 17v° N. 28.

5
Cc 2, Nr. 827

Schediasma de c o n s t r u c t o r e. Xb. 1674.

24₁. PARS PRIMA

Trochoeidis parabolicae ope credo effici potest, ut qualibet data figura alia describatur quae sit in ratione logarithmorum ejus. Idque utile erit pro figuris usitatoribus, v. g. circulo figuraque angulorum, Cycloide, ipsaque Trochoide parabolica, quod si pro ipsa Trochoide parabolica fiat, fient logarithmi logarithmorum.


Figurae logarithmiae aequatio haec est $x \sqcap a^y$. Sed quoniam lex homogeneorum observari debet, videbimus quid futurum sit, $x \sqcap \frac{b}{a^0}$ vel $\frac{b^2}{a^1}$ vel $\frac{b^3}{a^2}$ vel $\frac{b^4}{a^3}$ etc. vel $x \sqcap \frac{b^y}{a^{y-1}}$ vel $xa^{y-1} \sqcap b^y$.

10

15

10 Über usitatoribus: utilioribus

7 Schediasma ... 1674. erg. *L* 9 (1) Figura log (2) Trochoeidis *L* 9f. describatur (1) homogene (2) qvae *L* 11 parabolica, (1) qva methodo ha (2) qvod *L* 13 est (1) $a^{y-1}x \sqcap a^y$ $xa^{y-1} \sqcap (2)x \sqcap a^y$ *L* 14 sit, (1) nimirum $\frac{x}{a} \sqcap$ vel 1^y et haec aeqvatio exacta est. Imo male, qvia 1^y seu 1 utcunqve in se ducta dat 1. Itaqve (2) $x \sqcap \frac{b}{a^0}$ *L*



[Fig. 1]

Talis figura per puncta describetur si rectae cuidam 012345678 cujus extremis duae ascriptae 0B. et 8A. inveniatur media 4C. et inter has tres inveniantur rursus mediae 2D. 6E, et inter has 5 rursus mediae 7H, 5G, 3F, 1K. Ita fiet ut continuatis in infinitum subsectionibus ut sint abscissae velut exponentes, et applicatae velut potestates, sive ordinatae sunt in replicata ratione abscissarum, v. g. abscissa 01 est ad abscissam 02 ut 1. ad 2. Ergo 2D est ad 0B in duplicata ratione 1K ad 0B. Hinc patet et omnes figurae logarithmicas esse inter se similes, nec nisi intervallo 08 inter duas datas applicatas sumto affine.

Inquirendum est in methodum qua P. Gregorius reduxit logarithmos ad spatia hyperbolica an ejus exemplo aliae figurae transcendentes reduci possint. Tangentem figurae logarithmiae describi ex punctis B K D. Applicatae ad rectam 8A sunt logarithmi, abscissae ex AE, ut numeri naturales. Videndum quid ex duarum logarithmicarum intersectione duci possit, item ex intersectione unius cum circulo aliave figura v. g. $x \sqcap$

11 f. *Dazu am Rand:* Possunt inveniri Tangentes figurae logarithmiae ope Trochoidis.

5 sint (1), velut 12. 13. 14. 15. etc. (2) abscissae L 5 potestates, (1) | v. g. *nicht gestr.* | 1B ad 13, | ut *nicht gestr.* | 01 ad 02. ita 0B est in replicata (2) nam (3) sive L 15 possunt | invenire Tangente ändert Hrsg. | figurae L

10 reduxit: Vgl. Gr. de SAINT-VINCENT, *Opus geometricum*, 1647, lib. VI, prop. CXXV–CXXX, S. 594–597 sowie A. A. de SARASA, *Solutio*, 1649, insbes. S. 7f.

$\frac{b^y}{a^{y-1}} \sqcap \frac{b^y}{a} \cdot a$. Pone jam $x \sqcap \sqrt{a^2 - y^2}$, junctis inter se his aequationibus, fiet: $\frac{b^{2y}}{a^{2y-2}} \sqcap a^2 - y^2$ sive: $b^{2y} \sqcap a^{2y-2} - y^2 \sim a^{2y-2}$, sive $\frac{a^{2y} - b^{2y}}{y^2} \sqcap a^{2y-2}$ sive $y^2 \sqcap a^2, -\frac{b^y}{a} \cdot \sim b^2$ vel $\frac{y^2}{b^2} \sqcap \frac{a^2}{b^2} - \frac{b^y}{a}$. Id est quaeritur ratio $\frac{y}{b}$ cuius residuum ex ratione $\frac{a^2}{b^2}$, aequetur reciprocae rationi datae subduplare, in ratione quae sita multiplicatae. Omnia ergo problemata quae rationum multiplicationibus et submultiplicationibus fieri possunt, solventur intersectio-
nibus Trochoeidis parabolicae et curvae Analyticae cujusdam. Sed et quemadmodum idem problema variis potest curvis Analyticis se secantibus solvi, ita et si curva semi-analytica et analytica jungantur, mutata analytica aliquando mutabitur et semianalytica.

Exempli causa hae duae fieri possent aequationes $\frac{y^2}{b^2} \sqcap \frac{x}{b}$, sive $y^2 \sqcap xb$. et $x \sqcap \frac{a^2}{b} - \frac{b^y}{a} \cdot \sim b$.

Ergo x componitur ex duabus $\frac{a^2}{b}$ ordinata rectanguli, et $\frac{b^y}{a}$ ordinata Trochoeidis. In-
tersectione ergo parabolae quoque et ejusdem Trochoeidis solvi potest idem problema.

Quodsi ad alios casus aliasve formas alterius generis Trochoeidies adhiberi possunt, uti non dubito, eo ipso dum idem problema ad diversas Trochoeidies revocari potest, ostenditur unius curvae Trochoeidem generantis in rectum extensionem ex altera pendere.

Duarum Trochoeidum vel idgenus curvarum, v. g. etiam Trochoeidis et Cycloeidis intersectione aequationes solventur adhuc difficiliores ubi ipsae y . intrabunt in exponentes

1 Nebenrechnung: $\frac{b^3}{a^2} \sqcap \frac{b^y}{a} \cdot \sim b$

3 qvaeritur (1) qvantitas eius naturae, cuius (a) residuum (b) qvadrato residuum ex data aeqvatur dato cuidam rectangulo (2) qvantitas qva (3) qvantitas $\frac{y}{b}$ cuius residuum ex data qvantitate $\frac{a^2}{b^2}$, aeqvetur qvantitati datae (4) ratio L 4 in (1) ratione rationis qvaesitae ad unitatem (a) multiplicatae (b) sive ad rationem m (2) ratione L 9 f. $x \sqcap \frac{a^2}{b} - \frac{b^y}{a} \cdot \sim b$ (1) idem ergo problema qvod (a) solvitur (b) solutum est (2) Ergo L

2–4 $y^2 \sqcap \dots$ multiplicatae: Der Exponent des Bruchterms müsste $2y - 2$ lauten. Leibniz rechnet konsequent weiter und formuliert das fehlerhafte Ergebnis aus. Die allgemeine Überlegung bleibt davon unberührt.


plus semel. Porro ope Trochoeidis nostrae extrahi possunt omnes radices aequationum

$$1-137,1 \quad \text{Nebenbetrachtungen: } \frac{y^2}{100} + \frac{ly}{20} + \frac{ab}{80} = y^2 + 2y + 80$$




$$y^3 + ly^2 + my + ab$$

$$y^4 + ly^3 + my^2 + ny + ab$$

$$y^5 + ly^4 + my^3 + ny^2 + oy + ab$$





$$\begin{matrix} y^2 \\ y^3 \\ y^4 \end{matrix}$$



1 semel. (1) Soli (2) NB. solida (a) Geometrica (b) Analytica possunt esse homogenea figuris non analyticis, qvemadmodum animadversum est a Wallisio ungulam qvandam Hyperbolicam esse (3) Porro L

4,9 animadversum est: J. WALLIS, *Mechanica*, 1670–1671, pars 2, S. 547 f. (WO I S. 918 f.); vgl. N. 28.

purarum, sed nondum video quomodo affectarum e. g. sit aequatio: $y^3 + ly^2 + amy + a^2n$.



$$y^2 \sqcap ab \quad y^3 \sqcap ab \quad y^4 \sqcap ab$$

$$\begin{array}{r} 2 \quad 4 \quad 8 \\ \sqrt{16} \end{array} \qquad \begin{array}{r} 3 \quad 9 \quad 27 \\ \frac{3}{\sqrt{81}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \quad b \\ \frac{2}{4} \quad \frac{b}{b^2} \\ \frac{2}{8} \quad \frac{b}{b^3} \\ \frac{2}{16} \quad \frac{b}{b^4} \\ \frac{2}{32} \quad \frac{b}{b^5} \end{array}$$

Nebenbetrachtungen auf Bl. 12 v^o:

$y^3 + ly^2 + my + sm.$ $\frac{y+l}{y+s} \sqcap \frac{m}{y^2} \sqcap \frac{m}{y} \hat{\wedge} \frac{1}{y}$. Trouver un nombre le quel augmenté par 1, soit au quotient de m, divisé par le dit nombre; comme le dit nombre augmenté de s. est à soy même. Item facile Geometrice exhiberi potest. Haec aequatio ita in duas divelletur: $\frac{m}{y} \hat{\wedge} y + s \sqcap x$ et $y + l \hat{\wedge} y \sqcap x$ quarum altera ad parabolam altera ad Hyperbolam simplicem. $my + ms \sqcap xy$. $y^2 + ly \sqcap x$. $my^2 - xy^2 + msy \sqcap 0$




fig. 2

[Fig. 2]

seu $y^2 \sqcap \frac{msy}{x-m} \sqcap x - ly$ sive $y \wedge l - \frac{ms}{x-m} \sqcap x$. Ergo $y \sqcap \frac{x}{l - \frac{ms}{x-m}}$ et $\sqcap \frac{ms}{x-m}$. Fiet:

$\frac{x-m \wedge x}{lx - lm - ms} \sqcap \frac{ms}{x-m}$ et reducendo: $x^2 - 2mx + m^2 \wedge x, \sqcap -m^2s^2, +lms \wedge x - m$, et

$x - m$ vocando z , fiet: $z^2 \wedge z + m \sqcap -ms^2, +lmsz$. $z^3 + mz^2 - lmsz + ms^2 \sqcap 0$. Quae aequatio cum aequivaleat datae tum $my + ms \sqcap xy$. Ergo $y \sqcap \frac{ms}{x-m} \sqcap \frac{ms}{z}$ potest a.

sumi $y \sqcap rz^2 + tz + v$.


Nebenbetrachtungen auf Bl. 13 r^o:

$$\frac{\boxed{10}+3}{\boxed{10}+4} \sqcap \frac{m}{100} \frac{\frac{1300}{14}}{\boxed{10 \square}}. \quad 1000 + 300 \sqcap 10m + 4m. \quad [m \sqcap] \frac{1300}{14}.$$

$$\frac{y+3}{y+4} \times \frac{1300}{y^2}. \quad y^3 + 3y^2 \sqcap \frac{1300}{14} y + \frac{4 \wedge 1300}{14}. \quad y^3 \sqcap \left[\frac{1300}{14} y + \frac{1300}{14} \right] 4 - \boxed{3y^2}.$$

2-4 sive: Leibniz unterlaufen Versehen bei der Rechnung, die sich nicht grundsätzlich auswirken.


Ut si AC sit a sive unitas et BD sit $\frac{ly^2 + amy + a^2n}{a^2}$ $\sqcap y^3$ quaeritur EF , $\sqcap y$.
duarum mediariū proportionalium EF et GH prior. Ex punctis E . G . educantur rectae
indefinitae EN , GO . ipsis AC , BD . parallelae, quas secabit in punctis K , L , recta CM ,
ipsi AB , parallelā et aequalis. Punctis L . K . C . applicentur rectae indefinitae LP . KQ .
 CR . tali angulo, ut GS , ET , AV sint aequales rectis l . m . n . et ut sint mobiles in
rectis GO , EN , AC , eodem tamen semper angulo servato. Hoc facto recta AB ponatur
esse asymptota figurae logarithmiae, cui recta data AC , ordinatim ex curva applicata
intelligatur. Datur ergo punctum A . Item punctum C . Quaeritur punctum B . et D . Recta
ergo BW infinita huc usque agatur, donec eveniat, ut recta AB inventa in punctis G .
 E . aequaliter divisa, rectae ex punctis H . F . C . ductae ipsis LS . KT . CV . parallelae
abscindant rectas GS , ET , AV , tales ut earum summa sit ipsi BD aequalis.



[Fig. 3]

Illud primum efficiendum est, ut datis 4 punctis A . E . G . B . et A . immoto manente,
motoque solum B . caetera moveantur proportionaliter, seu in ratione rectarum AE . AG .
 AB . seu ita ut AB . moto utcunque puncto A . semper aequaliter a punctis E , G . dividatur,
seu ut distantiae AE . EG . GB . semper maneant aequales.

2 GH (1) prima (2) prior. (a) per C transeat ipsi AB parallela, CHLM. secans rectas AC, EF, GL,
BM in punctis C, H, L, M. (aa) Cum ergo (bb) cum (cc) qvae | puncta erunt data, cum *nicht gestr.* |
rectae AB, AC, BM sint (dd) | puncta *nicht gestr.* | A. E. G. B. item M et C. sint data (b) per p (c) ex L
5 l. m. n. (1) et ut rectae illae LP, (2) et L 10 LS. | CT. ändert Hrsg. | CV. L




[Fig. 4]

Hoc ita efficietur[:] Sint tres circuli, aequales 3. 2. 1. in numerorum eos denominantium ratione inter se quorum centra in eadem recta 3. 2. 1. aequaliter distantia inter se: quilibet circulorum insistat plano rectae imaginariae per centra transeunti parallelo α . β .
 5 γ . Circulus 3. contineat circulum concentricum aequalem circulo 2. et circulus 2. circulum concentricum aequalem circulo 1. (nisi velis circulum maximum concentricos singulis aequales habere quod eodem redit :) Concentricus circulo 2. aequalis ipsi circulo 2. et concentricus circulo 1 aequalis ipsi circulo 1. jungatur chorda vel catena. Si chorda est
 10 necesse est alicubi clavo infixam esse utrique, et pro longitudine itineris saepe replicatam. Sed quia haec replicationes crassitudinem cylindri vel circuli quodammodo mutant, ideo replicationes eae evitari possint non ineleganti invento, si cylinder adhibetur pro circulo, et chorda connectat circulos duorum horum circulorum respondentes, et ubi ea chorda desit aut paulo ante alia chorda alios duos circulos respondentes connectens incipiat, ita quam longissime sine replicationibus continuari potest motus. Chordae autem sunt
 15 exacte Geometricae. Supponuntur enim flecti in quolibet punto, non sunt exacte mechanice quia mutant tensionis statum. Contra catenae Geometricae rem non absolvunt, ob intermedia puncta quae transsiliuntur; at Mechanice sunt exacte. Impedient enim omnes vacillationes. Inprimis si dentibus rotarum ita respondeant, ut circulus quilibet semper dentem quemlibet transeat intratione quadam mutua. Catenae autem talis adhibita repli-
 20 cabitur catena circa utramque rotam concentricam, scilicet et ei aequalem, simpliciter in

2 aeqvales (1) super eodem (2) 3, 2, 1. super eodem plano vo (3) B. G. E circulus B ut 3, circulus G, ut 2, circulus E, ut 1. centra eorum sint in eadem recta (4) 3. 2. 1. in L 5 circulo 2. | et circulus 3. circulum concentricum aeqvalem circulo 2. nicht gestr. | et L 8 catena | vel regula dentata gestr. | (1) utri (2) si L 15 f. exacte (1) physice (2) mechanice L 16 catenae (1) mechanicae res (2) Geometricae L 19 f. adhibita (1) ut mechanice exacta est, (2) replicabitur L

se rediens, neque nisi in uno puncto seu annulo unam rotam tangens. Potest remedium adhiberi forte chordarum tensioni, si elaterium in loco ubi affixa, eas tendat vel in uno latere vel utrobique, sed ad usum tutiores catenae. Nota non ut alias ita hic quoque chordae simpliciter tangere debent trochleas, sed debent esse iis infixae extremitatibus, hoc si fiat, et arte quadam efficiatur, ut semper tensa sit chorda, ope Elaterii, et evitetur eodem tempore replicatio. Quod et ad Elaterium necesse est, ita enim si absit replicatio Elaterium facile tendet chordam; cum et distantiae punctorum 3. 2. 1. semper maneant eaedem, quod ope axium per centra perpendiculariter ad circulorum plana transeuntium inter se linea rigida ab utroque latere connexorum [efficiatur] quia linea rigida simul cum machina recta procedit. Hac methodo non video quid etiam sine dentibus rotis, catenisque ad summam exactitudinem desiderari possit modo id unum efficiatur, ut non possit procedere machina ne in momento quidem physico, id est plane non nisi tantundem volvatur. *Il faut empêcher que la première roue 3. ne puisse glisser ou traîner sans tourner.* Efficiendum scilicet est ut prima rota 3, non possit ita procedere ut per aliquod temporis spatium eodem punto *B* planum tangat. Quod impediatur si ipsi quoque chorda (vel si vis catena) sit circumPLICATA affixaque (elaterio in loco affixionis tendente[]) quae deinde per rectam *BGF* extendatur, ita fiet, ut quantum ipsa chordae relinquat in plano, id est quantum volvitur, tantum provolvatur. Praeterea utile imo necesse est rotam 3. fortiter premi contra planum in *B*. Ita enim elaterium in duobus affixionis punctis, altero in plano, altero in rota 3. chordam tendens non poterit subtrahere eam punto attactus inter tendendum; et ita tensiones illae et relaxations a natura chordae aut humiditate aeris, vel calore vel frigore ortae; non sentientur, a gyratione trochleae sive rotæ. Atque ita effecimus problema Geometricum satis elegans: Efficere, ut punctis quotcunque datis in eadem recta aequidistantibus; motis omnibus praeter unum, maneant omnia aequidistantia. Quod est corollarium propositionis hujus[:] Datis quotcunque punctis in eadem recta efficere ut moto uno caetera omnia moveantur per consequentiam in data ratione celeritatis. Id enim hic evenit, modo ponamus ex planis γ . β . α regulas perpendicularares δEF , θGL , BD . descendere, quae a punctis contactus δ . θ . B . continue propellentur. Puncta autem contactus procedent in ratione Circulorum, ergo et regulæ, ergo et puncta *E. G. B.* quibus regulæ rectam α vel *AB* secant.


14 possit | ita *erg.* | procedere | ita *nicht gestr.* | ut *L* 16 sit (1) complicata (2) circumPLICATA
| affixaque ... tendente *erg.* | qvae *L* 23 ut (1) qvatu (2) pu (3) corpora qvaedam in eadem linea (4)
pun (5) punctis *L*



[Fig. 5]

Ut autem omnium rectarum AV , ET , GS . summa in unam rectam BD colligatur hoc opus hic labor est. Ego ita post multa tentata commodissimum reperi, ita ut ne regulis quidem traversalibus KT , LS , opus sit. Nimirum recta AC . statuta, unitate, et recta 5 AT posita $\sqcap b.$ cum infinitam BW promoves punctum E seu indefinita EN movebitur proportionaliter, reliquis non erit opus, ut GO , etc. Unde non tribus illis circulis 3. 2. 1. aut pluribus, sed solum duobus extremis maximo et minimo.

1 [Fig. 5]: Leibniz bezeichnet zwei verschiedene Punkte mit $G.$ 4 KT , LS : s. o. Fig. 2.



[Fig. 6]

Jam ipsam BD . pone continere figuram Ω , quam hic adscriptam vides, ibi recta AM , ita applicata angulo quodam unitas seu $(A)(X)$ seu $a \sqcap AC$ figurae prioris. Jam regula $(X)(B)$ sit eo angulo ut recta $(A)(B)$ fiat ad rectam $(A)(X)$ ut b ad 1 seu erit $(A)(B) \sqcap b$. Inde parallela ipsi $(A)(X)$ exibit $(B)(C)$ aequalis ipsi y . seu EF . Quod fiet dum in fig. 2
5 fingis rectam $F\Gamma$ regulam, ab EF transire in BD angulo recto, seu ipsi AB parallelam, unde rursus exeat regula BG mobilis cum regula BD in regula $F\Gamma$, quae facit ob angulum $G\Gamma B$ semirectum ut ΓG sit $\sqcap B\Gamma \sqcap EF$. Jam redi ad figuram Ω . ubi ΓG prioris fig. 2, est $(B)(C)$ hujus. Per puncta $X C$ transeat recta interminata $(X)(C)(F)(K)$ in qua mobiles ipsi AM semper parallelae $(C)(N)(F)(O)$ etc. $(C)(N)$ propellitur a BC [: recta $(B)(C)$ fig. Ω
10 eadem cum recta ΓF fig. 2 :]. Inde in AM ducatur recta $(C)(D)$ angulo tali, ut $(B)(D)$ fiat $\sqcap ly$. seu ut BC multiplicetur per l . atque ita propelletur linea $(D)(E)(F)$ ita ut E sit in recta $(C)(N)$, erit $(EF) \sqcap ly^2$. Sed ob angulum (FH) , qui multiplicat ly^2 per $\frac{m}{l}$
15 fiet $(EH) \sqcap my^2$. Quae regula (FH) propellit $(GHIK)$ quae secat (FO) in (I) unde $(IK) \sqcap my^3$ unde regula (KL) multiplicans (IK) per $\frac{n}{m}$ faciet $(IL) \sqcap ny^3$. et ita porro in infi-
20 nitum. Sed si ultra cubum non procedat aequatio, contenti erimus linea $(GHIK)$ quae quando in curvam nostram incidit solutum est problema. Unum oblitus sum, puncta (A) . (B) esse immobilia, ideo rectam $(X)(K)$ esse mobilem circa centrum X . quia y semper mutatur, regula ergo (BC) non propelletur, sed a recta $(AX) \sqcap$ rectae BG figurae 2 circumage-
 $(X)(K)$. Caeterae regulae propellentur. Restat quomodo termini negativi per regressum determinentur, et quomodo radices falsae.

242. PARS SECUNDA

1 vides, (1) ubi vides $b \sqcap (A)(B)$. portionem rectae $(A)(M)$ pone $BC \sqcap b$ seu aeqvalem ipsi EF , multiplicatae per 2 (2) ibi $L = 7$ figuram Ω . (1) ubi regula BG prioris fig. 2, continuato (2) ubi $L = 18$ recta $| (AC)$ ändert Hrsg. | \sqcap rectae $L = 20$ radices (1) negativae (2) falsae L

4 fig. 2: s.o. Fig. 5. 9f. [: . . . :]: Die eckigen Klammern stammen von Leibniz.


Schediasmatis de c o n s t r u c t o r e , Pars II.

Si Radices semper essent verae, et termini aequationum (post transpositionem in duas) semper affirmativi, jam perfectam haberemus Machinam c o n s t r u c t r i c e m. Et, certe, nihil immutando, ita tantum uti praecedenti parte descripta est, omnium ejusmodi aequationum quae omnes habent terminos negativos, praeter unum; haberi poterunt radices verae. Praeterea, si solis radicibus veris contenti esse volumus, sufficiet figuram Ω bis adhibere, semel v. g. in ultimo, semel in alio, postquam scilicet aequatio in duas partes aequales utrobique affirmativas divisa erit, nam ubi utrobique puncta (I) coincident, ibi erit y quaesita. Sed quoniam ego perfectionem Geometricam, et omnes radices aequationis quaero; ideo figuram Ω quam superioris schediasmatis fine applicui altissimae dimensioni aequationis, rectius judico adhiberi infimae seu radici. Itaque loco (A)(C) in figura Ω erit regula (X)(K) et loco ipsius \overline{MF} in fig. \beth erit $\psi\varphi$, seu in fig. Ω (G)(K). Recta ergo (X)(K) rectam GK adducet vel propellet, prout in motu y crescunt aut decrescent. Nam motus eodem modo procedere potest prorsum et retrorsum. Tota difficultas est efficiendi, ut etsi termini quidam intermedii absint, nihil tamen turbetur, item ut motus prorsum et motus retrorsum possint esse mixti. Et quidem ut aliquis terminus sit nullus facile effici posset, faciendo ut (F)(H) verbi gratia sit ipsi (F)(D) parallela, ita quidem (E)(H) fiet nulla, sed quoniam ita jungetur (D)(F) et (G)(K) hinc aliud malum quod ita (I)(K) fieret non y^3 sed y^2 . Difficile est fateor his malis mederi salva machinae simplicitate, itaque: Forte utilissimum erit aequationem propositam in aliam mutare, ejusmodi, ut omnes ejus radices sint affirmativa; quo facto termini etiam signis + et - affecti se alternatim sequentur, quod mire commodum est ad institutum nostrum. Ita enim nec machina illa circulorum sive Trochlearum proportionalium opus erit. Imo quod est mirabilius poterimus resecare ipsam Trochoeidem sive curvam, tantum enim bis habebimus figuram Ω . In una progreditur verb. gr. $y^6 y^4 y^2 ab$ in altera $y^5 y^3 y$. in qualibet parte affirmative. Et quando eveniet ut summae utrobique sint aequales, seu ut lineae GK utrobique coincident, tunc habebitur vera y . Itaque tamdiu movenda est machina donec talis y reperiatur, quod aliquando, vel etiam aliquoties eveniet, si ma-

2 f. (post ... duas) erg. L 6 radices (1) affirmativ (2) verae L 12 f. (A)(K) L ändert Hrsg.
zweimal

8 puncta (I): Leibniz verwendet in der Folge bei den Punktbezeichnungen statt der Einrahmungen meist Klammern oder verzichtet ganz auf solche Hervorhebungen.

china habeat radices unam pluresque reales. Nam manifestum est omnes veras habere. At inquies quid si nesciam an et quot habeat radices; continuandus erit motus sine fine, donec reperiam y satisfacientem; et si nullam inveniam; nescio an quiescere debeam. Sed huic malo remedium habetur. Nam per methodum generalissimam et facillimam Hud-
 5 denii, determinandi aequationes, statim earum limites habentur. Intra quos sufficit fieri motum. Praeterea eadem opera etiam veri habebuntur numeri, si qui sunt, aequationum radices; nam ex divisoribus termini ultimi in numeris dati statim patebit qui accedant inventis radicibus, et an inter se sint consentientes, ipsis enim in se multiplicatis necesse est prodire aequationem propositam, quod utique facillimum est; praeterea hac methodo
 10 non est opus, tolli fractiones ex aequatione, modo eae non ingrediantur terminum ultimum, et si veros numeros non quaeras, non est opus tolli neque surdos neque fractos ullo casu.



6 etiam (1) verae habebuntur aeqvationum radices si qvae sunt: nam (2) veri L 10 f. ultimum,
 | Imo contra utile est eas adhiberi *gestr.* | et L

4 methodum: J. HUDD, *De reductione aequationum*, 1659, DGS I S. 406–506.

[Fig. 7]

Servit hoc instr^{tum} non tantum ad radices aequationum, sed et ad ordinatas curvarum in numeris habendas, condendas facile tabulas[,] examina aut tentamina facienda in opticis[,] in mechanicis. Ut machina explicari et complicari possit opus est puncturas a propellentibus utrinque attingi.

5

Felices inquisitiones quando natura rerum ipsis, insperato consentit. Inquirendum in difficultatem motus seu detrimentum ex contactu, et utrum expediat regulas quasdam inclinate aut transverse promoveri.

Commodum quod non est in curvis se secantibus quoad scil. difficile determinare puncta intersectionis, quia se valde oblique secant. Hic sectio recte determinantis semper perpendicularis nec multa puncta comprehendendi possunt. Pertinent ista ad Geometriam practicam, qua examinetur quae instrumenta praxi commodiora.

10

Unitas semper ejusmodi eligi potest ut fit major qualibet radice quaesita.

In plano HGM sit ipsi HG parallela CF . et HC perpendicularis ad HG . Et in ipsa FC . supra vel infra C . sit punctum L . circa quod in eodem plano mobilis regula LM . indefinite producta versus M . Et vero quaecunque dicturus sum in eodem semper plano intelligenda sunt, nisi aliud admoneatur.

15

Quanquam lineae hic latae sint, regulae scilicet tamen danda opera est ut certarum tantum linearum subtilissimarum in ipsis ductarum ratio in designando quaesito haberi possit.

20

Descriptio Instrumenti Algebraici cuius ope omnium aequationum
ut cunque affectarum post facilem admodum praeparationem radices
geometrico et si placet eadem opera in numeris quantum licet vero

17 admoneatur | in ipsa COQF mobiles sint | perpendiculariter erg. | duae regulae OP, QT. Horizonti, sive ipsi gestr. | L 18 sint, | ut machina haec erg. u. gestr. | regulae L 21 (1) Esto aeqvatio qvaedam proposita, sexti exempli causa gradus; (a) ante omnia efficiendum est, ut omnes (b) ea ante omnia ita praeparanda est, ut omnes nanciscatur radices veras; eademqve opera (aa) fieri potest (bb) fiet ut omnes eius termini sint alternatim affirmati et negati (2) Descriptio L 22 utcunqve ... praeparationem erg. L

15 punctum L : Leibniz hat den Punkt L zunächst auf der Geraden FC platziert, danach auf HC (s. u. S. 148 Z. 8).

propinquis sine ullo calculo reperiuntur

Esto longitudine *BE* indefinita, latitudine autem certa pro arbitrio sumta *EG*. rectangulum *BEGH*; circa cuius latus *BE* velut axem mobile sit planum *BEID* indefinite continuatum et circa oppositum latus *GH* mobile sit planum *HGM*. erigendo utrumque 5 planum ita ut sit perpendiculare ad planum hujus paginae quod coincidit cum plano rectanguli intermedii *BEGH*. Totum instrumentum formam habebit libri complicati cuius dorsum sit rectangulum latera sint plana *BEI*; et *HGM* inter se parallela et ad dorsum perpendicularia. Esto jam in recta *HCL*. punctum *L*. mobile huc illuc in dicta recta; mobilisque cum ipso pariter et circa ipsum recta seu regula *LM* indefinite producta versus 10 *M*. Ipsi *CL* parallela sit regula *OP*. quae in punto *O* rectae *CF* immobiliter affigi; vel etiam cum opus est sursum deorsum moveri possit. Secabit autem sive si mavis praeterierit rectam *LM* in punto *P*. Ex punto *P* regulae *LM* vel regulae *OP* (: nam alterutrum idem praestat :) exeant regulae duae, altera alteri affixa; transversalis *PQ*. praeteriens rectam immobilem *CF*. in punto *Q*: et altera perpendicularis *RPS* ipsi *CF* parallela 15 quae sursum producta ipsi *CL*. productae occurrit in *R*. et deorsum tendit versus *S*. indefinite. Hae duae regulae simul moveri possunt vestigiis suis parallelae ab *O*. versus *P*, ope cuiusdam eminentiae oblongae Regulæ *PQ* quae inseritur m o b i l i t e r c r e n a e ipsius *OP*. ita ut eminentia cum ipsa *OP* in crena congruente regula *PQ*. (et proinde et regula ipsi affixa *PS*.) in regula *OP*, eodem semper ad eam angulo procedere possit. 20 Id autem fiet apertura regulæ *LM*, quae circa centrum *L*, gyrata, obstantem sibi regu-


1 f. reperiuntur (1) Esto o (2) Esto (a) asser (b) planum ABCDE (c) rectangulum ABCFED. (aa) per (bb) secundum longitudinem in medio sectum per rectam BE ita aliud rectangulum BEGH, circa cuius extremum B latus ponam in longitudinem sumtum BE velut axem mobilis sit portio ADEB, et circa ipsum planum BEGH. mobilem circa alterum latus (aaa) longitudine sumtum (bbb) suum GH, velut axem in extremitate plani portionis HGFC. et circa alterum latus GH mobilis sit portio | tantum erg. | HGFC. (aaaa) qvo facto considerando planum (bbbb) jam portio (cccc) Recta portionis ADEB (dddd) in eodem plano habent regulas qvasdam (aaaaa) vertica (bbbbbb) perpendiculares (ccccc) horizontales et (ddddd) horizontales (eeee) In plano continuato portionis ADEB regulæ qvaedam mobiles comprehensae inter ANID et aliae in plano portionis HGFC continuato (aaaaaa). Unde complica (bbbbbb) comprehensae in GLMF (3) Esto longitudine BE indefinita (4) Esto *L* 5 paginae (1) Totum instrumen (2) coincidens (3) qvod *L* 7 rectangulum | exiguum ADEB. gestr. | latera *L* 9 seu regula erg. *L* 11f. sive ... praeteribit erg. *L* 13 PQ. (1) concurrens regul (2) praeteriens *L* 14 CL *L ändert Hrsg. zweimal* 17 cuiusdam (1) (incisurae) qva Regula PQ inseritur (2) eminentiae (a) longae (b) oblongae *L* 18 ut (1) incisura, ipsa PQ congruens, et (2) eminentia *L* 20–149,1 sibi (1) rectam (2) regulam *L*

lam PQ . vel PS , vel aliquam earum portionem exeuntem propellet, ab O . versus P . seu directione OP . Eodemque tempore Regula PQ . in Q . praeteriens ipsam CF , ibi aliam regulam QT in crena ipsius CF congruenter mobilem offendet, propellitque directione QF . dum interim ipsa QT praeteriens LM in T . aliasque gerens regulas TS , TV , 5 ipsis PQ . PS . similes incisura congruente in crena ejus mobiles; descendendo faciet eas ab ipsa magis magisque aperiente sese LM , directione QT . propelli; quo fiet veluti ante ut ab ipsa TS , ipsam PS praetereunte in S . alia ibi occurrens regula SM in ipsa PS . pro- 10 pellatur. Quod ita continuari potest quoad res postulat. Notandum autem durante motu sive operatione rectas LC , CF esse immobiles; CL . OP . QT . SM parallelae inter se perpetuo in una pariter atque alia operatione quemadmodum et CF . RPS . TV . inter se. 15 Ipsae autem PQ . TS . neque erunt parallelae inter se, neque semper eundem ad parallelas et perpendiculares angulum servabunt; sed circa centra quaedam in ipsis eminentiis in crenas P . T . etc. intrantibus fixa, mobiles erunt, ab initio scilicet operationis manuum opera, ut scilicet angulus illis detur, quem postulat exemplum propositum; qui semel dato, durante operatione ejus exempli, angulum illum servant, et vestigiis suis parallelae feruntur.

Jam ut ad alterum quoque planum priori post machinae complicationem libriformem, parallelum, $BEIN$ progrediamur, supponendum est arte quadam (quam postea explicabo) effici, ut ponendo $BA \sqcap HC$. et directione BA sumendo rectam AN , dicta recta, in puncto N perpendicularis semper incedat regula NW , ita ut recta AN sit semper media proportionalis inter rectas CL . constantem; et OP motu regulae LM variantem. Motu ergo regulae LM etiam circa centrum fixum L . procedere supponemus (modo postea explicando) punctum N . Ex quo punto N . exibunt rectae vel regulae tres cum ipso puncto mobiles, NW ad BN perpendicularis; NX angulo quem exemplum postulat, et qui durante operatione manet, sed pro alio exemplo motu ipsius NX circa centrum N ut res postulat inclinari aut elevari potest. Tertia ex punto N . exibit regula NI 20 quae durante ipsa operatione non tantum ut caeterae cum punto N procedet, sed et circa ipsum velut centrum, ita gyrabitur, ut semper ipsi LM , motus omnis principio 25

1 aliquam (1) eius (a) eminentiam propellet, (b) portionem emin (c) prop (2) earum L 1 versus P . (1) idem omnino praestaretur, et forte ob crenae obliquitatem factus quam ante si eminentia regulae PQ vel PS . intraret in crenam ipsius LM , ita enim | tum erg. | gyratur LM , pars quaedam unius harum regularum cum ipsa LM propulsa et in obstantem regulam OP impingens, cedere cogetur, et ita regulae PQ . PS in crena ipsius LM descendent ut P directione PM . suis tamen semper vestigiis parallelae (2) seu L

sit parallela. Quod nullo negotio, simili fere qua instrumentum parallelis lineis ducendis accommodatum, constructione efficietur.



[Fig. 8]

Nam in illo instrumento ex parallelogrammo in rhomboeidem utcunque transformabili mutatis angulis semper servatur parallelismus, hic illud tantum addendum est, ut in illo instrumento quadrilatero paralleliformo $L\alphaZY$ non tantum rectae circa moveri possint, ut LY et αZ horizonti parallelis manentibus ipsae $L\alpha$, YZ mutato ad ipsas angulo parallelismum servent inter se, sed et unum latus v. g. YZ ab altero $L\alpha$. servato tamen parallelismo longius recedere possit punctis scilicet YZ in crenis rectarum LY . αZ incedentibus. Nam in nostro casu non tantum CL et AN horizonti parallelae manent, nec tantum NI et LM parallelae manere debent inter se; mutato ad horizontem angulo, sed et distantia ipsarum parallelarum in linea horizontali sumta, seu differentia ipsarum CL , AN semper mutabitur durante motu. Hoc posito ergo puncto Y in recta LCY et posito puncto α in recta $L\alpha M$: et recta αZ ipsi LY , quemadmodum et YZ ipsi $L\alpha$ aequali et parallela. Vicissim ponendo $AN \sqcap CY$. ita ut in plano $BEIN$ recta βI , respondeat rectae YZ plani paralleli $HGML$, punctum L puncto Y et punctum β puncto Z ; et denique conjungendo puncta Y et N item Z et β , rectis ad plana perpendicularibus YN item $Z\beta$. fiet ut quemadmodum incedit recta NI seu punctum N super AN , ita procedat e regione, etiam punctum Y ; et quemadmodum β ita Z . Sed vicissim quemadmodum YZ semper parallela est ipsi $L\alpha M$, ita $N\beta I$, ipsi YZ . et per consequens ipsi $L\alpha M$. Et quemadmodum ob incessum puncti N (:ut scilicet AN semper sit media proportionalis inter CL et OP quod postea explicabimus:) ipsa YZ procedit in ipsis LY , αZ indefinite productis; ita quia LM et proinde et YZ angulum ad horizontalem LY mutat, ideo NI quae his

6 f. possint, (1) ut mutato (2) ut L 13 recta (1) CL (2) continuata directione CL cui pu (3) CLY (4) LYC (5) LYC L 15 f. rectae (1) $L\alpha$ (2) | RZ ändert Hrsg. | plani L 17 conjungendo (1) LY (2) YN et $Z\beta$ prorsus ut juncta sunt (3) puncta L

semper parallela esse debet consimiliter agi poterit circa centrum *N*. Et haec ideo fusius explicui quia in ipso plano non satis repraesentari potuere. De reliquo in plano sinistro *BEIN*, eadem similia evenient illis quae circa regulas alias parallelas aut perpendicularares aut transversales in priore seu dextro *HGML* explicui; nam regula transversalis *NX* ipsi *AD* occurrens in *X*. regulam *Xγ* parallelam ipsi *AN* propellet in *AD* directione *AXD* in qua regula parallelala *Xγ*. Duae rursus regulae: *γδ* perpendicularis, et *γW* transversalis sibi invicem affixa mobiliter incidente directione *Xγ* in puncto *γ* cum recta *NI* communi, et *γW*. transversalis ipsi perpendiculari *NW* occurrens in *W*. propellet in dictae *NW* puncto *W* parallelam *Wθ*. directione *NW*. In cujus regulae parallelae (ipsi *AN* :) nempe *Wθ*. puncto *θ* cum *NI* communi rursus duae regulae, una perpendicularis *θλ*, altera transversalis *θδ* sibi invicem affixa, et vestigiis suis parallelae, (ut semper subintelligendum) movebuntur ex quibus transversalis *θδ* ipsi perpendiculari praecedenti *γδ* occurrens in *δ* ibi parallelam *δλI* in dicta *γδ* incedere aptam impellet directione *γδ*. Quod perinde ut in altero latere continuari potest in infinitum, prout exemplum propositum postulat.

Facile autem intelligi potest movendo circa *L* rectam *LM* motum machinae dari; eamque velut aperiri cum punctum fixum *α* elevatur seu cum recta *LαM* a situ perpendiculari accedit ad parallelum. Contra velut claudetur et regulae omnes parallelae inter se ad se invicem accident, cum punctum *α* deprimitur, seu cum recta *LαM* a situ parallelo redit ad perpendiculararem. Efficiendum ergo est ut regulae quae sese ducunt se⟨u⟩ propellunt cum aperitur machina, reducant cum clauditur atque adeo utrinque id contingere possint quod impellunt, libertate tamen aliqua ab eo latere quo non impellunt tunc cum non impellunt relicta, ut vides in regula *PQ* respectu regulae *QT*. Nam si *G l i s s a t o r i u m Q* (ita enim tam utilem machinae particulam appellare placet, cum latinam vocem non inveniam nisi quod probabile est, ipsam *glisser*, a latino quodam obsoleto derivatam teste glaciei vocabulo, cui Germani respondens habent, *glas*, vitro exprimendo) ab utroque in medio regulae *PQ* simul utrinque attingeretur; tunc angulo ipsius *PQ*. ad ipsam *CQ* magis ad rectum accidente, angustum nimis inter duo regulae *PQ* latera pro dicto glissatorio continendo spatum foret. Idem est in regula *LM*

1 consimiliter (1) flectetur circa punct (2) agi *L* 7f. in ... communi erg. *L* 8f. in ... puncto *W* erg. *L* 10 puncto ... communi erg. *L* 17 cum (1) *LMα* a situ parallelo accedit ad (2) punctum *M* elevatur seu cum (3) punctum *L* 19 cum (1) *L* velut deprimitur (2) punctum (a) *M* (b) *α* deprimitur *L* 22 impellunt (1) furcae cuiusdam specie, ut in horologiis oscillatoriis (2), libertate *L*

ipsas *PS. TV* ducente, ubi tamen peculiaris difficultas quod ut duae habeantur parallela ipsius regulae *LM* velut latera.

24₃. PARS TERTIA

Schediasmatis de constructore pars III.

Sumto quadam puncto μ fixo in recta $CL\mu$ et alio fixo ξ in recta $\alpha\xi Z$, ita ut $L\mu$ sit $\sqcap \alpha\xi$ regula $\mu\xi$ cum ipsa LM indefinite producta eique parallela velut altera ejus portio censeri poterit, et glissatoria, P, T , inter duas LM et $\mu\xi$ semper interjecta erunt, et dum aperitur machina ab LM , dum clauditur ab $\mu\xi$ impellentur. Tanta autem minima laterum Regulae distantia perpendicularis esse debet, quanta est longitudo glissatorii quod intercipitur, nam quando evenit ut regula ad glissatorium angulum faciat rectum, (:quemadmodum facit LM , cum machina prorsus clauditur quo casu LM intelligitur parallela ipsi CF . adeoque perpendicularis parallelis ipsius CL , et glissatoriis quae in ipsis labuntur:) glissatorium quod intercipitur distantiae perpendiculari coincidit. Fateor tamen si alia commodior claudendi ratio reperiatur, aut si clauso opus non sit, has regularum duplicitates satis incommadas rescindi posse. Re recte expensa credo solam regulae LM duplicitatem sufficere qua perpendicularares cum transversalibus sibi affixis reducentur, nam de reliquo eversa machina, ut $ABHC$ imum, $DEGF$ sumnum teneat, parallelae seu horizontales regulae QT . SM pondere ipso suo in locum priorem relabentur. Quia transversales PQ . TS . ipsis amplius non obstabunt quippe regula LM machinam claudente, restitutae. Superest ut explicemus qua ratione efficiatur, ut ipsa AN seu CY semper sit media proportione inter CL et OP . Quod post multa tentata nondum alia commodius ratione efficere possum, quam quae sequitur. In recta $LC\pi$ sumatur $C\pi \sqcap LC$. et producatur $FC\omega$ in ω . Ductae regulae duae $\pi\omega$, $R\omega$. angulos invicem perpetuo faciant rectos, quod fiet dum una in crenam alterius quodam glissatorio intrat; ita enim qui semel datus est angulus semper manet. Porro punctum C . semper, punctum π durante hujus quidem exempli motu fixum manet, at punctum R extremitas

9 perpendicularis erg. $L = 17$ ut (1) ABY (a) sit imum, (b) zenith (c) Nadir (2) $ABHC$ imum L
19 f. quippe (1) motu (2) regulae LM depressione elevatae (3) regula LM (a) | se nicht gestr. | (b)
machinam L

regulæ *RPS*. cum hac ipsa regula ab *LM* in *P*. impellente propulsa, progredietur, ac proinde et regula ωR cum regula *RPS*. seu cum puncto *R* progredietur, servata tamen semper anguli $R\omega\pi$ rectitudine. Sed unum praeterea desideratur ut punctum ω quo duae regulæ $\pi\omega$ et ωR , junguntur semper maneat in recta *FCω* continuata. Quod ita obtinebitur si acus quaedam sive fibula ex Glissatorii extremo prodiens in rimam rectae *Cω* intret, unde cum exire nequeat, proinde in ipsa recta ω perpetuo labetur, et glissatorium quoque sive angulus rectarum $\pi\omega$. *Rω*. Quod ut fieri possit, ipsumque triangulum rectangulum servatis puncto, *C*, et rectis *Cω* et *CLR* angulique $\pi\omega R$ rectitudine punctis vero *R* in recta *CLR*, ω in recta *Cω*, rectisque $\pi\omega$, *Rω* continue mutatis, omnes formas induere queat, necesse tantum erit regulam $\pi\omega$ mobilem esse circa punctum π velut centrum. Atque ita *Cω* semper erit media proportionalis inter *Cπ* et *CL*, et inter *CR* et *OP*. ponendo jam ex fibula ω quam in rima mobilem dixi angulo semirecto *CωY* descendere regulam indefinite productam ωY erit *CY* et *Cω*. adeoque *CY* media proportionalis quaesita, in cuius puncto *Y* perpendicularis rigida *YN*, ut supra dixi duo puncta *Y* et *N*. sibi in oppositis planis parallele sive e regione respondentia connectens, a dicta regula ωY continue ducetur sive propelletur, et cum ea alia regula *YZ* vel ei in altero plano respondens *AN* ipsi *LM*, ut supra explicui, semper parallela. Et ita quidem instrumenti hujus tradita constructio motusque intelligi potest, superest ut dicamus de ejus usu ad aequationum radices inveniendas. Quod tamen antequam faciam operae pretium erit instrumentum denuo majore cum exactitudine describere:

5


10

15


20

5 Am Rande: Pro glissatorio dicere possis in c re n a t u r a m .

1 impellente (1) per rectam *OP*. propulsa (2) propulsa *L* 3 desideratur | qvod explicare promisi erg. u. gestr. | ut *L* 14 perpendicularis rigida erg. *L* 14 dixi (1) utriqve piano parallelo perp (2) duo *L* 16 f. vel ... *AN* erg. *L*




[Fig. 9]




[Fig. 10]


[Figuren auf Bl. 15 v°]




[Fig. 11]




[Fig. 12]



[Fig. 13]



[Fig. 14]



[Fig. 15]

25. DISPOSITIONS ET COMPLEXIONS

[April – Juli 1672]

Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 XII 1 Bl. 45–47. 1 $\frac{1}{2}$ Bog. 2°. 2 S. auf Bl. 45 r° (= erster bis dritter Ansatz) u. Bl. 47 r° (= vierter Ansatz). Am Rand von Bl. 45 r° sowie auf Bl. 45 v° u. 46 r° befindet sich VII, 3 N. 3; Bl. 46 v° u. 47 v° sind leer. — Gedr.: LKK 2, 1976, S. 6–9. Cc 2, Nr. 519 A, B

Datierungsgründe: Das Stück befasst sich mit der Kombinatorik, wobei es inhaltlich an die *Dissertatio de arte combinatoria* (VI, 1 N. 8) aus dem Jahr 1666 anknüpft: Leibniz greift einige Begriffe jener Arbeit auf, übersetzt sie ins Französische und definiert sie kurz. Sprache und thematischer Ansatz verweisen das Stück also in die frühe Phase seiner Zeit in Paris, womit der *terminus post quem* Leibniz' Ankunft in Paris Ende März 1672 ist. Dass das Stück nicht später als Anfang 1673 entstanden ist, belegt die Symbolverwendung in dem auf demselben Träger niedergeschriebenen Stück VII, 3 N. 3, welches konkrete Beispiele zur gleichen Thematik liefert. In ihm finden sich als Gleichheitssymbole zum einen das moderne Gleichheitszeichen, welches Leibniz spätestens ab Mitte 1674 durch den stilisierten Waagebalken ersetzt; zum anderen verwendet er *f.* als Abkürzung für *facit*. Diese Notation gebraucht er jedoch nur bis Ende 1672 oder Anfang 1673. — Das Papier ist Pariser Provenienz. Sein Wasserzeichen lässt eine weitere Präzisierung der Datierung zu. Das gleiche Zeichen findet sich ansonsten nur noch bei dem Träger von VI, 3 N. 2₂, dem zweiten in einer Reihe von vier auf französisch verfassten Entwürfen zu physikalischen Fragen. Selbst wenn Leibniz den ersten Entwurf N. 2₁ recht bald nach seiner Ankunft in Paris geschrieben haben sollte, kann der zweite Entwurf kaum vor April 1672 entstanden sein. Und der auf diesen folgende dritte Entwurf N. 2₃ war offensichtlich fertiggestellt, bevor Leibniz von dem am 25. Juli 1672 im *Journal des scavans* veröffentlichten Brief von Huygens an Gallois Kenntnis genommen hatte, was wahrscheinlich ohne große Verzögerung geschehen ist. Dies spricht dafür, dass N. 2₂ im Zeitraum von April bis Juli 1672 verfasst worden ist. Wegen der seltenen Papiersorte wird für unser Stück das Gleiche angenommen.

10

15

20

25

[*Verworfener erster Ansatz*]

Definitions

Pour placer une chose avec une autre, il y a trois sortes de variation. Car ou on place une chose toujours avec une même chose, mais d'une maniere nouvelle; ou on place une chose tantost avec une tantost avec une autre.

30

Si on place une chose avec une même chose, mais d'une differe [*bricht ab*]

29 d'une (1) même (2) no (3) maniere *L* 30 tantost avec (1) l'une (2) une *L*

[*Verworfener zweiter Ansatz*]

Soit une chose donnée, ayant certaines parties, outre les quelles il ne faut pas la soubsdiviser [comme sont les unitez dans le nombre, ou les atomes dans un Corps, ou les personnes d'une assemblée, les quelles ne souffriroient pas d'estre coupées en pieces];

5 trouver tous les changemens imaginables dans cette chose donnée qu'elle peut fournir de soy même, sans luy adjouster rien de nouveau. [Car s'il seroit permis d'adjouster une nouvelle chose, ou diviser les parties plus outre ou d'une autre maniere, les changemens iroient à l'infini, et il n'y auroit point de probleme pour les conter. Par exemple dix personnes estant donnez, on peut trouver [*bricht ab*]

10

[*Dritter Ansatz*]

Certaines choses estant données, trouver en nombres toutes les dispositions imaginables.

Les dispositions sont les varietez de penser à certaines choses données ou de les placer dans l'esprit.

15 Par exemple, dix personnes estant données, vous pouvez penser ou à quelques unes ensemble; ou à toutes ensemble; ou à nulles ensemble, c'est à dire à une apres l'autre.

Si vous prenez quelques unes ensemble, tantost celles cy et tantost celles là, cela s'appelle Complexion.

2 donnée, (1) divisée (2) ayant $L = 3$ f. [comme ... pieces.] erg. $L = 5$ donnée (1) sans la qvelle (2) qv'elle $L = 7$ parties (1) d'une (a) autre (b) autre maniere ou plus outre, (2) plus $L = 11$ toutes les (1) conjunctures imaginables (2) dispositions $L = 13$ sont (1) les varietez avec les qvelles plusieurs choses peuvent estre placées dans l'esprit ou dans la pensée, (2) conjunctures de plusieurs choses (a) Par exemple (b) Dix personnes peuvent estre consideree de plusieurs manieres (c) La (3) les varietez $L = 15$ penser ou à (1) toutes ensemble, ou à plus (2) qvelqves L

3–6 [comme ... [Car: Die eckigen Klammern in diesem Ansatz stammen von Leibniz selbst.
18 Complexion: Vgl. LEIBNIZ, *Dissertatio de arte combinatoria*, 1666, prooemium §§ 7–12 S. 4 (VI, 1 N. 8, S. 172 f.).

[*Vierter Ansatz*]

Probleme General

Certaines choses d'un certain nombre connu estant données, trouver en nombres toutes les dispositions imaginables.

Les dispositions sont les varietez de penser à certaines choses, ou de les placer dans l'esprit. Par Exemple, dix personnes estant données, vous pouvez penser ou à quelques unes ensemble, ou à toutes ensemble, ou à nulles ensemble, c'est à dire à l'une apres l'autre. Car pour considerer plusieurs particularitez dans elles, ou pour considerer le tout rangé en quarré ou en polygone ou en autre figure, cela n'appartient pas à nostre tractation, par ce que nous voulons considerer les places qu'on leur donne dans l'esprit en les rapportant pas à l'espace, mais au temps, car les pensees dans l'esprit, n'ont point de difference des places, mais seulement du temps.

Si vous prenez donc quelques unes ensemble tantost celles cy, tantost celles là, et tantost d'un grand, tantost d'un petit nombre, cela s'appelle *Complexion*, dont la variation consiste dans la matiere donnée même, sans avoir égard à la forme. Par exemple dix estans donnez, *a. b. c. d. e. f. g. h. i. l.* Vous en pouvez prendre, tantost cinq ensemble, tantost seulement quatre ensemble; et si vous prenez cinq ensemble, vous pouvez prendre ou ceux cinq cy, *a. b. c. d. e.* ou ceux cinq là, *b. c. d. e. f.* etc.

Je nomme le Nombre de ceux qu'on prend, l' *Exponent de la Complexion*, par exemple 5 dans l'exemple precedent.

Et selon ce nombre ou exponent, je nomme la *Complexion* tantost une *Combinaison*, ou *Com2naison*, tantost une *Con3naison* ou *Conternaison*, tantost

3 d'un ... connu erg. L 9 rangé (1) ou (2) en L 10 considerer (1) pas (2) les L 10 dans l'esprit erg. L 11 temps, (1) par ce qve les d (2) car L 17 ensemble, (1) et en prennant cinq, (2) vous L 18 f. etc. (1) Le Nombre de ceux qv'on prend, je nomme (2) Je L

22 Conternaison: Die Bezeichnungen *conternatio* für eine ungeordnete Stichprobe von drei Elementen aus einer gegebenen Grundmenge und analog *conquaternatio* finden sich schon bei M. MERSENNE, *Harmonicorum libri*, 1635, etwa auf S. 135. Die Schreibweisen *com2natio*, *con3natio* und *con4natio* gebraucht Leibniz bereits in der *Dissertatio*, prooemium §§ 11f. S. 4 (VI 1, N. 8 S. 172). Er verwendet sie auch in einer Marginalie in seinem Handexemplar von Bl. PASCAL, *Traité du triangle arithmétique*, 1665 [Marg.] (PO III S. 446). Dort notiert er auf der vor S. 1 eingefügten Ausklapptafel, welche das arithmetische Dreieck darstellt, Formeln zur Berechnung der Anzahl der verschiedenen *complexions* — für *con3naciones* etwa $\frac{y, y-1, y-2}{1, 2, 3}$.

une *C o n 4 n a i s o n*, etc. bien qu'ordinairement le mot de Combinaison se prend pour la complexion en general.

Le Nombre de toutes les com2naisons ou con3naisons etc. imaginables, s'appelle: Le Nombre des complexions d'un exponent donné. Par exemple 5 toutes les con3naisons de 10 choses données, sont 120 et toutes les con3naisons de 4 choses, *a. b. c. d.* sont 4 comme *a. b. c.* et *b. c. d.* et *a. b. d.* et *a. c. d.*

Le nombre de toutes les complexions de tous les exponens ensemble, s'appelle simplement, le nombre des Complexions. Par exemple le nombre de toutes les Complexions de 4 est 15, savoir 4 1 n i t e z , quand chaque chose est mise 10 à part (:*a. b. c. d.*:) 6 Com2naisons (:*ab. bc. cd. ac. ad. bd.*:) 4 Con3naisons (:*abc. bcd. abd. acd.*:) 1 Con4naison (:*abcd* car la varieté de l'ordre *acbd. adbc.* etc. ne change pas la matiere ou complexion, mais seulement la forme:). Et ainsi en tout 15 .

1 qv'ordinairement le (1) terme (2) mot *L* 3 Nombre (1) des Com2n (2) de toutes les com2naisons ou (a) con2naisons (b) con3naisons | etc. *erg.* | (aa) imaginaires (bb) imaginables *L*
5 de (1) dix (2) 10 *L* 5f. et toutes les |con3nations ändert Hrsg.| de ... sont 4 *erg.* *L* 8–12 Par exemple ... tout 15 . *erg.* *L*

12 en tout 15 : Die Möglichkeit, gar kein Element aus der Grundgesamtheit auszuwählen, zählt Leibniz hierbei wie bereits in der *Dissertatio*, prooemium §§ 7 u. 12 S. 4 (VI 1, N. 8 S. 172 f.) nicht mit, bedenkt sie aber sehr wohl; vgl. ebd., probl. I Tab. § S. 7 (S. 174).

26. CONSTRUCTOR


Dezember 1674

Überlieferung: L Konzept: LH 35 III A 20 Bl. 1–5. Bl. 1–4 zwei Bog. 2° . Bl. 5 ein Bl. 2° , aus dem zwei dreieckige und ein rechteckiger Abschnitt entfernt wurden. 9 S. Textfolge Bl. 5 v^o, Bl. 1–4. Bl. 5 r^o leer.

5
Cc 2, Nr. 815, 816

Inveni mense X^{bri} 1674. Parisiis
Godofredus Guilielmus Leibnitus

C o n s t r u c t o r
Instrumentum Algebraicum
pro inveniendis omnium Aequationum Radicibus,
geometrice pariter, et in numeris quantumlibet exactis
sine calculo



[Fig. 1]

8 (1) Gottfredus (2) Godofredus L

14 Fig. 1: Die Figur zeigt einen Ausschnitt aus LH 35 III A 20 Bl. 5 v^o. Bearbeiteter Ausschnitt des Digitalisats <http://digitale-sammlungen.gwlb.de/resolve?id=00068233> der Handschrift LH 35 III A 20 der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek (GWLB). Das Digitalisat wurde von der GWLB unter einer CC0 1.0 Public Domain Dedication Lizenz zur Verfügung gestellt.

Descriptio C o n s t r u c t o r i s sive Instrumenti Algebraici

In plano hujus paginae figurae 1 rectangulum paginae parallelum $ABCD$ designatum intelligatur et super rectis AB , DC , alia perpendiculariter erecta plana, ABE , et DCF , sibi proinde parallela. Punctum A sumnum, B imum, E dextrum, C sinistrum.

Ex punto A ducatur dextrorum simul ac deorsum recta $AGHIKE$. secans rectas indefinite dextrorum productas ipsi $ALMNOB$ perpendicularares LG , MH , NI , OK . Sint indefinite deorsum productae GP , HQ , IR perpendiculariter secantes ipsas NPI , OQK , BRE ; junctaeque transversales GM , HP , IQ , KR indefinite deorsum pariter et sinistrorum productae. Ipsae AL , LM , MN , NO , OB sumtae prout e re erit. Intelligantur jam rectae quidem AB et LG esse lineae rigidae impraesentiarum immobiles, sed MH , NI , OK , BE , sint regulae mobiles sursum ac deorsum in ipsa AB , et GM , HP , IQ , KR , dextrorum et sinistrorum in rectis GL , HM , IN , KO , EB , ita tamen ut durante motu tam priores quam posteriores, regulae vestigiis suis parallelae moveantur sive eosdem ad rectas ad quas moventur angulos servent. Quod eminentiis quibusdam oblongis rectilineis, crenae cuidam eique in qua moventur, rectae congruentibus quas in crenaturas, nova sed necessaria voce appellare possis praestari constat.

Qualis increnatura (fig. 2) est $L(L)$ qua regula GL movetur super AB in crena (L) B , eodem semper angulo GLA , sive is rectus sive obliquus sit, servato. Quod si increnatura velut rotulis quibusdam circa sua centra mobilibus imposita intelligatur, ne crenam in omnibus sui[s] punctis tangat; facilior erit motus.

1 Descriptio . . . Algebraici erg. L 2 paginae (1) esto recta AB (2) figurae 1 rectangulum | paginae parallelum erg. | $ABCD$ L 3 intelligatur | cuius sumnum AD , imum BC erg. u. gestr. | et super rectis | dextra erg. u. gestr. | AB , | sinistra erg. u. gestr. | DC , alia (1) erecta plana (2) perpendiculariter L 4 parallela. (1) Circa punctum A velut centrum (a) in (b) mobilis sit in ipso plano ABE , recta AE secans rectam G (2) Punctum A sumnum, B imum, E dextrum B sinistrum (3) Punctum L 7 indefinite | deorsum erg. | productae GP , HQ , IR | perpendiculariter erg. | secantes L 8 f. junctaeque | transversales erg. | GM , HP , IQ , KR | indefinite . . . productae erg. | . Ipsae L 10 et LG | esse . . . impraesentiarum erg. | immobiles L 11 ipsa AB , (1) servato semper angulo qvem (2) et L 14 f. oblongis | rectilineis erg. |, crenae | cuidam erg. | eique L 17 (fig. 2) erg. L 17 in crena (L) B erg. L 18 is (1) perpendicularis (2) rectus L 19 circa . . . mobilibus erg. L




fig. 2

Ut autem aliquod motus in caetera omnia propagati principium intelligamus, cogitetur regula AE , mobilis circa B , in eodem semper plano ABE . quae elevata a situ inclinato ad minus inclinatum sive horizontali propriorem, aperiet Machinam, contrario vero motu, claudet. Quod ita intelligendum est[:] Dum AE elevabitur puncta G, H, I, K, L, M, N, O , quibus LG, MH, NI, OK , secat, longius distabunt sive recedent, ab L, M, N, O . Intelligentur jam regulae transversales GM, HP, IQ, KR , intersectionis puncta sequi, et rectae AE motu per parallelas LG, MH, NI, OK , eodem semper angulo dextrorsum duci, aut etiam dum AE rursus deprimetur sinistrorum reduci: Eodem modo, motu transversalium GM, HP, IQ, KR , per parallelas sustinentes G, H, I, K , mutabuntur M, P, Q, R puncta intersectionum cum aliis parallelis uno gradu semper inferioribus, MH, NPI, OQK, BRE . Pone jam effici, ut idem sit semper punctum intersectionis M, P, Q, R in parallela, MH, NPI, OQK, BRE , aliud vero atque aliud transversalis, GM, HP, IQ, KR punctum ei respondeat (:quod ut mox dicam, facile effici potest:) necesse erit ipsas MH etc. mutatione punctorum intersectionis M etc. in transversalibus GM etc. sursum deorsumque secundum longitudinem ipsius AB duci ac reduci quod facile intelligi potest ex fig. 3.

5

10

15

8 per (1) GM , (2) parallelas L 8 dextrorsum erg. L 9 deprimetur | sinistrorum erg. | reduci:
 (1) Regulas autem transversales parallelis occurrentes, eas per (2) Eodem L 10 transversalium (1)
 GM, HI, OK , per parallelas sustinentes (2) $GM L$ 11 M, P, Q, R erg. L 12 f. intersectionis (1)
 in recta (2) M, P, Q, R L 15 MH etc. (1) motu (2) mutatione L




fig. 3

Pone enim in MH , ipsam HP ; vestigiis suis parallelam incedere dextrorum ope
increnaturae H . et NP ipsi MH parallelam esse. Manente puncto fixo P . in recta

1 Neben fig. 3: NB.

2 dextrorum erg. L

NP necesse est ipsam *NP* descendere ad (*N*)(*P*). Nam si mansisset ubi erat, a recta *HP* in (*H*)(*P*) promota in puncto *P* non amplius searetur. Ut autem recta *HP* rectam *NP* non nisi in *P*. secare possit, duobus obicibus ex ipsa *NP*, perpendiculariter ad planum *NMH* exeuntibus effici potest, inter quos ipsa *HP* inclusa libere ludit, prorsus ut in exiguis naviculis remi inter duos obices manu agitantur, ita utcunque recta *HP* inter hos duos obices sursum deorsumque agatur nunquam tamen a puncto *P* inter eos intercepto dimovebitur. Eodem modo efficitur ut recta *AE* translata in *A(E)* punctum *H* et cum eo recta *HP* transferatur in (*H*) vel (*H*)*P*. Neque vero aliud quicquam hoc loco postulavimus. Ut autem motus eo facilior pariter et exactior sit; regulae ipsae inter obices interceptae aciebus suis obicem alterutrum motui scilicet obstantem perpetuo prement; obex autem quilibet annulo sive tubulo sive si placet cylindro circa axem in quo fixus est obex, mobili, indutus erit ut fricanti regulae facilius cedat. Alterutrum autem, aciem vel cylindrum ex chalybe durato esse fabricatum rationis est, altero ex aere fuso; quo minus motuum reciprocationibus alterantur. Apparet quoque, ut ad f i g. 1. redeamus, ab obice utrobique regulam motricem includente effici, ut quemadmodum elevatione ipsius *AE* aperitur machina, ita ejus depressione rursus claudatur.

Quod si quis veretur, ne vacillationibus regulae motricis intra obices punctum intersectionis velut *H*, aut *P*, instabile reddatur; is consideret quantacunque sit latitudo vel libertas regulae intra obices ludentis; punctum tamen intersectionis unum tantum censeri, verbi gratia quo acies regulae cylindrum obici circumdataut ut mox dicam annum quendam obicibus interjectum tangit; quod semper durante motu, eodem in loco, aut aequipollente evenit. Fateor punctum contactus habere latitudinem quandam, et repetitis contactibus; una scilicet regula aliam ducente, latius errorem propagari; sed fieri tamen arte potest, ut posterior error priorem non augeat, sed quodammodo compenset; certa semper lege, quamdiu acies aut cylindros tritu non diminutos ponimus: cum etiam ipsa diminutio temporis tractu facta quae tamen ita subito non sentietur. Supra remedium non sit. At inquies punctum contactus non esse idem in reducendo quod in ducendo, quia oppositus tunc obex premitur: sed hoc nihil turbat; quia in qua operatione ductuum ratio habetur, in ea reductuum non habetur. Effici tamen etiam potest, id-

10 suis (1) chalybe durato (2) ferratis (3) ex aere in obices perpetuo prement (4) obicem *L*
 13 durato (1) factum, alterum (2) esse *L* 19 intersectionis (1) illud demum (2) unum *L* 20 f. aut
 ... interjectum erg. *L* 22 aeqvipollente (1) contingit; et punctum contactus physic (2) evenit *L*
 25 cylindros (1) nondum tritu consumi (2) tritu *L* 29–166,1 habetur. (1) Fateor denique (2) Ut
 increnaturae in crenis non vacillent (3) Effici | tamen erg. | etiam potest, | idqve malim, erg. | ut *L*

que malim, ut regula obicibus intercepta sit instar prismatis Triangularis trium acierum, quarum duobus obices oppositos; una annulum quendam in P nonnihil incisum et circa centrum suum in rectave axem NI mobilem tangat, ita punctum P , semper erit idem tam in ducendo quam in reducendo praesertim cum ipsa HP , durante operatione eundem semper faciat angulum ad ipsam NI , adeoque ad incisuram in qua est annulus P , quod si pro alia operatione mutetur angulus HPN . Nihil prohibet cochlea exigua etiam annuli P inclinationem mutari, ut scilicet ad axem annuli, angulus rectae HP semper sit rectus. Idem in obicibus quoque locum habet ut in eosdem semper circelloz cylindris eorum incisos acies intrent. Facile autem cavebitur ut mutatio inclinationis clausa tantum machina fieri possit, durante motu non possit. Clusa autem machina sponte sua nulla peculiari manuum opera mutatam ipsius HP inclinationem consequetur laxato tunc retinaculo quodam, quod alias durante prius motu obstabat inclinationis mutationi.




fig. 4

3 in ... NI erg. $L = 8$ rectus. (1) Innumera alia ab industrio artifice pro re nata (a) excogitari possent (b) excogitabuntur, ut appareat qvo usqve humana diligentia in elaborando tantae utilitatis instrumento | (aa) proficere posset (bb) profici liceat erg. |, qvo totius pene (aaa) Geometriam (bbb) Algebrae et Geometriae rectilineae eius certe (aaaa) cuius (bbbb) qvam Vieta et Cartesius ad analysin reduxere; problemata solvuntur. et omnium curvarum a Cartesio in classes reductarum fructus | hactenus contemplationem non egressus erg. | continetur. Exempli praeterea causa, ut impediatur regularum (2) Idem L

Praeterea ut increnaturarum aut acierum, quibus in crenis aut incisuris moventur regulae, impediatur vacillatio; faciendum est, ut eadem acies diversis incisuris sic satis invicem remotis, at perfecte parallelis et similibus, recipiatur. Nec refert quod ad exactitudinem summam omnia necesse est constructa esse, unde difficilis erit motus, nam cum celeritas non postuletur; magna profecto impedimenta necesse est quae vectis longitudine et si velis agentis vectem cochleae tarditate non vincantur. Cumque necesse sit aliquando puncta quaedam diversarum regularum, dum praeparetur machina ad novam operationem, in eadem esse recta imaginaria, hoc exakte praestari poterit quodam dioptriae genere si perforata in punctis quaesitis utraque regula, lux per omnia puncta radiet; aut videri possit. In elaborandis autem machinae partibus perspicilia adhibere artificem rationis erit; cum sit instrumentum hoc summae exactitudinis specimen futurum.

Innumera alia ab industrio artifice pro re nata excogitabuntur ut appareat quousque humana diligentia in elaborando tantae utilitatis instrumento proficere liceat. Quo omnes algebrae aequationes resolvuntur, et Geometriae rectilineae, ejus certe quam Vieta et Cartesius ad analysis reduxere, problemata solvuntur; et curvarum omnium a Cartesio in classes distributarum fructus hactenus contemplationem non egressus continetur. Sed haec postea exponam. Nunc absolvenda Machinae constructio est motusque, neque enim constructio sine motu commode explicari potest. Nimirum redendum ad fig. 1 elevato primo mobili AE motu circa centrum A regula transversalis GM , procedit in ipsa LG directione seu dextrorum, quod fieri non potest, quin parallela (horizonti) MH moveatur in recta ANB directioni NB seu deorsum. Interea temporis transversalis HP , ob eandem ipsius AE elevationem movetur in MH sinistrorum; quare parallela NPI cui HP occurrit in P , et ibi inter duos obices modo explicato intercipitur descendet. Eodem modo eodem tempore; transversales, IQ , KR , et si quae aliae sequuntur movebuntur sinistrorum, parallelae OQK , BRE etc. deorsum, quod ludi genus continuabitur, quousque postulabit necessitas, et salva exactitudine sufficient vires.

2 vacillatio; (1) effici potest, ut eadem acies diversis locis simul (2) faciendum L 5 qvae (1) vecte adhibito (2) vectis L 8 poterit (1) adhibitis dioptris (2) qvodam L 10 partibus (1) microscopium aut (a) certe (b) certe (2) perspicilia adhibere (a) intererit (b) artificem L 12 nata (1) excogitari possunt (2) excogitabuntur L 18 f. Nimirum | redendum ad fig. 1. erg. | elevato (1) AE, circa centrum (a) E (b) A, movetur GM, directione sinistrorum. Ergo MH deorsum; eodem tempore ob elevatam AE, movetur HP sinistrorum; GM (2) reg (3) primo L 20 ipsa (1) GM, directione | LG nicht gestr. | seu | sinistrorum nicht gestr. | (2) LG directione L 20 parallela (horizonti) erg. L 26 qvousqve (1) sufficient vires, et (2) postulabit L

Hactenus hujus plani nempe ABE explicatae partes, explicandae nunc et alterius DCF , ipsi paralleli et similiter positi, partes an plerisque similes. Praeter ea scilicet quae admonebo. Nimirum DS regula immobilis sit ipsi CF , vel BE parallela, et puncta A . D . S . sint in eadem recta. Efficiatur autem arte quadam, ut dum punctum G procedit 5 sinistrorum vel recedit dextrorum, ob motum elevationis et depressionis ipsius AE circa centrum A ; punctum S , mobile procedat in recta DS in eundem sensum, directione scilicet DS , dextrorum, (: etsi in pagina sive figura id sit sinistrorum, quoniam utraque plana ABE , DCF , non in eodem plano jacentia, ut illic repraesentantur, sed parallele erecta censenda sunt :) vel recedat, directione SD , sinistrorum; ea tantum lege, ut DS . 10 sit semper media proportione inter AL , et LG . et regula quaedam SF , cum punto S procedens, et tamen circa centrum S . mobilis, sit semper ipsi AE parallela. Quae duo qua ratione obtineri possint, postea explicabo. Nunc eo supposito intelligatur transversalis ST , cum punto S procedens propellere sursum deorsumque in recta DC . parallelam (horizonti) TV ; et motu ipsius SF in ipsa TV , aliam duci transversalem VX a qua rursus 15 parallelam (Y) Z in ipsa DC . sursum deorsumque ducatur. Idem intellige de transversalibus $Z\alpha$, $\beta\gamma$, $\delta\theta$, quae in parallelis (Y) Z , $\lambda\beta$, $\mu\delta$, ab ipsius SC motu huc illuc ducuntur, eodem angulo servato; et parallelas, (unaquaeque ei in qua dicitur inferiorem,) $\lambda\alpha\beta$, $\mu\gamma\delta$, $C\theta F$ in recta DC . sursum deorsumque agunt. Puncta autem T . X . α . γ . θ . sunt 20 in perpendicularium DTC , SX , $V\alpha$, $Z\gamma$, $\beta\theta$ (quae omnes excepta prima imaginariae sunt, []) et parallelarum, quae omnes reales rigidae sunt VT , $ZX(Y)$, $\beta\alpha\lambda$, $\delta\gamma\mu$, $F\theta C$, intersectionibus.


Superest ut explicetur transitus de plano in planum, seu modus quo efficitur, ut DS sit media proportionalis inter AL et LG . et ut SF perpetuo maneat parallela ipsi AE . Porro recta AL durante motu manet situ et magnitudine eadem, at LG perpetuo

2 ipsi ... partes erg. L 2 similes. (1) Nempe supponendum tantum arte qvadam (:postea explicanda:) effici, (a) ut dum LG decresci (b) ipsa LG crescit decrescive immobili, (aa) ob plani praecedentis ipsius AE (bb) ob ap (cc) ob motum elevationis et depressionis ipsius AE , crescente aut decrescente etiam DS crescere ea tamen lege, ut (2) praeter L 3 regula immobilis erg. L 4 qvadam | (:postea explicanda:) gestr. | ut L 6 in recta DS erg. L 7 scilicet DS (1) sinistrorum (2) dextrorum L 7 sit (1) sinistrorum (2) dextrorum (3) sinistrorum L 9 directione SD , (1) dextrorum (2) sinistrorum L 10 et LG . (1) id qva ratione fieri possit, postea explicabo, nunc eo supposito (2) et L 13 sursum deorsumque erg. L 14 (horizonti) erg. L 16 f. ducuntur, (1) serv (2) suis semper vestigiis parallelae (3) eodem L 18 recta DC . (1) propellunt (2) sursum L 19 perpendicularium | imaginarium erg. u. gestr. | DTC L 20 omnes (1) rigidae seu solidae sunt, (2) reales L 24 situ et magnitudine erg. L

mutatur magnitudine, manet situ; idemque erit de recta *DS*, caeterae situm pariter et magnitudinem mutant. Jam parallelismum ipsarum *AE*, *SF* perpetuum, ita obtinebimus; ponatur *Y* in recta *AY* ipsi *BE* parallela punctum *Y* ita procedere, ut recta *AY* semper aequetur ipsi *DS*, seu ut sit media proportione inter *AL* et *LG*. quod modo postea explicando, obtinebimus. Eo autem supposito intelligatur alicubi in recta *AE*, punctum quoddam fixum ξ , unde dextrorum prodeat recta indefinita, parallela ipsi *BE*, inque ea sumatur $\xi\pi$ aequalis ipsi *AY* jungantur puncta *Y* et π regula solida *Y* π . Patet manente *AY*, utcunque elevetur aut inclinetur *AE*, latera opposita rhomboeidis *A* $\xi\pi$ *Y*. manere parallela; quemadmodum instrumenti quo vulgo ad parallelas ducendas utuntur, quod ab officio rectissime parallelogrammum appelles. Hic vero illud praeterea addendum est, ut latus *Y* π in rectis indefinitis *AY*, $\xi\pi$ huc illuc incedere possit. Ex punctis *Y*, et π , exibunt duae lineae rigidae, *YS*, $\pi\omega$ duo plana *ABE*, *DCF* perpendiculariter jungentes, et regulam *Y* π regulae *S* ω connectentes, unde *S* ω vel *SF*, ipsi *Y* π , vel *AE* perpetuo parallela incedet, quod faciendum erat.

Ut autem recta *AY* semper media sit proportionalis inter rectam constantem *AL*, et continue variatam *LG* paulo difficilius est: quod tamen ni fallor ita consequemur; inspiciatur fig. 1 aut, quae hanc ejus partem clarius explicat, figura 5.

3 ponatur (1) *AY* n (2) ipsa *AY* aequalis perpetuo ipsi *DS* |. Nempe erg. | puncto *Y* perpetuo incidente ex adverso (3) *Y* in *L* 3 ut | recta *AY* erg. | semper *L* 5 recta (1) *AY* punctum quoddam (2) *AE* *L* 6 unde (1) recta prodeat indefinita, aequalis (a) inque ea ponatur parallela ipsi *AY*, (b) in qua sumatur horizonti (2) dextrorum *L* 8 opposita erg. *L* 11 possit (1) quoniam rectam *AY* continue magnitudinem mutare manifestum est, quoniam et *LG*. eam (2) | ob mutationem ipsius *LG*. cum sit *nicht gestr.* | *AY* media propo (3) Ex *L* 12 duae (1) perpendicularares (2) lineae rigidae, (a) ad planum *Y* ω (b) *YS* *L* 14 parallela (1) | erit *nicht gestr.* | (2) incedet *L* 17 inspiciatur ... explicat, | figura am ändert Hrsg. | 5 erg. *L*



[Fig. 5]

Punctum G . motu elevationis aut depressionis rectae AE vel $A\xi$ circa A ducat secum perpendicularem $G\varphi$. quae rursus in recta $AY\varphi$ ducat ipsam $\varphi\psi$, angulo $\psi\varphi A$ constante semirecto, quae rectam $LA\psi$ secabit in ψ . Ergo $A\psi$, aequabitur ipsi $A\varphi$ vel LG . Recta $\varphi\psi$ in eodem puncto ψ , secet aliam rectam $Y\psi$ quae recta in radio LY huc illuc moveri possit, servato angulo, constante recto ψYL . Radius autem LY mobilis esto circa centrum L . Ponendo jam rectam $\varphi\psi$ duobus obicibus in ipsa $Y\psi$ plantatis inclusam esse, ut punctum intersectionis ψ in recta $Y\psi$ semper constans esse possit; sequetur rectam $Y\psi$ ab ipsa $\varphi\psi$ duci. Quod si ergo radius LY circa centrum Y mobilis non esset, moveretur ipsa $Y\psi$ secundum longitudinem ipsius LY , ob motum ipsius $\varphi\psi$, sed quoniam desideramus praeterea ut punctum Y semper maneat in eadem recta $A\varphi$; quod fibula quadam ipsi $Y\psi$ infixa, et in rimam ipsius $A\varphi$ intrante, inque ea huc illuc mobili efficietur: ideo ut

11 $A\varphi$; (1) ideo ut triangulum rectangulum ψYL . omnes formas induere possit (2) qvod L

Triangulum rectangulum ψYL omnes formas induere possit, necesse erit LY mobilem esse circa L . Erit ergo AY semper media proportionalis inter AL et $A\psi$ seu inter AL et LG utcunque varietur punctum G . Quod faciendum erat. Unde jam antedicta consequuntur.

Explicata est constructio Instrumenti Algebraici, ut appareret, ex quibus partibus compositum sit, et qua ratione partium motus alter alterum regat. Nunc superest, ut modum quoque tradamus utendi Instrumento ad Aequationum radices Geometrice, in lineis, et quod hinc sequitur Mechanice in numeris quantumlibet vero propinquis, inveniendas. Constat ex iis quae Vieta in primis et Cartesius, tradidere, omne Problema (ordinarium, rectilineum) determinatum, reduci posse ad aequationem in qua una tantum incognita supersit; secundum quam ordinata aequatio eo usque assurgere censembitur quo usque maxima incognitae dimensio excrevit. Praeterea tradita est a Cartesio methodus efficiendi, ut omnia aequationis loca sint repleta, et ut omnes aequationis radices sint verae, ut ille loquitur, id est affirmativa: quo facto, magno commodo nostro, feliciter evenit, ut signa + et - in aequatione sese alternis sequantur, quod quam sit instituto nostro necessarium mox apparebit. Sumamus in exemplum aequationem ex decem terminis compositam, sive noni gradus, (:raro enim altius assurgetur:) quae ad radices affirmativas praeparata, atque ordinata, ita stabit:

$$y^9 - by^8 + acy^7 - a^2dy^6 + a^3ey^5 - a^4fy^4 + a^5gy^3 - a^6hy^2 + a^7ly - a^8m \sqcap 0$$

et transponendo, ut signa negativa amoveantur:

$$\odot \quad a^8m + a^6hy^2 + a^4fy^4 + a^2dy^6 + by^8 \sqcap a^7ly + a^5gy^3 + a^3ey^5 + acy^7 + y^9$$

Ubi patet duas haberi summas sive formulas aequales inter se, alteram omnium terminorum exponentium parium, 0. 2. 4. 6. 8. alteram imparium, 1. 3. 5. 7. 9. Nec vero necesse est terminum summum, hoc loco y^9 purum esse, nullaque quantitate cognita affectum: cum contra in nostro sit arbitrio purum reddere quemlibet, posito enim a esse unitatem, et omnia dividi per m , fiet aequatio:

$$\mathbb{D} \quad 1 + \frac{h}{m}y^2 + \frac{f}{m}y^4 + \frac{d}{m}y^6 + \frac{b}{m}y^8 \sqcap \frac{l}{m}y + \frac{g}{m}y^3 + \frac{e}{m}y^5 + \frac{c}{m}y^7 + \frac{1}{m}y^9$$

1 $\psi YI L$ ändert Hrsg. 5 regat. (1) nunc, cuius causa totum hoc negotium susceptum est, usum eius in Algebra, et qvod hinc seqvitur in Geometria imo et in Mechanicis, dicemus. su (2) nunc superest, (a) ut modum utendi (aa) in resolvendis (bb) ad resolvendas Aeqvationes adhibendi (b) ut L 6 ad (1) resolvendas (2) inveniendas (3) Aeqvationum L 7 Mechanice erg. L 12 ut ... et ut erg. L 14 f. qvod ... apparebit erg. L

8 tradidere: Vgl. Fr. VIÈTE, *Opera mathematica*, 1646 (VO) und R. DESCARTES, *Geometria*, 1659 (DGS I S. 1–118). 11 tradita: a. a. O., S. 70–75.

Illud quoque constat pro Unitate assumi posse quamlibet quantitatem datam, prout commoditas operationis exigere videbitur.

His ita positis, ajo Aequationem \diamond in machina ita perfecte repraesentari, ut satis appareat ipsam rerum naturam, ad hoc construendi genus invitare, subsidiis dudum velut 5 consulto praeparatis, ut facilius exitum reperiret. Nam durante motu, quomodo cunque linearum magnitudo varietur, attamen AL appellata 1, et DS appellata y , sive LG , y^2 semper verum erit ab uno latere esse

$$\left\{ \begin{array}{l} AL \sqcap 1 \quad LM \sqcap \frac{h}{m}y^2 \quad MN \sqcap \frac{f}{m}y^4 \quad NO \sqcap \frac{d}{m}y^6 \quad OB \sqcap \frac{b}{m}y^8 \\ \text{ab altero latere vero} \\ DT \sqcap \frac{l}{m}y \quad T(Y) \sqcap \frac{g}{m}y^3 \quad (Y)\lambda \sqcap \frac{e}{m}y^5 \quad \lambda\mu \sqcap \frac{c}{m}y^7 \quad \mu C \sqcap \frac{1}{m}y^9 \end{array} \right.$$

Quod si ergo durante motu aliquando evenit, ut $DT + T(Y) + (Y)\lambda + \lambda\mu + \mu C$, id est DC , fiat aequalis ipsi $AL + LM + MN + NO + OB$, id est AB , sive ut punctum C plani unius e regione respondeat puncto B plani alterius, id est ut recta imaginaria BC sit utriusque plano perpendicularis, quod in media operatione, etiam machina non 15 detecta, ope styli cuiusdam impingentis, facile sentiri potest; tunc manifestum est, etiam $1 + \frac{h}{m}y^2 + \frac{f}{m}y^4 + \frac{d}{m}y^6 + \frac{b}{m}y^8$ aequari ipsi $\frac{l}{m}y + \frac{g}{m}y^3 + \frac{e}{m}y^5 + \frac{c}{m}y^7 + \frac{1}{m}y^9$ ac proinde si machina in eo statu sistatur, quae tunc fuerit DS sive y , eam fore quaesitam, cum aequationi propositae satisfaciat.

Quod si Aequatio \odot commodior videatur ad usum, quam aequatio \diamond , ne scilicet 20 omnia per m dividere necesse sit; aut etiam si alium quemlibet terminum potius quam ultimum purum reddere velimus, id factu facillimum erit, si modo tunc postuletur, ut punctum C respondeat ex adverso non ipsi puncto B , sed puncto ω , sumta recta $B\omega$ tali, ut sit differentia inter terminum cognitum sive ultimum, et unitatem; sumta inquam recta $B\omega$ a B versus A , cum unitas est major termino ultimo, aut in contrarias partes, 25 producta AB ultra B , cum est minor. Quod, si ad aequationem \odot . applicetur, posito a

1 quantitatem datam *erg. L* 4 appareat (1), vix aliq (2) ipsam *L* 4 subsidiis (1) in eam rem (2) dudum *L* 5 reperiret. (1) Nam si (a) modo ipsi AB (fig. 1) adjicias rectam (aa) $a - m$ (bb) $B\omega$, cuius valor sit $a - m$ (b) modo in recta AB (fig. 1) producta si opus est, sumas rectam $B\omega$, cuius valor sit $a - m$, directione (2) nam AL valebit (3) Nam L 6 $AL \dots y^2$ *erg. L* 7 erit (1) Nam ab uno latere AL valebit 1. $LM \sqcap$ (2) ab L 13 f. id ... perpendicularis *erg. L*

esse unitatem, sive 1, erit terminus ultimus sive cognitus, m . cumque necesse sit $AL +$ vel
 $-B\omega$ aequari termino cognito m , ut scilicet caeteris rectis, LM , MN etc. reliquos terminos repraesentantibus, tota aequationis \odot portio sinisterior, sive exponentium parium, a recta $A\omega$ repraesentetur; ideo + vel - exprimendo per signum ambiguum \pm habebimus, 5
 $1 \pm B\omega \sqcap m$ sive $\pm B\omega \sqcap m - 1$, vel $B\omega \sqcap \pm m \pm 1$ id est $B\omega$ erit differentia inter m et 1.
et quando m major quam 1. tunc pro $B\omega \sqcap \pm m \pm 1$. scribemus $B\omega \sqcap m - 1$. Eritque
 $m \sqcap 1 + B\omega$ adeoque $B\omega$ non subtrahetur ipsi AB , sed addetur, sive sumetur in recta 10
 AB producta ultra B . Contra quando 1 major quam m , tunc pro $B\omega \sqcap \pm m \pm 1$, scribetur
 $B\omega \sqcap 1 - m$, adeoque erit $m \sqcap 1 - B\omega$. Quod significat $B\omega$, a recta AB subtrahendam, sive in contrarias partes sumendam esse regrediendo a B versus A . Itaque regula 15
mobilis parallela BE , ascendendo descendendo secum aget affixam sibi, et in ipsa AB
mobilem regulam $B\omega$ et ex ejus puncto ω exiens perpendiculariter stylus impinget in
punctum C regulae mobilis FC , tunc cum rectae $A\omega$, et DC , fiant aequales, seu cum DS
est quae sita. Cumque manifestum sit quamlibet cognitam sumi posse pro unitate sive 20
 AL , et terminum quoque cognitum sive ultimum aequationis cujusdam valorem quemlibet
pro arbitrio nostro accipere posse; sub literis quoque $a, b, c, d, e, f, g, h, l, m$, intelligi
posse quantitates cognitas quaslibet; et in aequatione qualibet effici posse, ut quantitas 25
cognita alicujus termini sit data, ideo imposterum formula \odot uti sufficerit cum caeteras
omnes comprehendat.

Explicandum ergo nunc est, qua ratione Instrumentum aequationi cuilibet propositae 20
accommodeatur, sive quomodo effici possit, ut sit:

$$\begin{cases} AL \sqcap 1 & LM \sqcap hy^2 & MN \sqcap fy^4 & NO \sqcap dy^6 & OB \sqcap by^8 \\ B\omega \sqcap \pm m \pm 1, & \text{adeoque } A\omega \sqcap m + hy^2 + fy^4 + dy^6 + by^8 \\ \text{et vicissim ut sit ex altero latere} \\ DT \sqcap ly & T(Y) \sqcap gy^3 & (Y)\lambda \sqcap ey^5 & \lambda\mu \sqcap cy^7 & \mu C \sqcap y^9 \\ \text{adeoque } DC \sqcap ly + gy^3 + ey^5 + cy^7 + y^9 \end{cases}$$

5

10

15

20

25

1 cognitus, m (1), et $B\omega \sqcap \pm$ (2) $B\omega$, esse $1 - m$; | dazu gestr. Nebenbetrachtung am oberen Rand:
 $1 + B\omega \sqcap m$. Ergo $B\omega \sqcap m - 1$ $m - 1 + 1 \sqcap m$ $1 - m$. | (a) ideo cum ne (b) ideo (3) cumqve necesse
 $1 - B\omega \sqcap m$. Ergo $B\omega \sqcap 1 - m$ $m - 1 + 1 \sqcap m$ $1 - m$. | (a) ideo cum ne (b) ideo (3) cumqve necesse
sit (a) $AL + B\omega$ aeqvari termino (b) $AL L$ 4 repraesentetur; (1) appellemus + vel - $B\omega$ (2) ideo +
vel - (a) $B\omega$ appellando (aa) \pm (bb) $\pm B\omega$, ut scilicet signum (b) appellando \pm , ut (c) exprimendo L
12 mobilem (1) rectam (2) regulam L 13 regulae mobilis FC erg. L

Ut scilicet in casu aequalitatis rectarum $A\omega$, DC incognita y haberi possit. Hoc autem ita praestabitur, in fig. 1. regula LG moveatur, sursum deorsumve in recta AB , donec fiat AL aequalis ipsi a . seu unitati assumtae. Quo facto et radius AGE , tamdiu moveatur circa centrum A , donec rectam LG ita secet in puncto G , ut fiat LG aequalis 5 ipsi AL , sive unitati. Jam regula transversalis GM , circa punctum G , in CM regulae in- crenatura qua per ipsam LG incedit fixum eousque moveatur, donec ipsi LMB occurrat in puncto M tali, ut ipsa LM valeat h . Quo obtento in eo situ sive inclinationis angulo LGM , ita firmabitur regula transversalis GM , ut durante motu sive operatione exempli 10 praesentis inde dimoveri non possit. Idemque de caeteris transversalibus intelligendum est, earum inclinationem manuum opera mutari pro lubitu posse, quando Machina operationi praeparatur; durante operatione mutari non posse, quod effectu facillimum esse, nemo dubitat. Itaque angulus LGM , vel distantia regularum LG , MH sumatur talis, ut sit $LM \sqcap h$. Eodem modo angulus MHP vel NIQ , vel OKR talis ut distantia MN sit f , NO sit d , OB sit b . Quid simplicius? In altero plano similiter anguli DST , TVX , 15 $(Y)Z\alpha$, $\lambda\beta\gamma$, $\mu\delta\theta$, tales sumantur, ut sint distantiae, $DT \sqcap l$, $T(Y) \sqcap g$, $(Y)\lambda \sqcap e$, $\lambda\mu \sqcap c$ et $\mu C \sqcap AL \sqcap 1$. Quo facto Instrumentum erit praeparatum, et ajo perpetuo eventurum, durante machinae motu, utcunque elevetur aut deprimatur radius AE , circa centrum A , ut manente $AL \sqcap 1$ et DS continue variante appellata y , locum habeant aequationes sive 20 valores rectarum LM , MN , etc. item DT , TY , etc. recensiti sub signo \wp .

Quod ita demonstro, etsi Geometrae intelligenti, rem sine demonstratione ex dictis manifestam putem. Ex punctis G , H , I , item s. v. z. β in rectas $M\aleph H$, $N\beth I$, $O\daleth K$, BRE item $T\daleth V$, $(Y)X\daleth Z$, $\lambda\alpha\dot{\wedge}\beta$, $\mu\gamma\ddot{\wedge}\delta$, $C\theta F$ demittantur perpendicularares imaginariae $G\aleph P$, $H\beth Q$, $I\daleth R$, $S\daleth X$, $V\daleth\alpha Z\dot{\wedge}\gamma$, $\beta\ddot{\wedge}\theta$. Jam vero cum sit $AL \sqcap 1$, $DS \sqcap y$, erit $LG \sqcap y^2$, quia LG inter AL et DS proportione media est, ex constructione. Hinc sequitur LM esse

2 regula LG (1) ita moveatur, ut fiat AL aequalis ipsi a , sive unitati (2) moveatur L 12 dubitat.
(1) Jam puncta in quibus rectae | imaginariae erg. | ipsi BE perpendicularares sive verticales, $G\aleph P$, $H\beth Q$, $I\daleth R$, a realibus, horizontalibus, sive regulis $M\aleph H$, $N\beth I$ $O\daleth K$ | secantur erg. | appellemus \aleph , \beth , \daleth . erit ipsa $G\aleph$ (id est LM) $\sqcap h$, et qvoniā | ut erg. | AL ad LG . ita $G\aleph$ ad $\aleph H$, et ex hypothesi $AL \sqcap LG$, erit et $\aleph H \sqcap h$. sumta ergo $LM \sqcap h$. (2) Itaque L 12 distantia (1) LM sumetur talis, ut (2) regularum L 14 simplicius? (1) Similiter (2) In altero plano (a), manifestum est etiam DS fore aequalis ipsi AL , vel LG , seu unitati, cum inter duas quantitates aequaliter AL , LG media qvocve proportionalis DS sit aequalis, de caetero (b) similiter L 21 putem. (1) Cum AL est 1, et DS , y erit $LG \sqcap y^2$, ex constructione, supra explicata, qva efficitur ut sit DS media proportionalis inter (a) 1 et y^2 (b) AL et LG . (2) Ex L 22 BRE erg. L 22 $C\theta F$ erg. L 24 qvia (1) $\langle DS \rangle$ inter duas priores proportione media est, (2) LG inter L

hy^2 quoniam initio motus cum LG esset unitas in AL , puncto G in (G) existente, et puncto M in (M) erat $L(M)$ in h . Patet ergo angulum GLM , aequalem semper angulo ($G)L(M)$ esse talem, ut LM sit aequalis producto ex multiplicatione ipsius LG per f . Nam LM est ad $L(M)$ seu ad h ut LG ad $L(G)$ seu ad 1. Ergo $LM \propto \frac{LG \text{ multiplicata per } h}{\text{divisa per } 1}$. Et quia $LG \propto y^2$ ex dictis, erit $LM \propto hy^2$.

Eadem methodo et caetera demonstrantur, nam quia LM vel $G\mathbf{x}H$ est hy^2 , 5 ideo $\mathbf{x}H$ erit hy^4 , cum in quolibet Triangulo ipsi ALG simili, quale est $G\mathbf{x}H$, altitudo ut $G\mathbf{x}$ per y^2 multiplicata det basin ut $\mathbf{x}H$. quandoquidem $\mathbf{x}H$ est ad $G\mathbf{x}$, ut y^2 ad 1. seu ut LG ad

AL . Adeoque $\mathbf{x}H \propto \frac{G\mathbf{x}y^2}{1}$ sive hy^4 . Porro cum y^2 esset 1. seu $LG \propto AL$ tunc $\mathbf{x}H$ erat

h . eodem autem tempore per praeparationem instrumenti paulo ante factam MN , sive 10 $\mathbf{x}P$ erat f . Idem autem semper manet angulus $\mathbf{x}HP$, etiam in progressu operationis,

ergo ut $\mathbf{x}P$ erat ad $\mathbf{x}H$ tunc cum y vel y^2 , esset 1, seu ut h ad f , ita nunc quoque

quocunque assignabili motus momento, qualiscunque sit y^2 vel LG ; $\mathbf{x}P$ ad hy^4 , sive $\mathbf{x}H$

erit; nempe $\frac{\mathbf{x}P}{hy^4} \propto \frac{f}{h}$. ergo $\mathbf{x}P \propto fy^4 \propto MN$. Iisdem prope verbis ostendetur NO , vel

$\mathbf{x}Q$ semper valere dy^6 , et OB , by^8 . In altero plano, patet DT esse ly , nam tunc cum 15

DS vel y esset 1. DT erat l , ergo tunc erat DT ad DS , ut l ad 1. At eadem perpetuo

manet ratio ob eundem semper angulum DST , ergo nunc quoque cum DT valet y . DS

vel $S\mathbf{T}$ valebit ly . Hinc porro sequitur, $\mathbf{T}V$ valere ly^3 quoniam SF , parallela ipsi AB ,

unde Triangulum $S\mathbf{T}V$ simile Triangulo ALG , adeoque $\mathbf{T}V$ ad ly seu $S\mathbf{T}$, seu ut AL ad

LG seu y^2 ad 1. Unde $T(Y)$ vel $\mathbf{T}X \propto gy^3$. Nam quando y est unitas $\mathbf{T}V$ sive ly^3 , erit l ,

jam ex praeparatione, quando y est 1, $\mathbf{T}X$ aut $T(Y)$ est g . Est ergo tunc $\mathbf{T}X$ ad $\mathbf{T}V$ ut 20

g ad l . Jam eadem semper manet ratio, quoniam idem durante motu angulus $\mathbf{T}VX$. et

1 initio motus *erg.* $L = 7 hy^4$, (1) cum (a) angulus (aa) ALG , (bb) $G\mathbf{x}H$, ipsi ALG aequalis semper efficit, ut multiplicet per y^2 , sive efficiat, ut $G\mathbf{x}$ in (b) Triangulum $G\mathbf{x}H$, ipsi ALG simile (c) angul (d) in Triangulo, (2) qvia (3) cum $L = 12$ seu ... ad f, *erg.* $L = 14 \propto MN$. (1) simili metodo demonstratur (2) totidem (3) iisdem $L = 15 by^8$. (1) et DT , (a) LY (b) ly , et TY , gy^3 , et $Y\lambda$, ey^5 , et $\lambda\mu$, cy^7 , et et μC , y^9 , qvoniam ex hypothesi tunc cum y esset unitas valebant d, b, l, g, e, c, 1, ex hypothesi factae praeparationis, (aa) Triangula autem (bb) anguli autem transversalium ad parallelas, durante motu iidem semper mansere. (2) In $L = 18$ vel $S\mathbf{T}$ *erg.* $L = 18 f$. SF. ... unde *erg.* $L = 19 S\mathbf{T}$, (1) |ut nicht gestr.| y^2 ad 1 (2) seu $L = 20$ Unde (1) demonstratur $\mathbf{T}X$ vel (2) $T(Y)$ vel $L = 20$ unitas $\mathbf{T}V$ (1) valebit 1. (et) (2) (: id est ly^3 :) (3) sive $L = 21 f$. ut 1 ad g. L ändert Hrsg.

proinde Triangulum $V\bar{X}$ semper simile manet; quare semper \bar{X} ad ly^3 sive ad \bar{V} ut g ad l , sive $\frac{\bar{X}}{ly^3} \sqcap \frac{g}{l}$, unde $\bar{X} \sqcap gy^3 \sqcap TY$. Iisdem prope verbis ostendetur $Y\lambda$ sive \bar{a} valere ey^5 , et $\lambda\mu$, cy^7 , et μC , y^9 . Ac proinde veritas aequationum omnium sub signo \diamond recensitarum ostensa est.

Quoniam vero eadem aequatio plures habere potest radices reales, hinc etiam toties durante machinae motu evenire debet, ut $A\omega$ et BC , fiant aequales, ac proinde una eademque operatione invenientur radices Aequationis omnes, quod in numerosa potestatum resolutione qualem Vieta invenit, non procedit; hoc loco autem in numeris non minus quam lineis praestatur. At, inquies, ignorari quoisque motus continuari debeat, ad radices omnes inveniendas. Respondeo per doctrinam de Aequationum determinationibus sive limitibus facile praefiniri terminos, quos y inutiliter excedat: Sed et sine calculo, manifestum est, cum hoc loco omnes radices sint verae, maximam ex ipsis, esse termino cognito secundo, summae scilicet omnium, minorem. Quare inventis etiam aliquot ex ipsis, facile et summa residuarum, quam maxima ex ipsis excedere non possit, cognoscitur. Quantitatatem autem qualibet aequationis propositae radice minorem haberi necesse est, non enim perinde decrescendo, ut crescendo in infinitum iri potest; facile enim ad finem motus regrediendo sive claudendo machinam pervenietur; ut proinde radicem si qua est inferior unitate, occurrere necesse sit. Porro inventae in lineis radices, facile in numeris habentur, quantumlibet exactis, si circino ad scalam quandam quantum satis est subdivisam transferantur. Unum desiderari dicet aliquis, ut scilicet radices in numeris veris habeantur, quando sunt rationales, quod praestat calculus Vietae. Sed quanquam ad usum, id necesse non sit, ausim tamen ab hac quoque machina promittere. Nam statim agnoscatur, si divisores ultimi termini, inventis radicibus proximi, aequationem multiplicatione producere potuerunt. Idem etiam re ad numeros non reducta (: constructio enim per instrumenti naturam pure Geometrica est :) ad radices aequationum literalium rationales, si quae sunt, facile agnoscendas sufficit. Breviter ab hoc Instrumento unico tantum momento praestatur in lineis quantum prolixis et variis praeparationibus

18–20 Porro ... transferantur erg. L 26 f. instrumento (1) exakte elaborato (2) unico tantum | momento erg. | praestatur L 27 quantum (1) omnium curvarum in Geometriam a Cartesio introductorym (2) omnibus prolixis curvarum praeparationibus (3) prolixis L

8 invenit: Fr. VIÈTE, *De numerosa potestatum resolutione*, 1600 (VO S. 163–228).

curvarum omnium in Geometriam a Cartesio introductis; et in numeris quantum calculo
praeclare sane sed mire anxio et impedito, a Francisco Vieta invento: ut nesciam an in
eo genere aliquid ultra exactam Instrumenti elaborationem vel optari possit. F i n i s.

2 praeclare sane sed *erg. L*

27. DE TABULIS ANALYTICIS CONDENDIS

[24. Dezember 1674 – Anfang 1675 (?)]

Überlieferung: L Konzept: LH 35 XIII 1 Bl. 444. 1 Bl. 2°. 2 S. Textfolge Bl. 444 v°, Bl. 444 r°.
Cc 2, Nr. 899

5 Datierungsgründe: [noch]

De Tabulis Analyticis condendis

Cum Calculo Analytico sive literali per instrumenta vix subveniri possit (: excepto unico meo, quod Machinam Combinatoriam appello :), danda opera est, ut Tabulae quae-dam condantur, quibus habitis pleraque facile exequi liceat. Eae vero Tabulae longe alterius erunt naturae, quam Algebrista quispiam sibi persuasurus fuisset. Neque enim sufficit Aequationes unius incognitae ad aliquot usque dimensiones exhibere, earumque dare radices; item formularum recensere divisores. Sed ad aequationes etiam, imo potissimum, plurium incognitarum ascendendum est. Porro quod attinet formularum divisores rationales, non puto opus esse tabulis, nam ope artificii Huddeniani, nunc unam nunc aliam literam pro incognita sumendi, facile judicari potest, an formula quaedam sit divisibilis. Sed et in aequationibus tam literalibus quam numericis, divisores rationales si qui sunt, momento exhibit instrumentum meum Algebraicum, quoniam exhibitis reapse radicibus statim ostendit, quinam termini ultimi divisores ei proxime accedant. Idem instrumentum meum ad calculorum comprobationes more servit, ipsum enim errori nullo

8 f. qvaedam (1) oper (2) condantur L 10 qvispiam (1) communis – (2) sibi L 10 fuisset. (1) Neqve enim id (a) est (b) magni facio (aa) aeqvationes ordi (bb) aequationum formulas recensere, earumqve divisores recensere; (2) Neqve L 11 incognitae (1) exhi (2) ad L 12 divisores. (1) Nam qvod ad radices attinet, eae si sunt irrationales, (a) nunc qvide (b) separatae sunt tractationis, (2) sed L 13 est. (1) Primum (2) Porro L 14 esse (1) mul (2) tabulis L 15 an (1) ae (2) formula L 15 f. divisibilis. (1) In (a) numeris (b) numericis qvoqve aequationibus qvoniam radix in numeris (2) Sed L 17 qvoniam (1) statim e (2) exhibitis L

8 Machinam Combinatoriam: Vgl. N. 31. 14 ope artificii Huddeniani: Vgl. J. HUDDDE, *De reductione aequationum*, 1659, DGS I S. 406–506, insbesondere Regel 21, S. 496 f. 17 instrumentum meum Algebraicum: Vgl. N. Cc 2, Nr. 827, Cc 2, Nr. 815 und Cc 2, Nr. 816.

subjectum est, saltem non magno; etsi minus exacte Elaboratum poneretur. Sed quod attinet ad divisores irrationales, eorum velim tabulam condi, ut appareat, an formula quaedam proposita dividi possit per irrationalem, minoris dimensionis quam quae est ipsius formulae. Nam si ipsi formulae dimensione est aequalis: comprehendetur in Tabula generali radicum irrationalium omnium aequationum, quam inveniri posse non despero. Velim ergo primo dari Aequationum omnium unius incognitae generalissime expressarum radices irrationales, dimensione aequales, ad 10^{mum} v. g. gradum usque, aut 100^{mum} si velis; credo enim habitis aliquot, in caeteris progressionem apparituram. Deinde velim exhiberi earum certo modo affectarum radices irrationales dimensione inferiores si qui sunt. Inde velim exhiberi formularum quarundam nobiliorum divisores rationales; a divisoribus progrediendum erit ad componentes; nempe eadem formula in multas alias resolvi potest infinitis fere modis, ex quibus quaedam etiam irrationales; ibi vero sufficiet formularum nobiliorum exhiberi componentes. Cumque etiam Aequatio turbari possit; seu ex Aequatione converti in Analogiam; specimina elegantiorum exemplorum dari intererit sed haec de componentibus et analogiis pro parergis habenda. Primarium enim est, ut data aequatione, inveniamus incognitae valorem. Itaque primum aequationum unius incognitae, ut cuncte affectarum recensendae radices; sive incognitarum valores puri. Inde ascendendum ad aequationes duarum incognitarum, ubi primum aequationes duarum incognitarum, quae sunt ad eundem locum, recensendae; ut scilicet aliae oblatae ad eas reducantur; et hic erit catalogus Curvarum Analyticarum in plano descriptibili. Loca autem intelligenda sunt, rectarum ad curvarum terminatarum, quae omnes vel parallelae inter se, vel in uno puncto concurrentes; et si parallelae vel angulos ad directricem facientes rectos, vel obliquos. Post

2 irrationales, (1) eos velim (2) eorum L 6 dari (1) Aequationum omnium unius incognitae Radices (2) Tabulam Aequationum omnium unius incognitae (3) Aeqvationum L 7 irrationales, (1) quales ad 20^{mum} (2) dimensione L 9 exhiberi (1) earum di (2) memorabiliores ex ipsis divisores (3) earum divisores irrationales (4) earum L 9f. affectarum, (1) ration (2) radices L 13 infinitis fere modis erg. L 15f. Analogiam; (1) exemplo (2) specimina L 17 habenda. | Itaque gestr. | primarium L 20f. ubi (1) explicanda erunt prima loca (2) primum L 22 catalogus (1) plana (2) Curvarum L 23 sunt, (1) para (2) ductarum ex a (3) rectarum L

curvarum catalogum, quales Huddenius proximo supra Conicas gradu ait esse circiter 50. Nimirum primo exhibebuntur aequationes secundi gradus duarum incognitarum; inde tertii gradus duarum incognitarum; inde quarti, etc. et ita catalogus omnium curvarum Geometricarum ad gradum usque decimum aut ultra. Adjici poterunt earum tangentium, 5 centrorum, focorum, dimensionum aliarumque functionum calculi sive Tabulae, describendi quoque modi illustriores; et theorematia insignia. Recensitis aequationibus duarum incognitarum, et ad certa loca sive curvas reductis; veniendum est ad combinationem duarum aequationum duarum incognitarum. Et exhibitis aequationum catalogis, positis scilicet duabus aequationibus duarum incognitarum inter se combinatis, e regione ponen- 10 dus est cujuslibet incognitae valor absolutus. Jam progrediendum ad aequationes trium incognitarum, seu ad loca ad superficiem, et exhibendus primum Catalogus omnium superficierum Analyticarum ad certum usque gradum, ut appareat determinatus earum numerus; adjiciendaearum tangentes, functiones; centra, foci, etc. et theorematia nobiliora ex calculi natura pendentia. Post catalogum locorum trium incognitarum veniendum 15 ad combinationes duarum aequationum trium incognitarum ut appareat quomodo reduci possint, ad aequationes duarum incognitarum scilicet nunc hac nunc illa incognita elisa, unde quaelibet regulariter combinatio aequationum 2 incognitarum poterit revocari tribus modis diversis ad duas aequationes duarum incognitarum. V. g. si duae aequationes et tres incognitae, v. g. x . y . z . potest elidi z , et restabunt duae aequationes in quibus non nisi x . et y . Eodem modo elidi potest x , vel y . Ubi rursus considerandum est fieri posse, 20 ut inter illas tres aequationes jam sint, in quibus non sunt omnes incognitae. Tandem veniendum est ad con3nationes aequationum trium incognitarum, et singularum dandus

1 f. catalogum, (1) exhi (2) qvales Huddenius | proximo erg. | supra . . . 50. (a) ipsae aeqvationes erunt recensendae. explicandumqve. Forte (b) Nimirum L 5 dimensionum erg. L 5 functionum | et describendi modi erg. L , streicht Hrsg. | calculi L 5 f. describendi . . . insignia erg. L 11 superficiem, (1) qvarum exhibendus (2) et L 15 appareat (1) qvot (2) | qvod modis ändert Hrsg. | reduci L 17 regulariter (1) aeqvatio trium c (2) combinatio L 18 ad (1) aeqvatio (2) duas L 18 incognitarum. (1) Inde veniendum (2) V. g. L 20 y. (1) vel aliter (2) Eodem L 20 vel | y. ändert Hrsg. | (1) potest etiam fi (2) Ubi L 22 ad (1) conternationes (2) con3nationes L

1 Huddenius . . . ait: Eine Methode Huddes zur sukzessiven Generierung von Kurven höherer Ordnung stellt Schooten im Abschnitt *De lineis curvis superiorum generum* in Fr. v. SCHOOTEN, *Exercitationum mathematicarum libri quinque*, 1657, S. 475–480 vor. 21 tres aequationes: Bislang hat Leibniz in diesem Stück nur Kombinationen aus zwei Gleichungen betrachtet.

valor purus. Eodem modo ad altiores praecedendum v. g. ad decimum usque gradum, et in singulis procedendum ordine, v. g. aequatio 6 dimensionum primum 6 terminorum, deinde 5 terminorum etc. et si 5 terminorum decent vel secundus, vel tertius, vel quartus etc. Quando autem loquor de aequationum formulis loquor de plane absolutis seu generalibus, v. g. $y^3 + ly^2 + amy + a^2n \sqcap 0$. ut omnibus accommodari possint. Itaque ego meam aequationem eodem tractans modo novas habebo aequationes collatitias, nam v. g. si sint aequationes duae (: vide schediasmata Xb. 1674. *De trochoeidibus*:)

$$\begin{aligned} x^3 + 2ax^2 + 4afx + 2af^2 &\sqcap 0. \quad \text{et} \quad x^2 - 2f x + f^2 \sqcap 0 \\ + 2f &+ f^2 \qquad \qquad \qquad - 2\frac{y^2}{a}.. - y^2 \\ - 4z^2 & \end{aligned}$$

5

10

quaero in Tabula harum duarum aequationum combinationes:

$$x^3 + lx^2 + amx + a^2h \sqcap 0 \quad \text{et} \quad x^2 + nx + ap[\sqcap 0]$$

Elidendo x , invenietur in Tabula aequatio haec:

12 Dazu am Rand: NB. pro $2af^2$, pone a^2h .

1 praecedendum (1) Hoc (2) v. g. L 2 v. g. (1) primum aeqv (2) aeqvatio 6 (a) incognita (b) dimensionum L 5 ut | postea gestr. | omnibus L 8–11 $\sqcap 0$ (1) suppono pro priore (2) quaero L 11 Tabula (1) has (2) harum L 12 amx+ (1) $2af^2$ (2) a^2h L 13 elidendo (1) fiet (2) x , (a) fiet aeqvatio hoc (b) invenietur L 13–182,1 haec (1) $\frac{-a^2mp + a^2p^2 + lnap + n^2ap}{2af^2 - lap - nam - ln^2 + n^3} \sqcap \frac{-2af^2 + lap - nap}{am - ap - ln + n^2}$
 $(2) \frac{-a^2mp + a^2p^2 + lnap + n^2ap}{ha^2 - lap + nam - ln^2 + n^3} \sqcap \frac{-ha^2 + lap - nap}{am - ap - ln + n^2} L$

7 *De trochoeidibus*: VII, 5 N. 18. 11–182,3 quaero ... $\frac{f^2 - y^2}{a}$: Ein eigenständiges Werk von

Leibniz mit solchen Kombinationen zweier Gleichungen konnte nicht gefunden werden. Den Lösungsansatz des allgemeinen Problems, bestehend aus den Gleichungen und der Beziehung, die sich aus der durch Vorzeichenfehler beeinträchtigten Elimination von x ergibt, übernahm Leibniz aus VII, 5 N. 18 S. 166 Z. 18 bis S. 167 Z. 7. Dabei wurde nachträglich, wie in der Randnotiz in Z. 14 vermerkt, $2af^2$ durch a^2h ersetzt.

Richtig müsste die linke Seite der Gleichung von S. 182 Z. 1 lauten: $\frac{-a^2mp + a^2p^2 + lnap - n^2ap}{-ha^2 + lap - 2nap + nam - ln^2 + n^3}$.

— Hier und in den folgenden Gleichungen (Z. 12 – S. 182 Z. 3) bezeichnet a sowohl einen der Koeffizienten des zu lösenden Problems aus Z. 8–10 als auch denjenigen des generellen Problems in Z. 12 und seines Lösungsansatzes.

$$\frac{-a^2mp + a^2p^2 + lnap + n^2ap}{ha^2 - lap + nam - ln^2 + n^3} \sqcap \frac{-ha^2 + lap - nap}{am - ap - ln + n^2}$$

Quae aequatio jungatur novis assumtis aequationibus:

$$l \sqcap 2a + 2f. \mid am \sqcap 4af + f^2 - 4z^2. \mid a^2h \sqcap 2af^2. \mid n \sqcap -2f - \frac{2y^2}{a}. \mid p \sqcap \frac{f^2 - y^2}{a}.$$

Habemus ergo aequationes 6. incognitas 7. ex quibus elisis caeteris retinendae, seu pro
 5 cognitis sumenda y . et z . Atque ita rursus in tabula sub 6 aequationum conjunctione,
 invenies statim sine calculo valorem. Ubi maximus apparet usus dispersionis in minuta seu
 multas aequationes particulares, ut sine calculo inveniatur valor. Video jam, non videri
 necessarium, ut separatim exhibeantur conternationes et combinationes 4 aequationum;
 semper enim eas quas elidere non vis cognitas finges, et res semper reducetur ad casum
 10 problematis determinati. Sufficit ergo tantum in Tabulis exhiberi omnium incognitarum
 valores datis totidem aequationibus.

2 aeqvatio (1) conferatur novis (a): (b) assu (2) jungatur $L \quad 3 f^2 \mid + ändert Hrsg. \mid 4z^2 L$
 5 z. (1) Et huc jam illud video non esse. (2) Atqve $L \quad 8$ exhibeantur (1) redu (2) conternationes L
 8 f. aeqvationum; (1) qvoniam (2) semper L

4–7 Habemus ... valor: In den Überlegungen zur Lösung des benannten Gleichungsproblems in
 Z. 1–3 wirkt sich die doppelte Verwendung des Koeffizienten a aus. Zudem ordnet Leibniz hier die Koef-
 fizienten des ursprünglichen Problems von S. 181 Z. 8–11 den Unbekannten zu.

28. DE SOLIDIS ANALYTICIS

[Dezember 1674]

Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 I 17 Bl. 11+17. 1 Bog. 2°. $\frac{1}{3}$ S. auf Bl. 17 v°. — Auf dem restlichen Bogen N. 24₁.

Cc 2, Nr. 00

5

Datierungsgründe: N. 28 ist vor dem auf Dezember 1674 datierten N. 24₁ auf den Bogen geschrieben worden, vermutlich in Zusammenhang mit den Exzerpten aus J. WALLIS, *Mechanica*, 1670–1671 (VIII, 2 N. 8).

Solida Analytica possunt homogenea esse figuris quadratricibus non analyticis. Imo id quotidie evenit, quia solidorum elementa sunt spatia quorum spatiorum saepissime 10 non habetur quadratura.

Cylindri Hyperbolici residuum ungula semiquadrantali absecta est homogeneum figurae logarithmorum. Idem de aliis solidis facile fingi potest. Hinc etiam quoties problema quoddam Mechanicum eo redactum est, ut quaeratur descriptio cujusdam figure quadratricis, exhibeat solidum quoddam Geometricum, id figureae quaesitae homogeneum 15 erit. Et dici poterit vires esse ut solidorum ejusmodi portiones.

9 analyticis. | Exemplum in Hyperbola dari potest. *gestr.* | Imo *L* 12 f. homogeneum (1) figureae quvae sit f (2) figureae *L*

12 ungula semiquadrantali: Leibniz kennt den Ausdruck aus J. WALLIS, *Mechanica*, 1670–1671, pars 2, S. 547 f. (WO I S. 918 f.); vgl. VII, 6 N. 34 S. 385.

29. NOTA AD SOVERUM
 [Oktober 1676 – März 1679 (?)]

Überlieferung: *L* Notiz: LH 35 XI 18 A S. 439–440. 1 paginierter Zettel 17,5 × 2,5 cm. 1 S. auf S. 439, S. 440 leer.

5 Datierungsgründe: Leibniz notierte sich in der zweiten Oktoberhälfte 1676 Informationen über das Buch von Soverus aus dem Gregory-Collins-Briefwechsel (III, 1 N. 88₂ S. 487). Möglicherweise hat Leibniz bereits damals ein Exemplar in der Royal Society konsultiert, spätestens dürfte er die Notizen anhand des aus dem Nachlass von Martin Fogel für die herzogliche Bibliothek in Hannover erworbenen Exemplars (Nm-A 754) gemacht haben, in das er auf den S. 373 u. 377 Randbemerkungen eingetragen hat. Am 10./ (20.) März 1679 hat Leibniz ausgehend vom Beweis der Prop. 4 in Buch 6 (S. 378 f.) seine Untersuchung *Tentamen ad dimensionem arcus alicujus circularis* (LH 35 VII 1 Bl. 34–48) begonnen.

10 Bartholomaeus Soverus in proportione curvi ad rectum promota defendit motum esse Geometricae tractationis. Quaedam demonstrat theorēmata, ut ostenderet quibus Datis habituri essemus Quadraturam Circuli. Jam observavit illam in Hyperbola numerorum decretionem. Editus est ejus liber 1630. apud Variscum Varisci. Patavii 4°.

13 defendit: B. SOVERUS, *Curvi ac recti proportio promota*, 1630, S. 271–276, 361. 13 demonst-
 trat: *a. a. O.*, S. 371–373 [Marg.]. 14 f. observavit: *a. a. O.*, S. 359 f.

30. MEA GEOMETRIA

[Juli – September 1676 (?)]

Überlieferung: *L* Notiz: LH 35 V 14 Bl. 21. [Größe: noch]. 3 Zeilen auf Bl. 21 v°. Vorderseite leer. — Gedr.: Cc 2, Nr. 991.

Cc 2, Nr. 991.

5

Datierungegründe: Ausschlaggebend bei der Datierung erweisen sich Leibniz' Vergleiche seiner eigenen Leistungen mit denjenigen Descartes. Anfangs verweist Leibniz lediglich auf Bewertungen der Arbeiten von Descartes durch Fachkollegen (VII, 1 N. 63, 110, 114 (= VII, 4 N. 164); VII, 4 N. 36; VII, 7 N. 10, 11, 15) oder geht Hinweisen auf Unzulänglichkeiten des Werks nach (z. B. VII, 7 N. 48), ohne seine eigenen Beiträge zur Geometrie im Vergleich dazu einzuordnen. Mit den fortschreitenden Arbeiten zur Kreisquadratur erarbeitet Leibniz sodann ein Narrativ, in dem er seine Abweichungen gegenüber Descartes und seine Neuerungen in der Konzeption der Geometrie und der Systematisierung von Kurven durch ein Anknüpfen an andere Traditionslinien motiviert (so z. B. III, 1 N. 38, 39; VII, 3 N. 38₁₂; VII, 4 N. 36; VII, 5 N. 26; VII, 7 N. 49; VII, 8 N. 6). Gleichzeitig vermeidet er, direkte Kritik an Descartes zu äußern, seine eigenen Leistungen explizit zu benennen oder sie gar als überlegen zu bezeichnen. Für den Sommer 10 1676 ist schließlich eine intensive Beschäftigung mit der inversen Tangentenmethode belegt (III, 1 N. 89; VII, 5 N. 88–91). Leibniz ist überzeugt, im Vergleich zu Descartes eine in jeder Hinsicht vorzuziehende Methode entwickelt zu haben, die insbesondere die nach allgemeiner Auffassung bestehenden *difficilia* und *impossibilia* des descartesschen Ansatzes zu lösen im Stande sein soll (VII, 5 N. 90, 91; VII, 6 N. 51). Kontrastierend zur noch kurz zuvor stets sachlich formulierten inhaltlichen Kritik (z. B. VII, 6 N. 20) 15 weist er bei der Lösung der 2. Debeauneschen Aufgabe zudem wiederholt darauf hin, dass er Descartes in der Geschwindigkeit der Lösung nun um ein Vielfaches übertreffen könne (VII, 5 N. 90, 91; VII, 6 N. 49₁, 51). In der Kritik an Descartes nimmt er außerdem Gedanken aus einem wohl Ende Mai 1676 von Collins an Tschirnhaus gerichteten Brief (III, 1 N. 82) auf, die schließlich den letzten Baustein eines neuen Narrativs ausmachen. Bereits im August 1676 wird dieses durch einen Brief an Oldenburg (III, 1 N. 89) einem größeren Personenkreis sichtbar. Wenn auch deutlich weniger konkret in seiner Kritik und um vieles zurückhaltender im Tonfall, weist das vorliegende Stück eine große Übereinstimmung mit dem Grundtenor dieses neuen Narrativs auf. Zudem besteht im letzten Satz des Stücks eine Ähnlichkeit in der Formulierung mit VII, 5 N. 91 S. 605 Z. 4–6 von Juli 1676. Somit kann das vorliegende Stück mit aller Vorsicht in die Zeit von Juli 1676 bis zu Leibniz' Abreise nach England datiert werden. 20 25 30

M e a G e o m e t r i a

Jam eo mihi videor pervenisse ut non habeam cur sim amplius de Geometria valde solicitus. Possum nunc non minus audacter loqui quam Cartesius et fortasse majori jure. Praesertim cum absolverim quae video ei difficilia visa, et partim impossibilia.

34 absolverim | multa gestr. | qvae *L* 34 ei (1) difficilis imposs (2) difficilia *L*

31. DE MACHINA COMBINATORIA, SIVE ANALYTICA
[September 1674 – Anfang 1675 (?)]


Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 III A 26 Bl. 13. 1 Bl. 4°. 1 1/2 S. Auf Bl. 13 v° am rechten Rand unten quer geschriebene Notiz in unbekannter Hand: ad. 50. — Gedr.: COUTURAT,
5 *Opusc. et fragm.*, 1903, S. 572 (tlw. = Z. 25–27).
Cc 2, Nr. 818.

Datierungsgründe: Leibniz nutzt die Bezeichnung *Machina Analytica* erstmals in VII, 1 N. 8. Obwohl die Bezeichnung im später entstandenen Stück VI, 3 N. 44 im Desiderat einer *Machina, quae pro nobis faciat operationes analyticas*, erneut anklingt, findet sich diese oder eine andere Bezeichnung der 10 dort beschriebenen *machina* im gesamten Stück nicht. Durch die Charakterisierung der Funktionen wird deutlich, dass VI, 3 N. 44 dieselbe *machina* wie das vorliegende Stück zum Gegenstand hat. Aufgrund der fehlenden Bezeichnung und der zugleich auftretenden Unterschiede zur in VII, 1 N. 8 benannten *Machina Analytica* kann VI, 3 N. 44 als Auftakt zur Arbeit an der im vorliegenden Stück als *Machina Analytica sive Combinatoria* titulierten *machina* gewertet werden. Die Entstehung von VI, 3 N. 44 stellt 15 somit einen *terminus post quem* für N. 31 dar. Versteht man die Verwendung von *Machina Combinatoria* als alleinige Bezeichnung in N. 27 als Aufgabe der in VII, 1 N. 8 für eine in ihren Grundprinzipien abweichende *machina* verwendeten Bezeichnung *Machina Analytica*, um eine bessere Unterscheidbarkeit beider Ideen zu erzielen, so ist die Entstehung von N. 27 nach derjenigen von N. 31 anzusetzen. Eine solche Datierung zwischen VI, 3 N. 44 und N. 27 ist insofern stimmig, als dass Leibniz im vorliegenden 20 Stück *signa ambigua* erwähnt, mit denen er sich im relevanten Zeitraum intensiv beschäftigt. Auch die Ausführung der Darstellungen der Kugeln im Diagramm stimmt mit der Art und Weise in anderen Handschriften derselben Zeit überein. Ebenso werden in diese Zeit Stücke datiert, in denen er sich intensiv und systematisch mit dem Lösen von Gleichungen beschäftigt und die Lösung von Systemen mehrerer Gleichungen behandelt.

25 Saepe cogito de Machina Combinatoria, sive Analytica, qua et calculus literalis perficiatur. Ut si sint aliquot aequationes, et totidem incognitae, id agitur ut omnes ordine incognitas tollamus usque ad unam. Omnis calculus iste reddit ad additionem subtractiōnem Multiplicationem et divisionem.

26 ut (1) inveniamus valorem abs (2) omnes *L*

25 f. perficiatur: Einzelheiten eines instrumentellen Ansatzes zur Lösung desselben technischen Problems führt Leibniz in VII, 1 N. 142 aus.



[Fig. 1]

Sint plurima frusta, *A. B. C* tot scilicet quot ad summam membra habere potest calculus qui faciendus est. Haec frusta poterunt quidem facile ad numerum millenarium ascendere; pro calculis complurium incognitarum, sed et ille sufficiet credo. Sint totidem globi, *D. E. F.* quot literae sive cognitae sive incognitae. Ex quolibet globo exeat filum ad quodlibet frustum, quo filo regetur forma aenea vel stannea gerens literae characterem. Cum globum tanges in omnibus frustis litera ejus apparebit, si modo omnibus frustis laxata sunt frena. Nam in quibus laxata non sunt non apparebit. Quod Elaterioli ope fieri potest, quod cedet, tunc cum totum resistet. Aliisque multis modis pro multitudine scilicet frustorum, simplicioribus: aperies autem tot frusta quot membra calculus habere debet. Imo statim ab initio utile erit plura aperire frusta pro uno eodemque calculo;

5 ita ut idem membrum appareat saepius, ut si debeat multiplicari $\begin{matrix} a & d & g \\ b & \text{in} & e & \text{in} & h \\ c & f & r \end{matrix}$, novem

aperiantur frusta pro ipso *a* novem alia pro ipso *b*, et totidem pro *c*. Erunt ergo aperta 27 frusta nam et sub finem calculi tot erunt termini. Inde ex his frustis ipsius *a*, tria, item ex frustis ipsius *b* tria, et ex frustis ipsius *c*. itidem tria tantum aperiantur, quando trahimus globum *d*, et quando globum *e*, et quando globum *f*. Denique horum 27. frustorum triens aperietur cum tanges per *g*, et alias triens cum tanges *h*, et alias cum tanges *r*.

10 2 A. B. C erg. *L* 3 est, (1) sint *f* (2) Haec *L* 4 calculis (1) decem incognitarum (2) complurium *L* 6 regetur (1) character (a) ge (b) pergerens (2) forma *L* 6 gerens (1) nomin (2)

15 nomen charact (3) literae *L* 10 membra (1) | ad nicht gestr. | rem (2) calculus *L* 12 in (1) *h*

$\begin{matrix} g \\ (2) h, (a) novem (b) sex (c) novem L \\ r \end{matrix}$ 14 a, (1) pari (2) tria, *L* 17 cum | tangens ändert Hrsg. |

h, L

Sed quoniam calculus ostendere potest longe post debere adhuc id ipsum multiplicari per
 m
 aliam quantitatem ut n tunc quilibet ex terminis prioribus, ut aer rursus debet triplicari,
 p
 vel si mavis m , 27^{cuplari}, et n itidem, et p itidem: et tunc non globos, sed frusta illa 27. in
 quibus adg , adh , etc. trahes, horum fila ad globos respondentia, mediantibus globis rursus
 5 trahent quidem ubique, sed non nisi apertis in locis apparebunt, ut primum in omnibus
 27. ipsius m , post in omnibus 27 ipsius n , et denique ipsius p . In hoc ergo consistet
 artificium potissimum, ut non tantum trahantur frusta sed et trahant. Ita enim totus
 calculus factus momento propagari potest. Aperire frusta poterimus v. g. deprimendo
 nonnihil, ita, ut ipsa tractura facta rursus in statum ordinarium se restituant. Signa
 10 peculiari filo in singulis frustis repraesentari possunt, +. opus habet nullo, sed pro filo
 – hoc fieri potest, ut bis tractu se mutet in + seu abeat, tertia tractura se restituat.
 Idem poterit esse de quibuslibet aliis signis ambiguis litera repraesentatis. Cum idem
 globus saepius tactus idem quoque frustum saepius trahit cum effectu fit ut in eo frusto
 eadem litera ad plures ascendat dimensiones. Sed cum rursus ipso frusto aliud frustum
 15 trahimus, difficile mihi videtur efficere, ut idem numerus dimensionum in frusto quoque
 tracto sit. Et vix aliud concipi poterit medium quam hoc; ut eo ipso dum repetitis
 initio tractionibus crevit in frusto nunc trahente literae trahendae columna. An forte
 rectius fila plura ab eodem globo ad idem frustum ibunt parallela inter se, sed uno
 tractu non nisi unum habebit effectum (nulla nova apertura, sed ex natura rei) et ita
 20 unum post alterum, etsi literae non multiplicetur character forte, sed in eodem charactere
 numerus circumgyratione quadam. Quando autem trahitur frustum non per globum sed
 per aliud frustum, omnia fila quae in frusto trahente jam velut c a p t a sunt simul
 agent, etsi globum tantum trahant, et per globum aliud frustum, plus tamen ut faciant
 fieri potest, quam si traheret ipse globus, quia forte facere possumus, ut prolixius seu
 25 longius vel brevius attrahatur; quam si globum manu tetigissemus. Et ita ccesset artificium

1 qvoniam (1) ex (2) calculus L 1 longe post erg. L 2 qvantitatem (1) Ubi utile (2) ut (a)
 m
 3 (b) n L 2 ut | ael ändert Hrsg. | rursus L 4 horum (1) gl (2) fila L 4 respondentia, (1) per
 p
 (2) mediantibus L 5 ut (1) in (2) primum L 9 ipsa erg. L 9 in (1) totum (2) statum L
 10 habet (1) 0 (2) nullo L 13 cum effectu erg. L 15 dimensionum erg. L 17 columnna | ,
 seu filum eius ita factum brevius *gestr.* | . An L 18 rectius | ut *nicht gestr.* | | filo cuilibet additum sit
 aliud filum *gestr.* | fila L 21 qvadam. (1) Ut an (2) Sed (3) Qvando L 23 trahant, (1) sed p (2)
 tamen plus (3) et L 24 si (1) traherent ipsum frustum (2) traheret L

singularitatis filorum. Sed nondum satisfacit, subvenit tandem aliud artificium, nimirum globus trahit v. g. ter, literam cujusdam frusti. Ergo quaedam notae ut respondeant in frusto fieri potest. Ergo cum postea hoc frustum elevabitur filum illud transiens has notas ter vellicabitur, et ita exprimet tres dimensiones: et ita de caeteris, et hoc credo fere unicum esse remedium.

5

Porro eadem methodo etiam dividere poterimus; vel contrario motu, vel potius quia fila non possunt esse rigida atque adeo non servit regressus trahendo altius, seu longius. Sed tunc aperiemus non nisi ubi multiplicationis limitem tractio praeteriit, ne scilicet simul multiplicet et dividat.

Porro quoniam utile est non tantum conclusionem sed et vestigia calculi extare in charta, ideo impressoria arte, ex his characteribus semper exprimemus quae sunt ibi. Cum fiat, ut ex diversis multiplicationibus, idem membrum saepius confletur, hinc facilitate opus ad ista in unum jungendum aut destruendum. Ideo jam opus esset quoad frusta, ut in plano in quo sunt moveri sibique adjungi aut dejungi possint. Sed hoc caeterorum difficillimum, ob chordas sese implicantes.

10

Nota plura frusta non possunt simul elevari, alioqui idem globus simul tangeretur a pluribus quod confunderet. Nota etiam rectius deprimi quam elevari frusta.

Non ausim sperari hanc transpositionem in instrumento fieri posse.

15

1 satisfacit, (1) nimirum non (2) subvenit *L* 1 f. nimirum (1) filum (2) globus *L* 2 ut *erg. L*
5 fere *erg. L* 6 eadem (1) opera (2) methodo *L* 9 f. dividat. (1) Sed qvoniam labor describen (2)
Porro *L* 12 multiplicationibus, (1) iidem (2) idem *L* 13 esset *erg. L* 13 f. frusta, (1) ut etsi
summitas eorum sit in eodem plano, alia tamen aliis profundius per descendant (2) ut *L* 16 possunt
| simuli ändert Hrsg. | elevari *L*

11 impressoria arte: vgl. die Überlegungen zur technischen Umsetzung einer Verbindung von Setzen und Drucken in VII, 1 N. 56.

32. GENERALIS DIATYPOSIS

Ende 1676

Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 XIII 3 Bl. 249. 1 Bl. 4°. 2 S. Der Träger des Stücks hing ursprünglich mit jenem von N. 38 zusammen.

5 Cc 2, Nr. 00

Sub finem anni 1676

Generalis Diatyposis Methodorum mearum circa Mathesin puram

Methodi quas habeo sunt vel calculi, vel constructionis. Calculi initium est, ut nomina omnibus formis imponamus; ut absolvamus Tabulam formarum, et quomodo formae ex se invicem ducantur. Tabulae multiplicationum et divisionum; tum si literae aequiformes *a. b. c.* tum si sint affecti progressionis Geometricae unius vel plurium $a + bx + cx^2$, vel $a + bx + cy + dxy$, etc. Quin et Tabulae Differentiarum et Summarum ex quibus apparet quomodo plura in unum addita aliquando dent formulas satis simplices. Tabulae potestatum et regressus ex ipsis seu methodus extrahendi radices rationales, ex formulis. Summae et differentiae potestatum. Methodi directae sunt multiplicare, exaltare, differentias invenire. Methodi recip \langle rocae \rangle seu regressum, sunt dividere, extrahere, summas invenire. Hae non semper absolvvi possunt, nisi Signis praefixis. Huc pertinet quantitates in speciem impossibilis reducere ad possibiles, quando id fieri potest, vel saltem notare quod ad eas reducantur virtualiter.

20 De Rationibus et proportionibus, item de ratione replicata et communi mensura.

7 Methodorum (1) meorum (2) mearum *L* 7f. puram (1) Sunt | Methodi, erg. | vel Calculi vel Constructiones. Et co (2) Methodi ... sunt vel (a) communes Numeris et lineis, vel propriae (aa) lineis (bb) Numeris, vel propri (b) calculi, vel constructionis. (aa) Calculus (bb) Calculi *L* 9 imponamus; (1) qvod ostendi (2) ut ... formarum; (a) Calculus directus (b) et qvomodo *L* 10 f. multiplicationum (1) et (a) formae (b) potestatum formulae; (2) et divisionum; ... aeqviformes (a), tum si sint affecti ejus (b) a. b. c. *L* 12 Tabulae (1) Summarum, seu qvae (2) Differentiarum *L* 13 simplices. (1) (Calculus regressus) (2) qvorum et Differentialia (3) Tabulae *L* 15 exaltare (1) reciproce, dividere (2), differentias *L* 16 seu regressum erg. *L*

De aequationibus et aequationum radicibus, seu radicibus affectis, et quando exakte extrahi possunt. De Resolvendo et ejus resolutione. De aliis resolvendi modis per extractiones utrinque. De extractionibus vel exactis vel per seriem infinitam, qualis et in potestatibus puris succedit. De aequationibus aequationem propositam dividentibus, de radicibus aequalibus. De uniformiter crescentibus aliisque. De aequationibus plurium incognitarum. Et primum fingendo eandem literam velut diversam, ita ut omnia redundantur ad aequationes rectangulares simplices quae si incompletae videndum quomodo suppleri possint. Hac methodo videtur compendiose obtineri posse resolutio aequationum, seu reductio radicum affectarum ad puras. Ordinaria vero methodus tollendi incognitas in eo consistit, ut semper exaltetur aequatio multiplicando eam per literam tollendam. Et omnes exaltatas componendo inter se, ut tollantur ordine potentiae altiores omnes. Methodus investigandi generalia pro seriebus indefinitis. Quod fit gradatim ascendendo ut obtineatur progressio. Hoc jam ante opus ad resolutiones aequationum unius incognitae. Methodus tollendi incognitam unam ex aequationibus duabus duarum incognitarum, coincidit cum extractione radicis per seriem infinitam tum scilicet tantum valor purus invenitur. Promovendus gradus ad tollendas incognitas plurium aequationum. Et inveniendos valores puros. Habita Tabula Tollendarum incognitarum, prope omnis calculus Algebraicus in potestate est, terminos Tabulae tantum explicando in nostris exemplis. Hinc jam veniendum ad methodum tollendi irrationales; et quomodo aequationis radix irrationalis exprimi possit per formulam. Jam veniendum ad problemata diophantea pro integris et pro numeris rationalibus. Et duplex solvendi methodus, una qua usu sum pro

1 aeqvationibus et (1) aeqvalis (2) aeqvationum divisoribus, et quando (3) radicibus, L 3 f. de extractionibus... succedit erg. L 5 aliisque. (1) De Methodo tollendi (2) de aeqvationibus L 10 tollendam erg. L 11 omnes. | Hac methodo etiam extrahitur radix pro seriebus infini erg. u. wieder gestr. | Methodus L 15 f. tum... invenitur erg. L 16 tollendas (1) aeqvatio (2) incognitarum (3) incognitas L 18 est, (1) *{Tabulas}* (2) terminos Tabulae tantum (a) exprimendo (b) explicando L 19 f. quomodo (1) aeqvatio quae radices rationales non habet (2) aequationis L 20 formulam. (1) Item (a) *{qvo}* (b) de modo *{aeqv}* (2) Jam L 21 rationalibus erg. L

20 problemata diophantea: Leibniz scheint sich vor allem im Zeitraum von August bis Oktober 1674 intensiver mit diophantischen Gleichungen beschäftigt zu haben (vgl. VII 1, S. 468). Sie sind der Gegenstand einer Reihe an Stücken, die in VII, 1 gedruckt sind. So untersucht er dort in N. 116–124 Methoden, um diophantische Gleichungen zweiten Grades mit zwei Unbekannten in ganzen und in rationalen Zahlen zu lösen. In N. 116 behandelt er dabei auf S. 715 insbesondere auch ihre Beziehung zu Kegelschnitten.

reducenda novissime Curva Conica ad Quadraturam rationalem; altera, reducendi rem ad integros, et integros, exhibendo, donec ex progressionе aliorum semper minorum integrorum necessaria, appareat in integris solvi non posse. De divisibilibus, de Numeris primitivis, ubi methodus mea ex progressionе Geometrica inveniendi an datus numerus sit primitivus, aut quos habeat divisores. De summis numerorum, ubi de Numeris Combinatoriis. Item de Methodo pro summis ex summis radicum aequationibus, et rectangulorum, nam et summae rectangulorum ex potestatum summis; et ex summis rectangulorum, caeterarum formularum eodem modo compositarum omnium. De summis quantitatum ex progressionе Geometrica derivatarum, id est *<cum>* Abscissae progressionis Geometricae, quaeritur summa ordinatarum. Item pro progressionе Arithmeticа, ubi est utile, procedere per $x - 1$, x , $x + 1$. De calculo differentiali serierum; seu ex data differentiarum proprietate invenire seriem. Quo pertinet inventio summarum. Ostensio quod quaedam talia Algebraice impossibilia exhiberi. De serierum Terminationibus et duarum serierum Concursu. De seriebus replicatis. Cum seriei progressio determinatur per Terminos praecedentes. De quantitatibus in quibus exponentis indeterminata ingreditur exponentem, de tollenda incognita ex exponente per seriem infinitam. De modo reducendi series infinitas ad finitas, quando id licet. Sive de modo agnoscendi quando series infinita sit reducibilis ad aequationem finitam, vel algebraicam vel transcendentem. Item quia omnia problemata in non transcendentibus terminis concepta, revera tamen transcendentia reduci possunt ad summam seriei infinitae absolutae, vel terminationem Concursum cum alia seriei replicatae; potest semper fingi aequatio homoptotos ad aliquam Parametrum, vel etiam aequatio cuius differentialis sit data. Restat duplex Methodus pro exhibendis optime quantitatibus determinatis, v. g. ratione Circuli ad qua-

2 ad integros, et (1) solvendo in integris (2) integros L 7 nam (1) ex summis, rectangulorum et (2) et summae L 9 f. id est *<cum>* (1) Numeri (2) Term (3) Abscissae progressionis (a) Arithmeticæ (b) Geometricæ L 11 ubi (1) opus est consc (2) est utile L 13 talia erg. L 13 exhiberi. (1) De Quantitatibus Transcendentibus (2) | de *nicht gestr.* | quantitatibus (3) de serierum L 14 Concursu |, seu *gestr.* | de seriebus L 14 Cum (1) series dantur supponendo (2) seriei L 15 indeterminata (1) oritur (2) ingreditur L 18 aeqvationem (1) incog (2) finitam L 21 aeqvatio (1) *(homoeoptotis)* (2) *(homoeoptotis)*, seu (3) homioptotos (4) homoptotos L 22 Restat (1) una (2) duplex L

1 reducenda: Vgl. VII, 6 N. 31 S. 368 u. N. 51 S. 618–621 (Quadratura prop. 43 sowie Scholium).

3 De divisibilibus: Vgl. VII, 1 N. 86–92. 21 homoptotos: Es handelt sich um eine spezielle Kurve; vgl. VII, 1 N. 61 S. 61 Z. 18–21.

dratum circumscrip⁵tum, quae determinat etiam, utrum sit possibile exhibere per finitam Algebraicam, et una quidem est per quotientes replicatos, ubi semel habebitur methodus, et contra inveniendi quotientes replicatos ex data aequatione, et contra ab aequatione ad series replicatas regrediendi. Altera methodus non minus determinata, sed ad praxin utilior, est reducere ad infinitos terminos progressionis Geometricae, vel bimalis, quod simplicissimum vel alterius, ut decimalis. Sed optimum erit loco decimalium sumere bimalis potentias, ut octonariam vel sedecimalem progressionem; vel etiam altiorum; et has unius ejusdemque progressionis progressiones conferre inter se. Hac ratione exprimantur omnes quantitates, quarum in praxi usus. Hinc quia omnis fractio exprimitur per seriem infinitam terminorum ex progressione Geometrica excerptorum periodicam, investiganda periodus, quam et jam inveni, et ope considerationis primitivorum, referendo ad divisiones terminorum progressionis Geometricae. Eodem modo progressio pro irrationalibus investiganda, ubi est periodi alteratio aliqua perpetua. Et hinc pro omnibus aequationibus algebraicis, denique pro transcendentibus. Hic methodus duplex calculandi, una admodum exotica nec dum satis excussa, per perpetuas Alternativas; altera per egregium compendium additionis characterum, cuius occasionem dedit Examen abjectionis Novenarii. Cum enim summa characterum certa lege inita, numeri divisibilis per alium; sit divisibilis per summam characterum, eadem lege initam numeri divisoris. Et quae in unum addita aliquid componunt, eorum characterum summae etiam characterum alterius summam, eodem modo componant; hinc cum idem incognitum, ex diversis modis

10

15

20

2 f. replicatos, (1) exhib (2) ubi . . . methodus (a) ex qvotientibus replicatis regrediendi ad aequationes (b), et contra (aa) ex his datis (bb) inveniendi (aaa) per (bbb) Qvotientes $L = 7$ etiam (1) progressionem (2) altiorum $L = 9$ omnes (1) Numeri (2) qvantitates $L = 9$ usus. (1) (Hinc vel) (2) Hic opus (ex-) (inv) (3) Hinc $L = 10$ infinitam (1) geometrice (2) geometric(am vel) periodicam (3) terminorum (a) progressionis (b) ex progressione $L = 11$ inveni (1) ope divisionis et considerationis (2), et ope $L = 13$ Et (1) denique (2) hinc $L = 14$ Hic (1) egregius da (2) egregia (3) methodus $L = 14$ f. calculandi, (1) ali(us) admodum exoticus (a) per (b) nec dum satis excussus (2) una $L = 16$ f. dedit (1) proba (2) Examen abjectionis Novenarij. (a) Hac Methodo si tot hab (b) Cum $L = 17$ characterum (1) certo modo (2) certa lege inita, (a) aeqvatur (b) numeri $L = 18$ divisoris. (1) Hinc si idem numerus ex pluribus dividi possit, vel eo (2) Hin (3) Et si duo characteres summentur (4) Et aeqvalium characterum (5) Et qvae $L = 19$ eorum (1) summae etiam characteres (2) characterum $L = 20$ idem (1) incognitis, (2) incognitum, ex (a) pluribus cognitis (b) diversis L

16 compendium: Vgl. VII, 5 N. 7, insbesondere S. 58.

ex cognitis componi possit, certa quadam lege variationis servata, hinc si finiti ejus characteres (quod fit reductis omnibus ad integros rationales, si quidem quaesitum haberi potest) finito numero compositionum determinabuntur, sin vero infiniti, etiam infinitis modis variandum erit, servata certa progressionе, donec habeatur characterum progressio. Caeterum est et alia Methodus pro inveniendis quaesitis determinatis per radicem aequationis Algebraicae (vel transcendentis) finitae quando id fieri potest. Si id quod quaeritur determinatum habeatur per aequationem infinitam pluribus communem; seu duarum incognitarum, et deinde fingatur adhuc nova aequatio duarum incognitarum; et harum duarum aequatione tollatur una incognita, quod si jam alterius incognitae valor inde haberi potest per seriem finitam, explicando arbitrariam sic, ut progression terminetur; habebitur quaesitum. Sin minus seu id impossibile demonstratur, tunc etiam impossibile est reduci id quod quaeritur ad aequationem finitam algebraicam.

Haec methodus serviet etiam ad altiora; pro aequationibus duarum incognitarum infinitis, reducendo ad aequationes duarum incognitarum finitas, quando id fieri potest. Nimirum aequatio duarum incognitarum quaesita revocetur ad aequationes duas infinitas trium incognitarum, ipsam determinantes, seu a loco ad lineam, ad locum ad superficiem. Et fingendo aequationem finitam etiam trium incognitarum, harum trium aequationum ope, eam conferendo cum una infinitarum inveniatur aequatio finita duarum incognitarum, et conjungendo cum altera infinitarum debet prodire aequatio finita duarum incognitarum eadem quae ante.

Applicatio hujus calculi ad Geometriam sequitur, et quae in lineis propria. Et primum methodus generalis problemata Geometri[ca] revocandi ad calculum, hoc fit tot sumendo aequationes quot sunt loca, quorum intersectione habetur quaesitum. Demonstrationes habebuntur optime aquationes revocando ad lineas rectas et earum rationes quod semper fieri potest, perpetuo triangula similia adhibendo. Omnis formula enim hoc modo considerari potest quasi compositum ex lineis rectis. Constructio quaerenda per

1 f. characteres (1) vel periodici; hinc (2) (qvod $L = 4$ f. progressio. (1) Est et ali (2) Caeterum $L = 6$ potest. (1) Nimirum, v.g. si qvaerat (2) Si id $L = 7$ communem; (1) et deinde fingatur aeqvatio nova (2) seu duarum $L = 9$ et (1) huius ope (2) harum (a) tollarum op (b) duarum aeqvatione (aa) toll (bb) tollunt unam incognitam (cc) tollatur $L = 10$ finitam, (1) sumendo ar (2) explicando $L = 15$ Nimirum (1) fingatur (2) fingantur (3) aeqvatio $L = 18$ ope, (1) toll (2) eam $L = 18$ aeqvatio (1) infinita trium (2) finita duarum incognitarum, (a) qvam jungendo (aa) cum (bb) ipsa fict(a) habebitur aeqvatio duarum incognitarum, finita qvaesita, (b) et conjungendo $L = 19$ aeqvatio (1) infinita eadem (2) finita $L = 22$ fit (1) per intersec (2) tot $L = 24$ optime (1) rationes (2) aeqvations L

locorum intersectiones: De variis modis exhibendi loca, in primis loca ad Circulum, rectam, et Conicas. De locis ad superficiem et horum intersectionibus. Quomodo sciatur gradus problematis propositi; si planum est quomodo optime per rectam et circulum vel plures rectas pluresque circulos, praeparatorios, qui denique ultimos circulos producant ultimas rectas, construentes, construi possit. Ubi enumerationes omnes possibles habentur, et ex illis seligi possunt optimae. Idem pro Conicis utilem pro altioribus non est operae pretium. De modo seligendi incognitas quas quaeri utile est, de modo revocandi problema ad loca plura, libere seu a se invicem independenter enuntiata. De catalogo curvarum; de modo eas describendi per organa apta. De generali descriptione curvarum per intersectionem duarum rectarum parallele diversimode motarum, de aliis curvas describendi modis. De focus. De Tangentibus curvarum, et de proprietatibus earum conferendo ipsarum diversas ordinatas inter se. Ubi et de proprietatibus paradoxis, seu quae an possibles sint magna dubitandi ratio est, donec contrarium appareat. Tangentes respondent differentiis, de calculo differentiali seu de tangentibus, vel de angulis curvae. De Curvedine seu quantitate anguli contactus plane nova, aliaque universalia. De curvarum proprietatibus, ut de earum parallelismo. De quadraturis et summis. De quadraturarum aliarum reductione ad rationales, et de rationalium gradibus, et quomodo ad Hyperbolas imaginarias reducantur, et videndum an res ita semper redeat ad Logarithmos. De curvis transcendentibus, et earum tangentibus mira. De calculi differentialis theorematibus generalibus. De summis summarum et differentialibus differentialium. Semper tolli possunt summae, ut maneant solae differentiae. De variis aequationibus differentialibus

2 horum (1) intersectionis (2) intersectionibus. (a) Geometria (in) (b) (de lo) (c) de ae (d) quomodo L 4f. denique (1) ultimum circulum (2) ultimos circulos producant (a) ultimam rectam, construentem, pro (b) ultimas L 8 enuntiata. (1) De curvilineo (2) De curvarum tangentibus seu differentiis (a) seu de modo (b) seu de collatione ordinatarum ejusdem (3) De catalogo L 9 De generali (1) conside (2) descriptione L 10 diversimode (1) mod(o) (2) motarum L 13f. appareat (1) de mod (2) Tangentes respondent differentiis, de (a) modo ex (b) calculo differentiali seu de (aa) modo ex data tangentium proprietate inveniendi curvam, seu ex angulo eius. (bb) tangentibus. (aaa) et (bbb) est (ccc) vel de (aaaa) angulo curvae (bbbb) angulis curvae. L 16 ut erg. L 19 mira (1); et Qvomodo differentiale (2). De calculi L

11 De focus: Vgl. VII, 7 N. 33. 15 Curvedine: Vgl. VII, 1 N. 32. 16 parallelismo: Vgl. VII, 7 N. 53 u. 54. 16 De quadraturis et summis: Vgl. VII, 3 N. 38. 17f. Hyperbolas: Vgl. VII, 7 N. 58. 18f. De curvis transcendentibus: Vgl. deren Behandlung in VII, 6 N. 51 sowie in VII, 7 N. 49.

ex eadem aequatione ducilibus. Si aequatione differentiali data quaeratur ejus summatrix seu absoluta, id fieri potest pluribus modis, unus est reducendo ad seriem infinitam, quod semper fieri potest, et tunc quaerenda infinitae reductio ad finitam methodo supra dicta. Quaerenda tamen methodus esset serierum infinitarum se cum licet finientium.

- 5 Alius modus est effingendo seriem absolutam quasi jam habitam, sive algebraicam sive transcendentem, et inde ducendo differentiale, ea combinetur cum data differentiali et sublatis differentialibus. Habebitur denique absoluta adhuc semel, quae coincidere debet cum effecta. Alius modus pro quadraturis est specialiter per polygona; ubi res redit ad seriem replicatam terminorum finitas differentias habentium. Et quaerenda est parameter
10 et aequatio seriei absoluta vel algebraice vel transcendenter; sed ut terminatio inveniatur alia methodus certo analytica haec est, si diversis methodis infinitis polygonorum progressiones sumendo quaeratur calculus generalis progressionem exhibens variis gradis communis, et tunc ipsam incognitam plerumque in exponentem ingredientem, licebit pro arbitrio sic explicare.

- 15 Nondum hic egi de mirabili nova characteristicā geometriæ, qua omnia effici possunt quae calculo, sic ut characteres perpetuo, situm et motum exprimant. Hoc admirandi usus pro Machinis inveniendis, et machinis a natura adhibitis divinandis.

- Utile adhiberi semper eas series, quae, si finibiles, se ipsas finiunt ut idem ex terminis primis fiat quod ex secundis. Haec methodus incognitas absolute transcendenter
20 exhibet, etiam incognitas determinatas, et ejus quoque ope inveniri poterit, an aliquando aequatio determinata transcendens solubilis in numeris. Constructio transcendentium, motu curvarum materialium se rectis *vel* aliis curvis applicantium. Fingantur aequationes plurium incognitarum plures; et ponendo quasdam incognitas esse curvas. Assumta
25 curva algebraica generali et substituendo differentias in differentialibus, ut obtineatur differentialis data.

1 aqvatione (1) ducibilis (2) ducilibus. (a) Data (b) Si L 3 tunc (1) metodo sae (2) qvae-
renda L 5 sive (1) simpliciter Tran (2) algebraicam L 8 f. seriem (1) finitam (2) replicatam L
10 absoluta (1). Qvae si (2) vel L 10 transcenderet; (1) si (2) vel etiam (3) sed L 20 an | an
streicht Hrsg.| aliqvando (1) expo (2) problema transcendens solubile (3) aeqvatio L 22 applicantium.
(1) Fingatur aeqvatio generalis (2) Fingantur L

8 f. seriem replicatam: Vgl. VII, 4 N. 40. 15 nova characteristicā geometriæ: Vgl. VII, 1 N. 9.

33. PASCALII FRAGMENTUM

[4. Juni 1675 – Januar 1676]

Überlieferung:

- L* Abschrift nach einer nicht mehr vorhandenen Vorlage: LH 35 XV 1 Bl. 2. 1 Bl. 2^o. 1 $\frac{1}{4}$ S.
(Unsere Druckvorlage.) 5
- A* Abschrift in der Hand von P. Guerrier nach nicht mehr vorhandenen Vorlagen: Premier Recueil Guerrier, n° 66, S. 232–234 (Privatbesitz).
- E* Erstdruck nach *A*: PASCAL, *Oeuvres complètes* (Bossut), Bd IV, 1779, S. 408–411. — Weitere Drucke: 1. PASCAL, *Oeuvres. Nouvelle Édition* (Lefèvre), Bd IV, 1819, S. 356 bis 359; 2. PASCAL, *Oeuvres complètes* (Hachette), Bd III, 1864 u. ö., S. 219 f. — Drucke nach *L* und *E*: 3. PASCAL, *PO* III, 1908, S. 293–308; 4. (mit frz. Übers.) PASCAL, *Oeuvres complètes* (Chevalier), 1954, S. 71–74, S. 1402–1404; 5. (mit frz. Übers.) PASCAL, *Oeuvres complètes* (Lafuma), 1963, S. 101–103. — Druck nach *L* und *A*: 6. (mit franz. Übers.) PASCAL, *Oeuvres complètes* (Mesnard), Bd II, 1970, S. 1031–1035. — Weitere Drucke: 7. (mit frz. Übers.) PASCAL, *Oeuvres complètes* (Le Guern), Bd I, 1998, S. 169 bis 173; 8. (mit dt. Übers.) *Pascal im Kontext*, 2006; 9. (mit ital. Übers.) PASCAL, *Opere Complete* (Romeo), 2020, S. 344–347. 10
Cc 2, Nr. 1500 A 15

Datierungsgründe: Leibniz bestätigt am 4. Juni 1675 den Erhalt von Pascal-Handschriften (vgl. III, 1 N. 53, S. 253). In diesem Konvolut befand sich auch die Vorlage für unser Stück, wie aus Leibniz' Brief an H. Oldenburg vom 12. Juni 1675 hervorgeht (vgl. III, 1 N. 55, S. 255 f.). Leibniz erwähnt an dieser Stelle auch, dass er nach Rückgabe dieser Handschriften Manuskripte Pascals zu den Kegelschnitten erhalten werde. Am 28. Dezember 1675 schreibt Leibniz an Oldenburg, dass er demnächst weitere Handschriften von Pascal bekommen werde (III, 1 N. 70, S. 329). Aus der Datierung der Gesprächsaufzeichnung *Hexagrammum Pascalianum* (VII, 7 N. 61, S. 576) geht hervor, dass Leibniz die Manuskripte zu den Kegelschnitten spätestens im Januar 1676 zur Verfügung hatte. Die vorliegende Abschrift müsste folglich zwischen dem 4. Juni 1675 und Januar 1676 verfasst worden sein. 20
25

P a s c a l i i f r a g m e n t u m
C e l e b e r r i m i s M a t h e s e o s p r o f e s s o r i b u s :

Haec vobis, doctissimi ac celeberrimi viri, aut dono, aut reddo; vestra enim esse fateor, quae non nisi inter vos educatus mea fecisset, propria autem agnosco, quae adeo praecellentibus Geometris indigna video. Vobis enim non nisi magna et egregie demonstrata placent. Paucis vero genium audax inventionis; paucioribus (uti reor) genium elegans demonstrationis; paucissimis utrumque. Silerem itaque nihil vobis congruum habens nisi ea benignitas quae me a junioribus annis in erudito Lyceo sustinuit, et haec oblata qualiacunque sint exciperet.

Horum opusculorum primum magna ex parte agit de ambitibus, seu peripheriis numerorum quadratorum, cuborum, quadrato-quadratorum et in quocunque gradu constitutorum; et ideo de numerarum potestatum ambitibus inscribitur.

Secundum circa numeros aliorum multiplices versatur, et ut ex sola additione characterum agnoscantur, methodum tradit.

Deinceps autem si juvat Deus prodibunt et alii tractatus, quos omnino paratos habemus, et quorum sequuntur tituli:

De numeris magico-magicis seu methodus ordinandi numeros omnes in quadrato-numero contentos, ita ut non solum quadratus totus sit magicus, sed et quod difficilius sane est, ut ablatis singulis ambitibus reliquum semper magicum remaneat, idque omnibus modis possibilibus, nullo omissio.

Promotus Apollonius Gallus id est Tactiones Circulares, non solum quales veteribus notae et a Vieta restitutae, sed et adeo ulterius promota, ut vix eundem patiantur titulum.

Tactiones sphæricaе pari amplitudine dilatae quippe eadem methodo tractatae. Utrarumque autem methodus singula earum problemata per plana resolvens, ex singulari Conicarum sectionum proprietate oritur, quae aliis multis difficillimis problematis succurrit, et vix unam adimplet paginam.

1 P a s c a l i i f r a g m e n t u m erg. L

2 M a t h e s e o s p r o f e s s o r i b u s : Nach den Recherchen von J. Mesnard dürfte damit der Kreis von Mathematikern gemeint sein, der sich bis 1654 regelmäßig bei J. Le Pailleur versammelte (vgl. PASCAL, *Oeuvres complètes* (Mesnard), II, 1970, S. 1022 f.).

T a c t i o n e s e t i a m c o n i c a e , ubi ex quinque punctis et quinque rectis datis
quinque quibuslibet ⟨—⟩ Conisection ⟨—⟩ quae data ⟨—⟩

L o c i s o l i d i c u m o m n i b u s c a s i b u s e t o m n i e x p a r t e a b s o l u t i s s i m i .

L o c i p l a n i , non solum illi quos a veteribus tempus abripuit, nec solum illi quos
his restitutis perillustris hujus aevi geometra subjunxit sed et alii huc usque non noti,
utrosque complectentes, et multo latius exuberantes, methodo ut conjicere est omnino
nova, quippe nova praestante, via tamen longe breviori.

C o n i c o r u m o p u s c o m p l e t u m , e t C o n i c a A p o l l o n i i e t a l i a i n n u m e r a u n i c a f e r e
p r o p o s i t i o n e a m p l e c t e n s , q u o d q u i d e m n o n d u m s e d e c i m u m a e t a t i s a n n u m a s s e c u t u s e x -
c o g i t a v i e t d e i n d e i n o r d i n e m c o n g e s s i .

P e r s p e c t i v a e M e t h o d u s q u a n e c i n t e r i n v e n t a s , n e c i n t e r i n v e n t u p o s s i b i l e s u l l a
c o m p e n d i o s i o r e s s e v i d e t u r , q u i p p e q u a e p u n c t a i c h n o g r a φ i c a p e r d u a r u m s o l u m m o d o
r e c t a r u m i n t e r s e c t i o n e m p r a e s t e t , q u o s a n e n i h i l b r e v i u s e s s e p o t e s t .

N o v i s s i m a a u t e m a c p e n i t u s i n t e n t a t a e m a t e r i a e t r a c t a t i o s c i l i c e t d e c o m p o s i t i o n e
a l e a e i n l u d i s i p s i s u b j e c t i s , q u o d G a l l i c o n o s t r o i d i o m a t e d i c i t u r (*f a i r e l e s p a r t y s d e s*
j e u x) u b i a n c e p s f o r t u n a a e q u i t a t e r a t i o n i s i t a r e p r i m i t u r , u t u t r i q u e l u s o r u m q u o d j u r e
c o m p e t i t , e x a c t e s e m p e r a s s i g n e t u r . Q u o d q u i d e m e o f o r t i u s r a t i o c i n a n d o q u a e r e n d u m
e s t q u o m i n u s t e n t a n d o i n v e s t i g a r i p o s s i t . A m b i g u a e e n i m s o r t i s e v e n t u s f o r t u i t a e
c o n t i n g e n t i a e p o t i u s q u a m n a t u r a l i n e c e s s i t a t i m e r i t o t r i b u u n t u r . I d e o r e s h a c t e n u s e r r a v i t
i n c e r t a , n u n c a u t e m q u a e e x p e r i m e n t o r e b e l l i s f u i t , r a t i o n i s d o m i n i u m e f f u g e r e n o n
p o t t u i t . E a m q u i p p e t a n t a s e c u r i t a t e i n a r t e m p e r G e o m e t r i a m r e d u x i m u s , u t c e r t i t u d i n i s
e j u s p a r t i c e p s f a c t a j a m a u d a c t e r p r o d e a t , e t s i c m a t h e s e o s d e m o n s t r a t i o n e s c u m a l e a e
i n c e r t i t u d i n e j u n g e n d o , e t q u a e c o n t r a r i a v i d e n t u r c o n c i l i a n d o a b u t r a q u e n o m i n a t i o n e m
s u a m a c c i p i e n s , s t u p e n d u m h u n c t i t u l u m j u r e s i b i a r r o g a t a l e a e G e o m e t r i a .

N o n d e G n o m o n i c a l o q u o r n e c d e i n n u m e r i s m i s c e l l a n e i s , q u a e s a t i s i n p r o m t u h a b e o ,
v e r u m n e c p a r a t a n e c p a r a r i d i g n a .

14 penitus (1) intractatae (2) intentatae L 17 exacte (1) ubique (2) semper L 20 incerta,
(1) ideo qvae (2) nunc L

2 quibuslibet: Leibniz hat im folgenden Text drei Lücken gelassen, die auch in der Abschrift von
Guerrier dokumentiert sind; vgl. PASCAL, *Oeuvres complètes* (Mesnard), Bd II, S. 1035. 15 partys:
Mit dieser Frage befasst sich Leibniz in N. 7, abgefasst am 7. Januar 1676.

De Vacuo quoque subticeo, quippe brevi typis mandandum, et non tantum vobis ut ista, sed et cunctis proditurum, non tamen sine nutu vestro, quem si mereatur nihil metuendum; quod equidem aliquando alias expertus sum, maximo in instrumento illo Arithmeticō, quod timidus inveneram, et vobis hortantibus exponens, agnovi approbationis vestrae pondus.

5 Illi sunt Geometriae nostrae maturi fructus, felices et immane lucrum facturi, si hos impertiendo quosdam ex vestris reportemus.

Datum Parisiis, 1654.

B. Pascal.

1 Über vobis: NB.

2 mereatur *gestr. L, erg. Hrsg.* 8 1654. (1) B. Pascalius (2) B. Pascal. *L*

34. EXTRAIT D'UN FRAGMENT DE PASCAL

[Januar – September 1676 (?)]

Überlieferung: *L* Abschrift einer nicht aufgefundenen Vorlage: LH 35 XV 1 Bl. 13. 1 Bl. 4°. 1 S. — Gedr.: 1. GERHARDT, *Desargues und Pascal*, 1892, S. 202–204; 2. PO IX, 1914, S. 291–294; 3. PASCAL, *Oeuvres complètes* (Chevalier), 1954, S. 602–604; 4. ITARD, *L'introduction*, 1962, S. 269–286, Faksimile S. 276–277; 5. PASCAL, *Oeuvres complètes* (Lafuma), 1963, S. 359; 6. ITARD, *L'introduction*, 1962, S. 270–272, Faksimile S. 276–277; Nachdruck, 1964, S. 103–107, Faksimile S. 104–105; 7. PASCAL, *Oeuvres complètes* (Mesnard), III, 1991, S. 435–437; 8. (dt. Übers., teilw.) ZWIERLEIN, *Pascal*, 1997, S. 126–128; 9. PASCAL, *Oeuvres complètes* (Le Guern), I, 1998, S. 140–142, 1041–1042; 10. DESCOTES, *Géométries de Port-Royal*, 2009, S. 85–90; 11. (mit ital. Übers.) PASCAL, *Opere complete* (Romeo), 2020, S. 278–283.

Cc 2, Nr. 1501

5

10

15

20

25

Datierungsgründe: Leibniz hat G. Filleau des Billettes vermutlich bereits 1672 kennengelernt. 1679 erinnert er sich in einem Brief an N. Malebranche (II, 1 N. 207, S. 724f.), dass er A. Arnauld und Filleau des Billettes „un petit dialogue“ gezeigt habe. Es handelt sich dabei mit Sicherheit um die *Confessio philosophi* (VI, 3 N. 7), von der er im November/Dezember 1672 eine Reinschrift anfertigen ließ. In der *Theodicée* erwähnt Leibniz, dass er Arnauld die *Confessio philosophi* ungefähr 1673 gegeben hatte (*Theodicée Praef.*, GERHARDT, *Phil. Schr.* 6, S. 43). Filleau des Billettes lebte im Haus von Arnauld. Unter den Schriften von Pascal aus dem Besitz von Arnauld befinden sich auch Abschriften von der Hand Filleau des Billettes' (vgl. PASCAL, *Oeuvres complètes* (Mesnard), III, 1991, S. 430). Leibniz hat Pascals Handschriften zu den Kegelschnitten im Januar 1676 von E. Périer erhalten und im August zurückgegeben, nachdem er Exzerpte daraus angefertigt hatte. Falls die Bemerkung am oberen Rand zu diesen Exzerpten nicht wesentlich später entstanden ist als die vorliegende Abschrift, hat Leibniz letztere nicht vor Januar 1676 angefertigt.

Extrait d'un Fragment de l'Introduction
à la Géometrie de Mons. Pascal,
que Mons. des Billets m'a communiqué

Premiers principes et definitions

5 **P r i n c i p e** 1. L'objet de la pure Geometrie est l' espace , dont elle considere la triple étendue en trois sens divers qu'on appelle dimensions, les quelles on distingue par les noms de longueur [,] largeur et profondeur en donnant indifferemment chacun de ce noms à chacune de ces dimensions, pourveu qu'on ne donne pas le même à deux ensemble. Elle suppose que tous ces termes là sont connus d'eux mêmes.

10 [+ E t e n d u est ce qui a des parties sensibles tout à la fois. P a r t i e est une chose la quelle avec une autre chose; est le même qu'une troisieme que nous appellons T o u t . S u c c e s s i f est ce qui a toutes ses parties Sensibles, en autant de temps differens. L ' e s p a c e est une chose étendue et rien d'avantage. U n c o r p s est une chose estendue capable d'agir. A g i r est estre cause d'un changement. C a u s e est une chose prise dans un certain estat dans le quel elle ne peut estre sans qu'une autre arrive; et peut estre entendue parfaitement avant l'autre. L'autre s'appelle l' e f f e c t . Ou: *Effectus est, quicquid sequitur alio posito, et est natura posterius ipso. Natura prius est, quod ante alterum perfecte intelligi potest.* Deux choses sont c o n t i n ü e s

1–3 Am oberen Rand: Alia Pascalii vide in Conicis.

1 Extrait ... de l' *erg. L* 9f. mêmes. [+ (1) l' espace est (a) une chose etendue d'un certain (b) un lieu etendu (aa) d'un certain point (bb) d'une partie en tous sens; ou c'est un lieu (aaa) dans lequel un point peut estre pris et (bbb) qvi a des parties (aaaa) de tous (bbbb) en tous sens, d'un point qvi y peut estre pris. (2) E t e n d u *L* 13 differens. (1) Le lieu (2) L' espace *L* 14 estendue (1) sensible. (2) capable *L* 14 A g i r est (1) causer *nicht gestr.* (2) estre cause d' *L* 15 chose (1), dont (a) une certaine qualité estant (b) un certain mode est (2) la quelle prise d'un (3) prise *L* 15f. autre (1) svit aussi en même temps (2) arrive *L* 18 prius | posterius ve gestr. | est, ... potest |, aut non potest *gestr.* | Deux *L*

1,19 Alia ... Conicis: Vgl. VII, 7 N. 60–64 u. 72. 10–203,4 [+ ...]: Die eckigen Klammern stammen von Leibniz.

quand elles ont une partie commune. Le Lieu est une chose dont l'espace a une partie qui est la même avec l'espace d'une autre chose. L'espace d'une chose est dont l'étendue est égale et semblable à celle de la chose; et chaque partie de l'une de ces étendues est apperceue avec chaque partie de l'autre.]

Princip. 2. L'espace est infini selon toutes les dimensions.

5

Princip. 3. Et immobile en tout et en chacune de ses parties.

Definition du corps Geometrique de la surface, de la ligne, du point, Princip. 4. 5. 6.

Princip. 7. Les points ne diffèrent que de situation; 8. les lignes de situation, de grandeur, et de direction. Les droites par le plus court chemin.

Princip. 9. La distance de deux points est la ligne droite.

10

Princip. 10. Les surfaces peuvent différer de situation, de longueur, de largeur, de contenu, de direction. Les surfaces planes sont bornées de toutes parts par des lignes droites, et qui s'étendent directement de l'une à l'autre.

(: *An minimae superficierum inter datas lineas. An cujus partes quibuslibet congruere possunt, ut et recta.:*)

15

Avertissement, nous ne considerons ici que les plans. Une ligne est égale à une autre quand l'étendue de l'une est égale à celle de l'autre.

Theoremes connus naturellement

1. Les lignes droites égales entre elles ne diffèrent que de situation, l'une étant quant au reste toute semblable à l'autre.

20

2. Les cercles qui ont les semidiamètres égaux, sont égaux. Et les cercles égaux ne diffèrent que de situation.

1 commune (1) Estre éloigné (2) Le lieu (a) est un pa (b) d'un corps, et (3) Le Lieu est (a) la partie d'un espace qui sert à trouver une (b) une chose dont l'espace (aa) contient (bb) comprend l'espace d'une autre chose. Comprendre est estre le même en tout ou en partie. (aaa) Ergo (me) (bbb) donc ainsi plustost: (4) Le Lieu L_2 avec (1) la partie (2) l'espace L_4 f. l'autre. | (1) Et (alors) on peut dire que le corps est dans l'Espace (2) Une chose est Dans une autre quand toutes les parties de la première ne (a) sont sensibles (b) peuvent estre apperceues qu'avec au tant de parties de l'autre. Ainsi (aa) un tout est (bb) une partie est dans son tout: le corps dans une Vase aux bricht ab (3) NB. on ne dira pas que l'espace est dans le corps qui le remplit. Estre dans une chose, est estre placé en sorte que pour estre avec l'un, il faut estre | auparavant erg. | avec l'autre gestr. | Princip. L_7 f. 4. 5. 6. | prop. ändert Hrsg. | 7. L_8 points (1) sont (2) ne different L_9 de (1) forme nicht gestr. (2) direction. L_{11} f. largeur, (1) de forme, (2) de contenu, L

3. Les arcs égaux de mêmes cercles ne different que de situation.
4. Les chordes des arcs egaux de deux cercles egaux ou d'un même cercle, ne different (: que de situation :) ou sont égales entre elles.
5. Tout diamètre divise la circonference en deux portions égales dont chacune est appellée demycercle.
6. L'intersection de deux lignes est un poinct.
7. Si par un poinct pris au dedans d'un espace borné de toutes parts par une ou par plusieurs lignes passe une ligne droite infinie, elle coupera les lignes qui bornent cet espace en deux points pour le moins.
- 10 8. S'il y a deux points l'un au deça, l'autre au dela d'une ligne droite; alors une ligne droite qui tend d'un point à l'autre coupe la ligne droite qui est entre [les] deux, en un poinct, et en un seul.
9. La ligne droite infinie qui passe par un poinct qui soit au dedans d'un cercle coupe la circonference en deux points et en deux seulement.
- 15 10. La circonference qui passe par deux poincts, l'un au dedans d'un autre cercle, et l'autre au dehors, le coupe en deux points, et en deux seulement.
11. Si deux circomferences ont reciprocquement des points l'un au dedans de l'autre, elles s'entrecouperont en deux points, et en deux seulement.
- 20 12. Si une circonference a un de ses poincts au-deçà d'une ligne droite infinie, et son centre au dela ou dans la même ligne droite, elle coupera la même ligne droite en deux points.

19 poincts | au dela ändert Hrsg. | d'une *L*

35. DE TABULA COMBINATORIA PERFECTA

[31. Oktober – November 1675]

Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 VIII 11 Bl. 4. 1 Bl. 2°. 10 Zeilen auf Bl. 4 r° unten. Auf dem übrigen Blatt VII, 1 N. 17 sowie VII, 5 N. 41. — Gedr.: LKK 1, 1973, S. 71 (tlw. = Z. 10–12).
 Cc 2, Nr. 1097 tlw.

5

Datierungsgründe: Das auf demselben Blatt geschriebene VII, 1 N. 17 ist auf den 31. Oktober 1675 datiert.

Pro Tabula combinatoria perfecta desiderantur: ut formae perfectae quaelibet tum inter se, tum cum inferioribus jungantur. Primum pro duabus literisque adeoque et duabus aequationibus ad 10^{mum} gradum, erunt combinationes formarum 10. numero 1024. Quod si contenti simus octo incognitis uti, non erunt nisi 256. Quae ab aliquot personis facile anni spatio elaborabuntur; praesertim si Tabula multiplicationum formularum perfectarum (diverse affectarum) adhibeatur; et praeterea progressiones observentur; quae ordine sine dubio progredientur.

10

Si ad octo usque gradus procedemus poterimus etiam Aequationes ad nonum usque gradum reddere puras. Difficultas quod oblitus sum, nam una combinatur cum pluribus inferioribus similibus. Hoc enim in calculo meo oblitus sum. Nota duae ejusmodi similes inferiores reductae ad unam ascenderent longe altius quam proxime major, et ita idem erit figuram v. g. 10^{mi} gradus conjungere cum duabus perfectis noni gradus, quam conjungere cum una 18^{mi} . Calculus instituatur generalis de reductione figurarum perfectarum similium ad se invicem, ut progressiones seu regulae generales mox inveniantur. Ideo sumamus exponentes ipsos indeterminatos, incipiendo non a primo seu infimo, sed a summo. Conferatur hoc calculus cum ordinario ubi incipitur ab imo.

15

20

10 duabus | curvis gestr. | literisqve *L* 11 ad (1) 15^{mum} (2) 10^{mum} *L* 11 combinations (1) aequationum (2) formarum *L* 13 f. multiplicationum (1) formulas per (2) formularum perfectarum (a) hanc (b) diverse *L* 14 f. qvae | mox gestr. | ordine *L* 16 Aeqvationes (1) adeo (2) ad *L*
 19 ascenderent (1) forte (2) longe *L* 21 una (1) 8^{vi} (2) 18^{mi} *L* 23 indeterminatos, (1) sive a (2) incipiendo non a primo (a) sed ab (b) seu *L*

9 Tabula combinatoria perfecta: Vgl. S. 269 Z. 8–23.

36. DE FORMULIS OMNIUM DIMENSIONUM

361. DE FORMULIS OMNIUM DIMENSIONUM, PARTES PRIMA ET SECUNDA
Januar 1675

5 Überlieferung: L Konzept: LH 35 III A 34 Bl. 1–4. 2 Bg. 2°. 8 S. — Gedr.: LKK 2, 1976,
S. 16–36.
Cc 2, Nr. 900.

Januar. 1675.

De formulis omnium dimensionum:

10 novo analyseos et characterum genere ex artis combinatoriae principiis.
Et calculus explicacionis per binomium
De intercalatione numerorum combinatoriorum

Tentandum est, an Analysis promoveri possit longius adhibitis formulis, quae sint
simil omnium dimensionum. Ut pro $by^4 + acy^3 + a^2dy^2 + a^3ey + a^4f$, scribemus: $by^z +$
15 $acy^{z-1} + a^2dy^{z-2} + a^3ey^{z-3} + a^4fy^{z-4}$. etc. Quod si ponamus $z = 4$. seu $z - 4 = 0$. patet
 y in ultimo termino omitti posse: et etc. quoque omitti debere. Sin minus continuari
poterit, donec fiat exponens ipsius y ipsi 0. aequalis. Quemadmodum autem hic incepi a
summo, ita incipi potuisset ab imo, hoc modo:


$$a^z f + a^{z-1}ey^{+1} + a^{z-2}dy^2 + a^{z-3}cy^3 + a^{z-4}by^4 \text{ etc.}$$

20 Ponamus jam quantitatem y exponente z affectam esse explicandam sive esse $y =$
 $x + b$. quo modo generaliter explicabimus: y^z ? Jam repertum est dudum a edocissimis

10 f. novo ... binomium erg. L 12 De ... combinatorium erg. L 13 est, (1)
ad (2) an L 18 f. modo: (1) $a^4f + a^3ey^{+1}$ (2) $a^z f + a^{z-1}ey^{+1} + a^{z-2}dy^2 + (a) a^{z-3}dy^3 + a^{z-4}cy^4$
(b) $a^{z-3}cy^3 + a^{z-4}by^4$ L 20 f. y = (1) $a + b$ (2) $x + b$ L

21–207,1 edocissimis Geometris: Welche Ereignisse Leibniz als Entdeckungen der figurierten Zahlen ansieht, konnte nicht ermittelt werden. Die im Folgenden genannten Personen führt Leibniz zum Verweis auf weitere Eigenschaften der figurierten Zahlen und des arithmetischen Dreiecks auf.

Geometris, numeros quos vocant Figuratos, 1. 2. 1. 1. 3. 3. 1 etc.




1–3 Figuratos, (1) 1. 1. (2) 1. 2. 1. 1. 3. 3. | 4 ändert Hrsg. | (a) itaqve (b) etc. | triang. ... ∇P verschiebt Hrsg. um eine Spalte nach rechts | A 1 (aa) 2 (bb) 1 L 4 (F)4 (1) (C)5 (2) (D)5 L 8 f. 126
 (1) H1 (2) 1 L 11–208, 1 9 | 45 gestr. | 1 | 10 55 gestr. | (1) itaqve $x + b^4 \sqcap 1x^4 +$ (a) x (b) $4x^3 + 6$
 (2) itaqve L

Itaque

$$x + b^4 \sqcap 1x^4 + 4x^3b^1 + 6x^2b^2 + 4x^1b^3 + 1b^4.$$

Jam si dimensionis exponentis non sit 4, sed universalis exempli causa z . explicanda ratio est, per quam ex data z exhibeantur caeteri numeri transversales, nempe quomodo 5 ex data 8, inveniantur 28, 56, 70, et ex data 9 inveniantur 36, 84, 126. et ita in caeteris. Hoc vero fieri poterit, non quidem per unam quandam aequationem, attamen per unam quandam regulam; nam per Theorema a Maurolyco, Fermatio, Pascalio aliisque observatum. In progressionе naturali ab unitate incipiente numerus quilibet ductus in proxime

1 Am Rand:



10 $a - x$ (1) erit (2) sit EC $\sqcap z$. erit (a) $\frac{EC}{CD}$ (b) EC (c) $\frac{ED}{z}$ (d) $\frac{CD}{z}$ L 3 si (1) non dimension \langle um \rangle (2) dimensionis L 5 70 (1) 56, et ex data 9, 36 (2) et L 8 proxime (1) minorem (2) majorem L

10 fig: Die Figur zeigt Spuren der Überarbeitung: Leibniz ersetzt eine etwas weiter links ausgeführte und wieder getilgte vertikale Linie, die in ihrem oberen Abschnitt von Text unterbrochen ist, durch DE . Das obere Ende der getilgten Linie wurde ebenfalls mit E gekennzeichnet. Leibniz wählt Lage und Länge der Strecken derart, dass die in der begleitenden Rechnung auftretenden Verhältnisse im Diagramm eingehalten werden. Insbesondere gilt $CD : AC = CE : CB$. Die Endpunkte der getilgten Linie liegen mit B und E bzw. A und D jeweils auf gedachten Geraden, die gemäß den im Diagramm auftretenden Streckenverhältnissen zueinander parallel sind. Oberer und unterer Abschnitt der getilgten Senkrechten stehen somit im selben gleichen Verhältnis zum rechts bzw. links vom gemeinsamen Schnittpunkt befindlichen Abschnitt von AB wie die entsprechenden Abschnitte DE . 7 Maurolyco: vgl. F. MAUROLYCO, *Arithmeticorum libri duo*, 1575, S. 5, Buch 1, Propositio 7. 7 Fermatio, Pascalio: Fermats Beobachtung wurde veröffentlicht als Observatio D. P. F., in: *Diophanti Alexandrini De Multangulis Numeris Liber Unus*, 1670, S. 16 (FO I S. 341). Zuvor hatte Fermat seinen Befund Mersenne in einem Brief von Anfang Juni 1638 (FO II S. 70; CM VII S. 279) mitgeteilt. Im Anschluss an seine eigene Formulierung als Proposition 11 in Bl. PASCAL, *Traité des ordres numériques*, 1665, S. 5 [Marg.] (PO III S. 509–510) verweist Pascal auf Fermats ihm aus der Korrespondenz bekannte Fassung und gibt diese in französischer Übersetzung wieder. Diese Version von Fermats Beobachtung ist die Grundlage für Leibniz' Übersetzung in Z. 8 – S. 209 Z. 3.

majorem producit duplum sui trianguli; idem numerus ductus in ∇^{lum} proxime majoris, producit triplum pyramidis; idem numerus ductus in pyramidem proxime majoris producit quadruplum Triangulo-Triangularis etc. Sed jam video offerri propius theorema ad usum nostrum; nempe consequentiam 12^{mam} tractatus Pascalii de Triangulo Arithmeticico, nempe observat ille, in linea quadam transversa (ipse vocat basin) numerum quendam E , ut 4, esse ad proxime superiorem C , ut 6. ut numerus unitatum CB ad numerum BA sive ut numerus cellularum inferiorum quarum summa E , ad numerum cellularum superiorum quarum infima C .

Itaque sit dimensionis numerus, z , v. g. E . seu 4. numerus unitatum AC seu numerus numerorum transversalium lineae CD est $z+1$. Unde si auferatur BC seu γ , nempe 2 vel

3. vel 4, fiet $z+1-\gamma$, et erit $\frac{\text{Numerus datus}}{\text{ad proxime sequentem in eadem transversali}} \sqcap \frac{\gamma}{z+1-\gamma}$.

Unde si $E \sqcap z$. et quaeratur C , fiet $\frac{C}{z} \sqcap \frac{z+1-\gamma}{\gamma}$ et $C \sqcap \frac{z^2+z-\gamma z}{\gamma}$, ubi $\gamma \sqcap 2$.

et fiet: $C \sqcap \frac{z^2+z-2z}{2} \sqcap \frac{z^2-z}{2}$, et rursus $\frac{F}{C}$ seu $\frac{F}{z^2-z-2} \sqcap \frac{z+1-3}{3}$, sive $F \sqcap$

$$\left. \begin{aligned} &z^4 - 1z^3 \\ &z^3 - 1z^2 \\ &- 2.. + 2z \end{aligned} \right\} \sim 2, 3. \text{ porro } \frac{D}{F} \text{ sive } \frac{D, 2, 3}{.....} \sqcap \frac{z-3}{4} \text{ et fiet } D \sqcap \left. \begin{aligned} &- 2... + 2z^2 \\ &- 3... + 3.. \\ &+ 6.. - 6z \end{aligned} \right\} \sim$$

2, 3, 4 quam formulam si rursus multiplicet per $\frac{z-4}{5}$ fiet:

1 proxime (1) minoris (2) majoris L 3f. ad | idem *gestr.* | usum L 6 numerus (1) BC ad numer (2) | unitatum *erg.* | CB L 9 sit (1) Numerus AC $\sqcap z$. (2) dimensionis (a) z numerus, 4 (b) numerus, L 9 AC (1) est z (2) seu L 10f. 2 | vel *erg.* | 3 L 11 fiet (1) $z-\gamma$ (2) $z+1-\gamma$ L

11 erit (1) $\frac{E}{C} \sqcap (2) \frac{\text{Numerus datus}}{\text{ad ... transversali}}$ (a) ut γ ad (b) $\sqcap \frac{\gamma}{z+1-\gamma}$. L

4 consequentiam 12^{mam}: Vgl. Consequence douziesme in Bl. PASCAL, *Traité du triangle arithmétique*, 1665, S. 7–8 (PO III S. 455–457).

$$\begin{array}{r}
 z^5 - 1z^4 \\
 - 2.... + 2z^3 \\
 - 3.... + 3... \\
 + 6... - 6z^2 \\
 - 4.... + 4... \\
 + 8... - 8.. \\
 + 12... - 12.. \\
 - 24.. + 24z
 \end{array}
 \left. \right\} \cup 2, 3, 4, 5 \sqcap G.$$

5

Hinc patet semper fieri summam $\sqcap 0.$ si sit $z \sqcap 1.$

10 Nimirum, $E \sqcap z$

$$\begin{aligned}
 C &\sqcap z \wedge \frac{z-1}{1} \\
 F &\sqcap \frac{z}{1}, \frac{z-1}{2}, \frac{z-2}{3} \\
 D &\sqcap \frac{z}{1}, \frac{z-1}{2}, \frac{z-2}{3}, \frac{z-3}{4} \\
 G &\sqcap \frac{z}{1}, \frac{z-1}{2}, \frac{z-2}{3}, \frac{z-3}{4}, \frac{z-4}{5}.
 \end{aligned}$$

15 Unde patet hos numeros, ut 1, 5, 10, 10, 5, 1. esse productos continuorum, seu fractionum, quarum numerator decrescit, nominator crescit arithmetice. Unde pendet praxis notabilis Ganierii apud Pascalium pag. 32. tractatus de combinationibus. Observavit Huddenius hoc sane memorabile, si haec series $1 - 2 + 1$ multiplicetur per progressionem Arithmeticam quamcunque, productum semper fieri aequale nihilo. Videamus an 20 propositio sit universalior, sive an sequens

$$\begin{array}{ccccccc}
 & 1 & -3 & +3 & -1. \\
 \text{ducta in} & 1 & 3 & 6 & 10 \\
 \text{faciat productum:} & \hline & +1 & -9 & +18 & -10 & \text{nihilo aequale, idque} \\
 & & & & & & \text{verum est. Hinc illud sequitur memorabile. Si qua sit aequatio quae tres habeat Radices}
 \end{array}$$

9 1. (1) z (2) | I nicht gestr. | 1 (3) | Nimirum, erg. | E $\sqcap z L$ 15 1 | 3, ändert Hrsg. | (1) 30, (2)
10, L 17 notabilis | Domini gestr. | Ganierii L 18 si (1) propositio (2) haec L

17 Ganierii: A. de Gagnières; vgl. Bl. PASCAL, *Combinationes*, 1665, S. 32–33 (PO III S. 586–593).

18 Huddenius: Vgl. J. HUDDDE, *Epistula secunda de maximis et minimis*, 1659, DGS I S. 508.

aequales eam multiplicari posse per numeros triangulares, sive earum generator sit unitas, sive alius quilibet, et nihilominus aequationem manere. Porro aequationes trium radicum aequalium serviunt tum ad inventiones Tangentium parallelarum, et perpendiculariarum, seu maximas et minimas ordinatas; exemplo eorum quae de Conchoeidis puncto flexus apud Schotenium dixit Heuratius. Eodem modo de caeteris sive numeris sive seriebus sive potestatibus facilis est, et sane memorabilis demonstratio.

$$\begin{array}{r} 1 \quad -3 \quad 3 \quad -1 \\ 0 \quad 1 \quad 3 \quad 6 \\ \hline 0 \quad -3 \quad +9 \quad -6 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1 \quad -4 \quad +6 \quad -4 \quad +1 \\ 20 \quad 10 \quad 4 \quad 1 \quad 0 \\ \hline +20 \quad -40 \quad 24 \quad -4 \quad 0 \end{array} \quad \square \quad 0$$

Nota quoniam series transversalis semper finita, perpendicularis infinita, ideo satius 10 multiplicare infinitam per finitam demonstrandi theorematis causa.

Caeterum si multiplicatio instituatur alio modo alia orietur productorum repraesentatio, nempe:

$$\begin{aligned} z &\cap z - 1 \quad \square \quad z^2 - z. \\ z &\cap z - 1 \cap z - 2 \quad \square \quad z^2 - z \cap z - 2 \quad \square \quad z^3 - 2z^2 \\ &\qquad\qquad\qquad - z^2 + 2z \\ z &\cap z - 1 \cap z - 2 \cap z - 3 \quad \square \quad z - 3 \qquad \cap \dots \quad \square \quad z^4 - 3z^3 \\ &\qquad\qquad\qquad - 2z^3 + 6z^2 \\ &\qquad\qquad\qquad - z^3 + 3.. \\ &\qquad\qquad\qquad + 2.. - 6z \end{aligned} \qquad \begin{matrix} 15 \\ 20 \\ 25 \end{matrix}$$

et hoc rursus multiplicando per $z - 4$ fiet:

$$\begin{aligned} z^5 &- 4z^4 \\ &- 3.... + 12z^3 \\ &- 2.... + 8... \\ &- 1.... + 4... \\ &+ 6... - 24z^2 \\ &+ 3... - 12z^2 \\ &+ 2... - 8z^2 \\ &- 6z^2 + 24z \end{aligned} \qquad \begin{matrix} 25 \\ \dots \\ 20 \end{matrix}$$

4 maximas | ad ändert Hrsg. | minimas L 10 finita, (1) altera (2) perpendicularis L

5 apud ... Heuratius: Vgl. Fr. v. SCHOOTEN, *Commentarii*, 1659, DGS I S. 259–262.

Multa in hoc dispositione memoranda, sed quae omnia ex hoc capite pendent, quod nimirum terminus cuiuslibet lineae multiplicatus per 2. vel 3, vel 4, dat sequentem, non ergo considerandi nisi qui lineas incipiunt, hi enim per $1 + 2$ vel $1 + 3$, vel $1 + 4$, etc. multiplicati dant reliquos, sunt autem:

$$\begin{array}{cccccc}
 5 & 1. & \text{vel} & 1 & \text{vel} & 1 \\
 & -1 & & -2 & . & -3 \\
 & & -1 & & -2 & \\
 & & +2 & & -1 & \\
 & & & & . & +6 \\
 10 & & & & +3 & \\
 & & & & +2 & \\
 & & & & . & -6
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{c}
 \text{nempe } 1 \\
 1. \quad 2. \quad 3. \\
 2 \quad 3 \quad 6 \\
 6
 \end{array}$$

Piget adhuc unum calculare, etsi res forte mereatur. Caeterum inspicio apparet hoc calculandi modo non in summa tantum, sed et per partes idem quod ante provenisse.

15 Caeterum summis initis fiunt aequationes:

$1z.$ $1z^2 - 1z$ $1z^3 - 3z^2 + 2z$ $1z^4 - 6z^3 + 11z^2 - 6z$
 et denique: $1z^5 - 10z^4 + 35z^3 - 50z^2 + 24z$. Porro semper numeri cuiuslibet termini inter se juncti sunt aequales nihilo, multiplicetur haec formula, per $z - 5$,

$$\begin{array}{ll}
 16 \quad Am \quad Rand: & 8 \quad \square \quad 8 \\
 & 8 \quad \square \quad 4 + 4 \\
 & 7 \quad \square \quad 4 + 3 \\
 & \quad \quad \quad 3 + 4
 \end{array}$$

3 per (1) $1 + 3$ (a) multiplica (b) vel $1 + 2$, (2) $1 + 2 L$ 5 1. vel (1) $1 - 1$. vel (a) $1 - 2 + (b)$
 $1 - 2$ (2) $1 L$ 13 calculare, (1) credo vero (2) etsi L 19 8 \square (1) $2 \wedge 4$ (2) $8 L$ 18 per (1)
 $- 1 +$
 $z - 4$, fiet:

$$\begin{array}{r}
 z^6 - 10z^5 + 35z^4 - 50z^3 + 24z^2 \\
 - 4\ldots\ldots + 40\ldots - 140\ldots + 200.. - 96z \\
 \hline
 \text{seu } 1z^6 - 14z^5 + 75z^4 - 190z^3 + 224z^2 - 96z.
 \end{array}$$

Ubi notandum omnes (a) te (b) numeros simul sumtos semper aeqvari nihilo. (2) $z - 5$, L

$$\begin{array}{r}
 \text{fiet } \left\{ \begin{array}{rrrrrrr}
 1z^6 & - & 10z^5 & + & 35z^4 & - & 50z^3 & + & 24z^2 \\
 & - & 5. \dots & + & 50. \dots & - & 175. \dots & + & 250 & - & 120z
 \end{array} \right. \\
 \text{seu} \quad \begin{array}{rrrrrrr}
 1z^6 & - & 15z^5 & + & 85z^4 & - & 225z^3 & + & 274z^2 & - & 120z \\
 \mathfrak{X} & & \mathfrak{Z} & & \mathfrak{A} & & 0 & & \mathfrak{A} & & \mathfrak{S}
 \end{array}
 \end{array}$$

Ubi notandum inductione apparere, quod semper crescent cognitae terminorum, usque ad penultimum, qui est omnium maximus; at ultimus rursus decrescit. Termini secundi sunt numeri triangulares, 0. 1. 3. 6. [10.] 15. Termini ultimi, 1. 2. 6. 24. 120. sunt producti numerorum continui deinceps ab unitate, nempe 1. (1, 2) 2. (1, 2, 3) 6. (1, 2, 3, 4) 24. (1, 2, 3, 4, 5) 120.

Sed reliquorum difficilior determinatio, v. g. tertiorum: 2. 11. 35. 85 etc. Patet tamen eos esse quodammodo sumtos ex pyramidalibus, 1. 4. 10. 20. 35. 56. 84. Quarti sunt 6.

2 11 35 85

50. 225. etc. qui quomodo ex Triangulo-Triangularibus deriventur non ita facile judicatur; et opus est prolixis inductionibus ad ista indaganda.

Si in qualibet formula in seriem ipsarum cognitarum seu numerorum inquiramus, omissu ultimo, ut,

$$\begin{array}{ccccccccc}
 1. & 1. & 3. & 1. & 6. & 11 & 1. & 10. & 35. & 50. & 1. & 15. & 85. & 225. & 274 \\
 & 2 & & 5. & 6 & & 9 & 25 & 25 & & 14. & 70 & 140 & 49 \\
 & & & 1 & & & 16 & 0 & & & 56 & 70 & 91
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 15 \quad \text{Am linken Rand:} \quad 7 \\
 \quad \quad \quad \frac{7}{49} \\
 \quad \quad \quad \frac{7}{343} \\
 \quad \quad \quad \frac{7}{2401}
 \end{array}$$

15 Am rechten Rand: $5^0 \cap 3 \sqcap 3$. NB.

14 in (1) qvolibet termino (2) qvalibet L

17 f. 5. 6 . . . 16 0: Einzelne Differenzen sind fehlerhaft. Die Fehler setzen sich in den nachfolgenden Zeilen fort.

Sed his nunc quidem missis redeamus ad nostras formulas generales:

Esto formula quaelibet:

$$\frac{by^z + ca^1y^{z-1} + da^2y^{z-2} + ea^3y^{z-3} + fa^4y^{z-4}}{gy^z + hay^{z-1} + ka^2y^{z-2} + la^3y^{z-3} + ma^4y^{z-4}}$$

Quaeratur ejus differentia a formula quae hoc solo ab ista differat, quod pro y po-

natur $y + \beta$: ut autem res in numeris habeatur et vitetur error calculi, scribemus:

$$\begin{array}{r} 2b \ 625y^{4z} + 7ca125y^{4z-1} + 5da^225y^{4z-2} + 4ea^35y^{4z-3} + 8fa^45^0y^{4z-4} \\ 4 \ 2401 \qquad 5 \ 343 \qquad 8.. \ 49 \qquad + 2.. \ 7 \qquad + 10 \qquad 7^0 \\ \hline 10g5^4y^{4z} + 11ha5^3y^{4z-1} + 13ka^25^2y^{4z-2} + 14la^35y^{4z-3} + 16ma^45^0y^{4z-4} \\ 11 \ 7 \qquad + 13 \ 7 \qquad + 14 \ 7 \qquad + 16 \ 7 \qquad + 17 \qquad 7^0 \end{array}$$

Numerator Termini proxime majoris ejusdem seriei, in qua $y + 4\beta$ ponatur in locum ipsius y , erit:

$$6 \ 2b \ 625y^{4z} + (1) 5 \ (2) 7ca125y^{4z-1} + (a) 4 \ (b) 5 \ L \qquad 6 \ 343 \ (1) 7 \ (2) 8 \ L \qquad 6 \ 13ka^25^2 \ | y^{z-2} \\ ändert Hrsg. | + L \qquad 7 \text{ Numerator erg. } L$$

$$\begin{aligned}
 & 2b5^4y^{4z} + 2b4z4\beta^15^3y^{4z-1} + 2b4\beta^26_{1,2}\frac{z,z-1}{z,z-2}5^2y^{4z-2} + 2b4\beta^34_{1,2}\frac{z,z-1,z-2}{1,2,3}5^1y^{4z-3} + 2b4\beta^41_{1,2,3,4}\frac{z,\dots,z-3}{1,2,3,4}5^0y^{4z-4} \\
 & 4\cdot 7 \quad 4 \cdot \quad 7 \cdot \quad . \quad 4 \cdot \quad . \quad 7 \cdot \quad 4 \cdot \quad \dots \quad 7 \quad 4 \cdot \quad \dots \quad 7 \\
 & + 7ca \dots + 7ca \quad 4\beta^3_{1,2}z-1 \dots + 7ca \quad 4\beta^23_{1,2}\frac{z-1,z-2}{z-1,z-2} \dots + 7ca \quad 4\beta^31_{1,2}\frac{z-1,z-3}{6} \dots \\
 & + 5 \dots \quad 5 \quad 5 \quad 5 \\
 & + 5da^2 \dots + 5da^2 \quad 4\beta^2_{1,2}\frac{z-2}{z-1} \dots + 5da^24\beta^21_{1,2}\frac{z-2,z-3}{2} \dots \\
 & 8 \quad 8 \quad 8 \\
 & + 4ea^3 \dots + 4ea^3 \quad 4\beta^1_{1,2}\frac{z-3}{1} \dots \\
 & \dots \quad 2 \quad 2 \dots \\
 & \dots \quad + 8fa^4 \dots \quad 10 \dots \\
 & \dots \quad \dots
 \end{aligned} \tag{5}$$

10

Nominator ejusdem manet idem, mutatis tantum quibusdam literis, nempe cognitis, scilicet

$$\begin{aligned}
 & 10g \dots + 10g \quad \dots \quad \dots \quad + 10g \quad \dots \quad \dots \quad + 10g \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\
 & 11 \quad 11 \quad 11 \quad 11 \quad 11 \\
 & + 11ha \quad \dots \quad + 11ha \quad \dots \quad \dots \quad + 11ha \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad + 11ha \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\
 & + 13 \dots \quad 13 \quad 13 \quad 13 \\
 & + 13ka^2 \dots \quad \dots \quad \dots \quad + 13ka^2 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad + 13ka^2 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\
 & \quad 14 \quad 14 \quad 14 \\
 & \quad + 14la^3 \dots \quad \dots \quad \dots \quad + 14la^3 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad + 14la^3 \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\
 & \quad \quad 16 \quad 16 \quad 16 \\
 & \quad \quad + 16ma^4 \dots \quad \dots \quad \dots \quad + 16ma^4 \quad \dots \quad \dots \quad \dots
 \end{aligned} \tag{15}$$

20

1 Am Rand: $z, \dots, z-3 \cap z, z-1, z-2, z-3$.

$$\begin{aligned}
 & 1 \quad 2b5^4y^{4z} \quad (1) + 2b4z5^3y^{4z-1} + 2b6_{1,2}\frac{z,z-1}{z,z-2}5^2y^{4z-2} + 2b4_{1,2}\frac{z,z-1,z-2}{1,2,3}5^1y^{z-3} + 2b1_{1,2,3,4}\frac{z,\dots,z-3}{1,2,3,4}5^0y^{4z-4}4.7.4.7..4..7.4\dots74\dots7 + 7ca3_{1,2}z-1 \dots \quad (2) \\
 & 2b4z4\beta^15^3y^{4z-1} L \quad 5 \quad 5da^24\beta^21 |_{1,2}\frac{z-2,z-4}{2} \quad ändert Hrsg. | \dots L \quad 7 \quad 4ea^34\beta^1 |_{1,2}\frac{z-3,z-4}{1} \quad ändert Hrsg. | \dots L
 \end{aligned}$$

Differentia harum duarum fractionum quaerenda esset multiplicatione per crucem, sed cum illa futura sit prolixissima, sufficiet singulos terminos cum aliis de quibus mox loquar, conferendos excerpti.

Terminus summus I $\frac{\pm 2b}{4} \frac{10g}{11} \frac{5y^{(2)4z}}{7}$

5 Numeratoris $\left. \begin{array}{c} 4. \quad 11. \quad 7 \\ \pm \dots \dots \dots \bullet \bullet \bullet \end{array} \right\} \quad \nabla 0 \quad \left. \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right\}$ Unde habemus

Term. II $\frac{\pm 2b}{4} \frac{10g}{11} \frac{4z4\beta}{11ha} \quad \frac{\pm 10g}{11} \frac{2b}{4} \frac{4z4\beta}{7ca} \nabla 0$

10 $\left. \begin{array}{c} 11ha \\ 13 \\ \hline 5 \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{c} 7ca \\ 5 \\ \hline 13 \\ \hline 4 \end{array} \right\}$

demonstrationem Theorematis, de evanescentibus semper duobus Terminis maximis Numeratoris differentiae.

6 Am linken Rand: I $\pm z$. $\pm z$ $\frac{5y^{(2)4z-1}}{7}$ $\pm z, +z-1. \pm z-1, z.$

2 prolixissima, (1) utile erit ea (2) eo (3) sufficiet L 4 summus (1) Numeratoris (2) Numeratoris (a) $+2b10g5y^{(2)4z} \nabla 20n5y^{(2)4z}$ idemque (aa) $+2b \nabla 20n$ (bb) $10g$ (b) $\pm 2b10g5$ (c) I $\pm 2b10g5y^{(2)4z}$ (aa) $\nabla -4.11.7.$ 44 7 +4. 44. 11. 4 11 4.11.7.

I $20n5y^{(2)4z}$ idemque (bb) $\left. \begin{array}{c} L \\ 44 \\ 7 \end{array} \right\} \nabla 0$ 15 (1) 4, 1, 1, 4 $y^{(2)4z-1}$ 3, 2, 2, 1 $y^{(2)4z-2}$ (2) II (3) I $\pm z,$
I $10n5y^{(2)4z}$: ergo $n \nabla 0$ 44 7

$| + z \text{ gestr.} | \pm | z, \text{ gestr.} | z \quad \frac{5y^{(2)4z-1}}{7} \quad \pm z, +z-1. \pm z-1, z. | \text{III } 5y^{(2)4z-2} \quad \pm z, z-2. z-1, z-1 \text{ gestr.} | L$

7 $\pm 2b$ $\frac{10g}{4} \frac{4z4\beta}{11} \frac{5y^{(2)4z-1}}{7} \text{ gestr.} | \pm 10g \frac{2b}{11} \frac{4z4\beta}{4} L \quad 14-217,1 \text{ differentiae.} | \text{Exponentes Term I.}$

$\left. \begin{array}{c} 11ha \\ 13 \\ \hline 5 \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{c} \dots \dots \\ \dots \dots \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{c} 7ca \\ 5 \\ \hline 13 \\ \hline 4 \end{array} \right\}$

(1) $\pm zSA + zIP, , \pm zIP + zSA \nabla 0 \quad T (2) (2) 4z-1 \nabla \pm zSA + zIP, , \pm zIP + zSA \nabla 0 \quad \text{Term II.}$
(2) $4z-2 \nabla \pm erg. u. \text{ gestr.} | \text{ Sed } L$

Sed antequam pergamus, tentemus rescindere laborem calculi inutilem, inde ab initio: ad hoc enim praestandum generales ejusmodi formulae sunt in primis utiles, cum ea ratione plerumque etiam theorematum memorabilia offerantur; nam exempli causa, Methodus Huddeniana de Maximis et Minimis ejusmodi r e s c i s s i o n u m consecarium est, ut Hugenius quoque ex Fermatiana Methodo ostendit.

Itaque formulam Anteriorem, sive sumtam, appellabimus A. Posteriorem seu in qua pro y substituimus $y + \beta$. appellemus P. Numeratorem quia Superior in qualibet formula appellemus S, Nominatorem quia inferior vocemus I. Termini autem qui reperiuntur in AS , vel AI , vel PS , vel PI . nominabuntur ab exponentibus nempe zAS . $z - 1$, AI . $z - 2$, PS etc. Jam primum hos terminos inter se comparabimus: nempe Terminos ipsius P, operae pretium erit explicare per terminos ipsius A. nempe

5

10

3–5 Methodus: J. HUDDA, *Epistolae duae*, 1659, DGS I S. 507–516. 5 Hugenius ... ostendit: Chr. HUYGENS, *Demonstratio regulae de maximis et minimis*, 1667 (Ms., gedr. in *Ouvrages*, 1693, S. 326 bis 330; HO XX S. 228–241).

$$\begin{aligned}
& PS_{\bar{y}^z} \sqcap bASz \\
& . I . g . I . \\
& PS_{\bar{y}^z} - 1 \sqcap bASz \quad \wedge(z) \quad \beta + caASz - 1 \\
& . I . . g . I . . . + ha . I . - . \\
& 5 \quad PS_{\bar{y}^z} - 2 \sqcap bASz \quad \frac{(z, z-1)}{1, 2} \quad \beta^2 + caASz - 1 \quad \frac{(z-1)}{1} \quad \beta + da^2ASz - 2 \\
& . I . . g . I . . . + ha . I . . . + ka^2 . I . . . \\
& PS_{\bar{y}^z} - 3 \sqcap bASz \quad \frac{(z, , z-2)}{1, 2, 3} \quad \beta^3 + caASz - 1 \quad \frac{(z-1, z-2)}{1, 2} \quad \beta^2 + da^2ASz - 2 \quad \frac{(z-2)}{1} \quad \beta + ea^3ASz - 3 \\
& I \quad g \quad I \quad ha \quad I \quad ka^2 \quad I \quad la^3 \quad I \\
& PS_{\bar{y}^z} - 4 \sqcap bASz \quad \frac{(z, , , z-3)}{1, 2, 3, 4} \quad \beta^4 + caASz - 1 \quad \frac{(z-1, , z-3)}{1, 2, 3} \quad \beta^3 + da^2ASz - 2 \quad \frac{(z-2, z-3)}{1, 2} \quad \beta^2 + ea^3ASz - 3 \quad \frac{(z-3)}{1} \quad \beta + fa^4ASz - 4 \\
& 10 \quad I \quad g \quad I \quad + ha \quad I \quad ka^2 \quad I \quad la^3 \quad I \quad ma^4 \quad I
\end{aligned}$$

217,11–218,8 nempe (1) PSz \sqcap ASz | PSz – 1 \sqcap ASz $\wedge(z)$ $\beta + ASz - 1$ (a) PSz – 2 (b) yPSz – 2 (2) PS _{\bar{y}} z \sqcap ASz | PS _{\bar{y}} z – 1 \sqcap ASz $\wedge(z)$ $\beta + ASz - 1$

.I. .I. .I. . .I. . . + .I. . . .I. . . .I. . .I. . . .I. . . + .I. . .

PSz – 3 yPSz – 3

.I .I

$$PS_{\bar{y}^z} - 2 \sqcap ASz \quad \frac{(z, z-1)}{1, 2} \quad \beta^2 + ASz - 1 \quad \frac{(z-1)}{1} \quad \beta + ASz - 2 \quad (3) PS_{\bar{y}^z} L$$

$$PS_{\bar{y}^z} - 3 \sqcap ASz \quad \frac{(z, , z-2)}{1, 2, 3} \quad \beta^3 + ASz - 1 \quad \frac{(z-1, z-2)}{1, 2} \quad \beta^2 + ASz - 2 \quad \frac{(z-2)}{1} \quad \beta$$

$$. I \quad I \quad I \quad I \quad I \quad I$$

Atque ita habemus formulam quae una est ex utilissimis totis Analyseos, continuata enim exhibit generaliter *Explicationem formulae cuiuscunque per binomium*. Unde facile habetur et explicatio trinomii, scilicet explicando rursus ipsam $\beta.$ per binomium; et per consequens habetur explicatio formulae cuiuscunque per polynomium quocunque. Progressiones hic occurunt et harmoniae quoctunque te vertas, et sufficiet inspexisse Tabulam, ad eas advertendas. Quot autem harmoniae, tot deteguntur theorematum generalia omnibus formulis communia, quae manifestum est, ex ipsa combinationum natura suam originem habere.

Illud praeterea notandum est videri posse in hac Tabula sive formula generali vel literas $b c d$ vel exponentes terminorum, ut $ASz \cdot ASz - 1 \cdot ASz - 2$ superfluas, cum una

5

alterae indigitentur: verum usum hunc habet earum conjunctio, ut ex ipsa statim Tabula appareant exponentes pariter et literae. Literae quidem, ut reliquus calculus literarum absolvit possit, exponentes, ut generalia de exponentibus theorematum facilius condantur. Omisi autem numeros probatorios hoc loco, ne formulam plane novam, et per se multiplicem adhuc magis onerarem; praesertim cum in his formulis ipsis numeris probatoriis careri possit; nam ipsae series non interruptae neque dissimiles sibi probationis sunt loco. Operae pretium autem est formulam hanc inventam scribere paulo distinctius, ut ejus constitutio magis oculis objiciatur:

10

15

1 f. Analyseos, (1) exhibet enim (2) | continuata enim *erg.* | exhibet generaliter (a) Potestatem binomii cuiuscunqve (b) *Explicationem L 5 qvocunqve (1) progressio hic occurrit (2) Progressiones L 6 et (1) loco (2) sufficiet L 9 est (1) tametsi (2) videri posse (a) vel literas (b) in L 10 vel (1) series (2) exponentes L 12 appareant (1) series (2) exponentes L 12 literae. (1) Expo (2) Literae L 12 literarum *erg.* L 13 ut (1) reliquus calcul (2) generalia L*

Formula Explicatrix formulae cujuscunque:

$$\begin{array}{ll}
 P \left\{ \begin{array}{l} S \bar{y}^z \\ I \dots \end{array} \right. \cap \left\{ \begin{array}{l} b A \left\{ \begin{array}{l} S z \textcircled{1} \\ I \dots \end{array} \right. \\ g \dots \end{array} \right. & \beta^0 \\
 P \left\{ \begin{array}{l} S \bar{y}^{z-1} \\ I \dots \end{array} \right. \cap \left\{ \begin{array}{l} b A \left\{ \begin{array}{l} S z \textcircled{2} \\ I \dots \end{array} \right. \\ g \dots \end{array} \right. & \beta^1 + \left\{ \begin{array}{l} ca A \left\{ \begin{array}{l} S z - 1 \textcircled{1} \\ I \dots \end{array} \right. \\ ha \dots \end{array} \right. \beta^0 \\
 5 \quad \dots : \dots z^{-2} \cap \dots : \dots : \dots \left(\frac{z, z-1}{1, 2} \right) & \beta^2 + \dots : \dots : \dots \left(\frac{z-1}{1} \right) \beta^1 + \left\{ \begin{array}{l} da^2 A \left\{ \begin{array}{l} S z - 2 \textcircled{1} \\ I \dots \end{array} \right. \\ ka^2 \dots \end{array} \right. \beta^0 \\
 \dots : \dots z^{-3} \cap \dots : \dots : \dots \left(\frac{z, .., z-2}{1, 2, 3} \right) & \beta^3 + \dots : \dots : \dots \left(\frac{z-1, z-2}{1, 2} \right) \beta^2 + \dots : \dots : \dots \left(\frac{z-2}{1} \right) \beta^1 + ea^3 A S z - 3 \textcircled{1} \beta^0 \\
 10 \quad \dots : \dots z^{-4} \cap \dots : \dots : \dots \left(\frac{z, .., z-3}{1, 2, 3, 4} \right) & \beta^4 + \dots : \dots : \dots \left(\frac{z-1, .., z-3}{1, 2, 3} \right) \beta^3 + \dots : \dots : \dots \left(\frac{z-2, z-3}{1, 2} \right) \beta^2 + : \dots : \dots \left(\frac{z-3}{1} \right) \beta^1 + fa^4 A S z - 4 \textcircled{1} \beta^0 \\
 & \qquad \qquad \qquad ma^4 I
 \end{array}$$

Ubi considerandum est simplicissimum constructionis Tabulae fundamentum sumendum esse non tam in perpendiculari aut horizontali etsi hic quoque non desunt harmoniae, sed transversali, ita enim transversaliter habetur: $z \cdot z - 1 \cdot z - 2 \cdot z - 3 \cdot z - 4$. et $\textcircled{1} \textcircled{1} \textcircled{1} \textcircled{1} \textcircled{1}$. || et $\left(\frac{z}{1}\right) \left(\frac{z-1}{1}\right) \left(\frac{z-2}{1}\right) \left(\frac{z-3}{1}\right)$ || $\left(\frac{z, z-1}{1, 2}\right) \left(\frac{z-1, z-2}{1, 2}\right)$.

$\left(\frac{z-2, z-3}{1, 2}\right) \mid \mid \left(\frac{z, , z-2}{1, 2, 3}\right) \cdot \left(\frac{z-1, , z-3}{1, 2, 3}\right) \mid \mid \left(\frac{z, , , z-3}{1, 2, 3, 4}\right)$. Eodem modo crescunt decrescentve transversaliter potentiae ipsarum β et a . Sed et notandum z parentheticum semper tot esse dimensionum, quot β ascriptum, v. g. in $\left(\frac{z, , z-2}{1, 2, 3}\right) \beta^3$, id est

$\left(\frac{z, z-1, z-2}{1, 2, 3}\right) \beta^3$ ductis his in se invicem assurgetur ad (z^3) . ubi notandum est, maximum numerum dividentem, ex his, 1, 2, 3. esse 3. Innumerae id genus observari possent harmoniae sed ut ad rem denique nostram veniamus, examinandum jam est, si formula explicatrix ducatur per crucem in explicatam quid inde proveniat: Nimirum Numerator producti erit \pm Aggregatum Combinationum omnium Terminorum AS cum omnibus Terminis PI , singulorum unius cum omnibus alterius; \pm aggregatum Combinationum omnium Terminorum AI , cum omnibus Terminis PS . Nominator vero: combinationes omnium terminorum AI , cum omnibus PI . Ex his combinationibus eas in unum colligemus, quae ad unum assurgunt ipsius y exponentem z . Et quidem maximus omnium $2z$. Nam combinationibus fiunt multiplicationes quantitatum, et additiones exponentium. Habebimus ergo terminos hos: $2z \cdot 2z - 1 \cdot 2z - 2 \cdot 2z - 3 \cdot 2z - 4 \cdot 2z - 5 \cdot 2z - 6 \cdot 2z - 7 \cdot 2z - 8$. etc. Jam $2z$. componi potest non nisi ex $z + z$, ut scilicet neuter terminorum excedat z . Itaque fiet

$$DS2z \sqcap \pm b AS, z + PI, z \\ \pm g . I . + . S .$$

$$1 \text{ Tabulae erg. } L \quad 4 \left(\frac{z-3}{1}\right) (1) \frac{z-4}{L} (2) || \left(\frac{z, z-1}{1, 2}\right) L \quad 5 \left(\frac{z-1, , z-3}{1, 2, 3}\right) \mid \mid \left(\frac{z, , , z-3}{1, 2, 3, 4}\right)$$

ändert Hrsg. | . Eodem $L = 11$ proveniat: (1) Nimirum facienda sunt omnes Terminorum AS , cum omnibus terminis PI , et contra om (2) Nimirum (a) Nominator (b) Numerator producti erit (aa) Combinat (bb) $\pm L = 14$ Terminorum (1) PI (2) AI $L = 15$ terminorum (1) AS (2) AI $L = 15$ omnibus (1) A (2) PI . $L = 17$ exponentium. (1) Combi (2) habebimus $L = 18$ $2z - 4$. (1) Ex $2z - 5$. $2z - 6$ (2) $2z - 5$. $L = 20$ excedat z . (1) Eodem modo eadem (2), itaqve $L = 21-222,1$ $DS2z \sqcap (1) \pm AS, z + PI, z, \pm AI, z + PS, z$ (2) $\pm AS, z + PI, z$ (3) $\pm b AS, z + PI, z$ (a) nempe terminum superiorem cuius exponens sit $2z$, differi $\pm . I . + . S . \quad \pm g . I . + . S .$

Numer (b) s(-) (c) id est L

Id est in Differentiae parte Superiore seu Numeratore; terminum cuius exponens 2z. componi ex duabus quantitatibus; una Signo † altera Signo + affecta ita ut prior fiat ex ductu termini exponentem habentis z in Anterioris formulae nempe explicandae Superiore parte seu Numeratore reperti; in terminum ejusdem exponentis, z, in PI, seu 5 Posterioris formulae, nempe explicatricis parte Inferiore seu Nominatore reperti. Jam explicando PI, z et PS, z per valores supra inventos, fiet DS2z □ 0.

$$DS, 2z - 1 \square \pm b \ AS, z + PI, z - 1$$

$$\pm g . I . + . S$$

$$\pm ca AS, z - 1 + PI, z$$

$$\pm ha I S$$

10

Ubi rursus explicando PI, z-1. et PI, z per valores supra inventos fiet DS, 2z-1 □ 0.

$$A A$$

3 termini (1) AS (id est anteri (2) exponentem L 3 nempe explicandae erg. L 4 reperti; (1) (-) in (-) (2) In L 7-10 DS, 2z-1 □ (1) † AS, z + PI, z - 1 † AS, z - 1 + PI, z (2) † AS, z + PI, z - 1

$$+ AI, z + PSz . † . I . . + . S . † . I . . + . S$$

$$† AS z - 1 + PI z$$

$$† I S$$

$$(3) † b AS, z + PI, z - 1 L$$

$$† g . I . + . S$$

$$† ca AS z - 1 + PI z$$

$$† ha I S$$

$$DS, 2z - 2 \sqcap \left\{ \begin{array}{l} \dagger b \\ \dagger g \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} S, z \\ I. \end{array} \right. + P \left\{ \begin{array}{l} I, z - 2 \\ S \dots \end{array} \right\}$$

$$\begin{array}{c} : ca \\ ha \end{array} \cdot : z - 1 \boxed{+ \dots : z - 1} \\ \begin{array}{c} : da^2 \\ ka^2 \end{array} \cdot : z - 2 \boxed{+ \dots : z - 0}$$

$$\begin{array}{c} \text{III} \\ \left\{ \begin{array}{l} gAIz \\ b \quad S \end{array} \right. \end{array} \frac{(z, z-1)}{1, 2} \beta^2 + haAIz - 1 \frac{(z-1)}{1} \beta^1 + ka^2AIz \frac{(z-1)}{1} \beta^0 \quad \textcircled{1} \quad \beta^0$$

ca S

$$\begin{array}{c} \text{III} \\ \dots \end{array} \frac{(z)}{1} \beta^1 + \dots \textcircled{1} \beta^0$$

$$\begin{array}{c} \text{II} \\ \dots \end{array} \textcircled{1} \beta^0$$

$$DS, 2z - 3 \sqcap \begin{array}{c} b \\ g \end{array} \cdot : z \boxed{+ \dots : z - 3}$$

$$\begin{array}{c} : ca \\ ha \end{array} \cdot : z - 1 \boxed{+ \dots : z - 2} \\ \begin{array}{c} : da^2 \\ ka^2 \end{array} \cdot : z - 2 \boxed{+ \dots : z - 1} \\ \begin{array}{c} : ea^3 \\ la^3 \end{array} \cdot : z - 3 \boxed{+ \dots : z - 0}$$

$$\begin{array}{c} \text{III} \\ \dots \end{array} \frac{(z, \dots, z-2)}{1, 2, 3} \beta^3 + \dots \frac{(z-1, z-2)}{1, 2} \beta^2 + \dots \frac{(z-2)}{1} \beta^1 + \frac{la^3 A_I}{ea^3 S} \textcircled{z-3} \quad \textcircled{1} \quad \beta^0$$

$$\begin{array}{c} \text{IV} \\ \dots \end{array} \frac{(z, z-1)}{1, 2} \beta^2 + \dots \frac{(z-1)}{1} \beta^1 + \dots \textcircled{1} \beta^0$$

$$\begin{array}{c} \text{III} \\ \dots \end{array} \frac{(z)}{1} \beta^1 + \dots \textcircled{1} \beta^0$$

$$DS, 2z - 4 \sqcap \begin{array}{c} b \\ g \end{array} \cdot : z \boxed{+ \dots : z - 4}$$

$$\begin{array}{c} : ca \\ ha \end{array} \cdot : z - 1 \boxed{+ \dots : z - 3}$$

$$\begin{array}{c} : da^2 \\ ka^2 \end{array} \cdot : z - 2 \boxed{+ \dots : z - 2}$$

$$\begin{array}{c} : ea^3 \\ la^3 \end{array} \cdot : z - 3 \boxed{+ \dots : z - 1}$$

$$\begin{array}{c} : fa^4 \\ ma^4 \end{array} \cdot : z - 4 \boxed{+ \dots : z - 0}$$

$$\begin{array}{c} \text{III} \\ \dots \end{array} \frac{(z, \dots, z-3)}{1, 2, 3, 4} \beta^4 + \dots \frac{(z-1, \dots, z-3)}{1, 2, 3} \beta^3 + \dots \frac{(z-2, z-3)}{1, 2} \beta^2 + \dots \frac{(z-3)}{1} \beta^1 + \frac{ma^4 A_I}{fa^4 S} \textcircled{z-4} \textcircled{1} \beta^0$$

$$\begin{array}{c} \text{III} \\ \dots \end{array} \frac{(z, \dots, z-2)}{1, 2, 3} \beta^3 + \dots \frac{(z-1, z-2)}{1, 2} \beta^2 + \dots \frac{(z-2)}{1} \beta^1 [+] \dots \textcircled{1} \beta^0$$

$$\begin{array}{c} \text{IV} \\ \dots \end{array} \frac{(z, z-1)}{1, 2} \beta^2 + \dots \frac{(z-1)}{1} \beta^1 + \dots \textcircled{1} \beta^0$$

$$\begin{array}{c} \text{III} \\ \dots \end{array} \frac{(z)}{1} \beta^1 + \dots \textcircled{1} \beta^0$$

$$\begin{array}{c} \text{II} \\ \dots \end{array} \textcircled{1} \beta^0$$

12 f. $\boxed{+ \dots : z - 1} | \boxed{\dots \frac{(z)}{1} \beta^1}$ ändert Hrsg. | $+ \boxed{\dots \textcircled{1} \beta^0} : | \frac{fa^4}{ma^4} erg. | \dots : z - 4 | + \dots : z - 0$ ändert Hrsg. | $\boxed{\dots \textcircled{1} \beta^0} L$

$$\begin{aligned}
 DS, 2z - 5 \sqcap & \quad \begin{array}{c} b \\ \hline g \end{array} : z + \cdots : z - 5 \\
 & \begin{array}{c} ca \\ ha \end{array} : z - 1 + \cdots : z - 4 \\
 & \begin{array}{c} da^2 \\ ka^2 \end{array} : z - 2 + \cdots : z - 3 \\
 & \begin{array}{c} ea^3 \\ la^3 \end{array} : z - 3 + \cdots : z - 2 \\
 & \begin{array}{c} fa^4 \\ ma^4 \end{array} : z - 4 + \cdots : z - 1 \\
 & : \cdots : z - 5 + \cdots : z - 0 \\
 DS, 2z - 6 \sqcap & \quad \begin{array}{c} \hline z + \cdots : z - 6 \\ \hline z - 1 + \cdots : z - 5 \end{array} \\
 & \begin{array}{c} da^2 \\ ka^2 \end{array} : z - 2 + \cdots : z - 4 \\
 & \begin{array}{c} ea^3 \\ la^3 \end{array} : z - 3 + \cdots : z - 3 \\
 & \begin{array}{c} fa^4 \\ ma^4 \end{array} : z - 4 + \cdots : z - 2 \\
 & : \cdots : z - 5 + \cdots : z - 1 \\
 & : \cdots : z - 6 + \cdots : z - 0 \\
 DS, 2z - 7 \sqcap & \quad \left\{ \begin{array}{l} \dagger \quad A \left\{ S, z + P \left\{ I z - 7 \right. \right. \\ \dagger \quad . \quad \left. \left. \right\} S \dots \right. \\ \vdots \quad . \quad : z - 1 + \cdots : z - 6 \\ \vdots \quad . \quad : z - 2 + \cdots : z - 5 \\ \begin{array}{c} ea^3 \\ la^3 \end{array} : z - 3 + \cdots : z - 4 \\ \begin{array}{c} fa^4 \\ ma^4 \end{array} : z - 4 + \cdots : z - 3 \\ : \cdots : z - 5 + \cdots : z - 2 \end{array} \right. \\
 15 & \\
 20 &
 \end{aligned}$$

14 Darüber: Plag. 2. Schediasmatis de formulis omnium Dimensionum

$$\begin{aligned}
 1 \frac{b}{g} erg. L & \quad 2 \frac{ca}{ha} erg. L \quad 3 \frac{da^2}{ka^2} erg. L \quad 4 \frac{ea^3}{la^3} erg. L \quad 5 \frac{fa^4}{ma^4} erg. L \quad 9 \frac{da^2}{ka^2} erg. L \\
 10 \frac{ea^3}{la^3} erg. L & \quad 11 \frac{fa^4}{ma^4} erg. L \quad 13 \frac{\cdots z - 6 + \cdots}{\cdots z - 0} | \text{vide seq plag gestr.} | DS, 2z - 7 L \\
 18 \frac{ea^3}{la^3} erg. L & \quad 19 \frac{fa^4}{ma^4} erg. L
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccccccc}
& : & \cdot & : & z - 6 + & : & z - 1 \\
& : & \cdot & : & z - 7 + & : & z - 0 \\
DS, 2z - 8 \sqcap & : & \cdot & : & z + & : & z - 8 \\
& : & \cdot & : & z - 1 + & : & z - 7 \\
& : & \cdot & : & z - 2 + & : & z - 6 \\
& : & \cdot & : & z - 3 + & : & z - 5 & 5 \\
& fa^4 & & & & & \\
& ma^4 & : & z - 4 + \cdot & : & z - 4 & \\
& : & \cdot & : & z - 5 + & : & z - 3 \\
& : & \cdot & : & z - 6 + & : & z - 2 \\
& : & \cdot & : & z - 7 + & : & z - 1 & 10 \\
& : & \cdot & : & z - 8 + & : & z - 0
\end{array}$$

Ista assumptio ipsius z . hunc habet usum, ut ipse exponens dimensionis pro arbitrio sumi, et ita problemata alioquin insolubilia forte solvi possint. Hac enim ratione efficitur, ut exponens dimensionis ingrediatur ipsas quantitates. Efficere praeterea possumus, ut cessent omnes destructiones, si scilicet in Nominatore seu I exponens non sit z ut in Numeratore seu S . verum aliis, v. g. μ . Ita enim etsi aliquae eveniant destructiones, operae pretium tamen erit eas dissimulare, et sine destructione relinquere; cum duae ita in cuiuslibet differentiae Termini quantitate cognita habeantur series, una pendens a z . altera ab μ . et una quaeque valde regularis et simplex, pendens a numeris combinatoriis.

Nota si sit exponens, e. g. $\sqrt{3}$. $\sqcap z$ v. g. $y^{\sqrt{3}}$. et pro y velis ponere $x + \beta$ videamus quomodo $x + \beta$ multiplicari possit in se secundum exponentem $\sqrt{3}$ sane si secundum regulam quandam generalem binomialium scribas, ut supra; continuanda erit in infinitum operatio. Nam faciendo $z - 1$ $z - 2$ $z - 3$. etc. patet jam 2 esse \sqcap quam z adeoque exponentes fieri nihilo minores; exponentes autem nihilo minores significant divisiones loco multiplicationum; poterit ergo in infinitum continuari progressio; et vicissim seriei hujus infinitae summa erit binomii potentia secundum exponentem z . Itaque si z non sit numerus rationalis, explicatio, subtrahendo ab exponente, unitates fiet semper infinita. Et ecce novam accessionem ad doctrinam de summa serierum infinitarum. Sed quid si


$7 \frac{fa^4}{ma^4} \text{ erg. } L \quad 12 \text{ ut (1) } \langle - \rangle \text{ (2) ipse (a) pro (b) exponens (aa) aequationis (bb) dimensionis } L$
14 qvantitates. (1) Ingrediamur (2) Inqviramus itaqve in (a) qvanti (b) formulam, cuius differentia (aa)
sit $\frac{1}{y^2 + \frac{\beta}{2}y *}$ (bb) sit ea (aaa) $y^z +$ (bbb) $\frac{by^z + cay^{z-1}}{y^2 + \frac{\beta}{2}y *}$ (3) Efficere $L \quad 18$ in (1) qvalibet (2)
cuiuslibet differentiae (a) Cogni (b) Termini $L \quad 23$ jam (1) $z - 2$ (2) $z - 0$ (3) $2 L$

ipsam z hoc loco $\sqrt{3}$ dividis in partes aequales pro arbitrario, v. g. $\frac{z}{3}$, aut si numerum partium aequalium definire nolis initio: $\frac{z}{\mu}$. fiet enim $z - \frac{z}{\mu}$. $z - \frac{2z}{\mu}$ etc. et μ erit numerus rationalis.

Quid si μ sit numerus irrationalis non video commodum exprimendi modum, quemadmodum et nondum video rationem explicandi binomium, ope exponentis secti in partes inaequales. Illud primo in numeris experiendum, et inde ad caetera traducendum foret: Caeterum ex his in mentem venit, etiam rationalium exponentium potestates explicari posse binomiis infinitis, nempe si sit: $y^{z-\mu} y^{z-2\mu} \dots y^{z-3\mu}$. pone z . et μ . sive rationales sive irrationales esse inter se incommensurabiles aut certe multiplicatos per numeros naturales uno μ , nunquam productum alteri z . coincidere; tunc certe in infinitum producetur explicatio. Ut autem finita sit explicatio non est necesse ipsam μ esse unitatem, sed tantum ipso z . commensurabilem per numerum naturalem. Sed quid si jam longius adhuc progrediamur, et loco $-\mu - 2\mu - 3\mu$, adhibeamus: $-2\mu - 4\mu - 6\mu, -8\mu$. vel etiam incipiendo aliter. $-\mu - 3\mu - 5\mu - 7\mu$. ubi quaeritur an semper incipiendum sit necessario ab unitate, et an intervallum sumi possit quodlibet.

Nimirum Tabula numerorum combinatoriorum condi potest, non tantum etsi generator non sit unitas, sed etiam etsi sit numerus irrationalis. Finge jam aliud: in Tabula quadam numerorum combinatoriorum quaeri medios, aut bimedios, aut trimedios etc. Sed et finge continua ejusmodi mediarum interpositione describi lineas combinatorias, quibus repraesentantur numerorum figuratorum progressiones. Videndum an secundo has lineas in partes inaequales, sed invicem respondentes binomiorum tamen potestates exprimi queant. Tantum sumendum est Triangulum Arithmeticum et in partes inaequales secundum, etc. Ut autem ista universaliter demonstrentur; dividenda quaelibet potestas in infinitas ratiunculas; et ostendendum ista coincidere cum lineis istis combinatoriis.

1 $\frac{z}{3}$, (1) seu $\frac{\sqrt{3}}{3}$ item qvid si (2) aut L 6 f. foret: (1) nempe y^4 (2) Caeterum L 8 pone (1) μ esse numerum vel (2) $z L$ 9 incommensurabiles (1) usus aut certe multiplicatione (2) aut L 9 f. numeros (1) num (2) naturales (a) nunqva (b) uno L 20 qvibus | repraesentur ändert Hrsg. | (1) numeris figuratis (2) numerorum L 24 cum (1) numeris (2) lineis (a) figurarum (b) istis L



[Fig. 1]

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$										
$\frac{1}{2}$	1	1	1	1	1	1					
$\frac{1}{2}$		$\frac{3}{2}$									
$\frac{1}{2}$	1	2	3	4							5
$\frac{1}{2}$		$\frac{5}{2}$									
$\frac{1}{2}$	1	3	6								
$\frac{1}{2}$		$\frac{7}{2}$									
$\frac{1}{2}$	1	4									
$\frac{1}{2}$											10
$\frac{1}{2}$	1										

Nimirum manifestum est, si generator non sit unitas sed $\frac{1}{2}$ et ita porro subdividendo in infinitum. Adeoque intelligi potest sumto quolibet generatore, si modo unus coincidat coincidere omnes.

$$3 \frac{1}{2} (1) 0 (2) 1 L \quad 5 \frac{1}{2} (1) 0 (2) 1 L \quad 7 \frac{1}{2} (1) 0 (2) 1 L \quad 9 \frac{1}{2} (1) 0 6 (2) 1 L$$

2–11 $\frac{1}{2} \dots 4 \frac{1}{2} \frac{1}{2} 1$: Leibniz versucht, durch Interpolation ein Pascalsches Dreieck mit Basis $\frac{1}{2}$ aus einem Dreieck zur Basis 1 zu erzeugen. Dafür müsste er eigentlich nur wie in S. 233 Z. 2–6 bei allen Einträgen des Dreiecks mit Basis 1 den Nenner $\frac{1}{2}$ ergänzen.

Esto ergo Theorema: Figura combinatoria quaelibet coincidit cuilibet, quicunque sit generator, modo unitas sit eadem: Hinc etsi diversa sit unitas omnia tamen proportionalia sunt, sive, diversae Figure Combinatoriae sunt similes inter se. Figure autem Combinatoria voco, cuius curva transit per extremitates omnium rectarum numeros 5 combinatorios, secundum ordines numericos repraesentantium, adhibita interpolatione indefinite continuata. Si interpolatio in infinitum absvoli intelligatur, et Figure Combinatoriae reddantur Geometricae (: hactenus enim non nisi Arithmeticae sunt, desinent: Triangulares in parabolam; pyramidales in paraboloidem cubicam simplicem; et caetera in paraboloides simplices altiores [:]).

10 In transversali Tabulae Combinatoriae, ut *H. E. C. F. D. G.* terminus quilibet, ut *E* est ad proxime superiorem, ut numerus inferiorum cum ipsa *E*, ad numerum superiorum cum ipsa *C*. sive ut numerus ordinis ipsius inferioris *E*, ad exponentem ordinis ipsius superioris *C*. nempe ut numerus ipsarum *H. E*, nempe 2, ad numerum ipsarum *C. F. D. G.* nempe 4. Summa ergo semper numerus terminorum lineae transversalis hoc loco 15 6.

Itaque si omnes sequentes, ab aliqua praecedente vel superiore vel inferiore deriventur, et intervallum ordinis primi, quod hoc loco per unitatem repraesentatur appelletur β , et numerus omnium terminorum lineae transversalis vocetur q , tunc uno ex terminis cuius ope scilicet alii investigandi sunt, appellato z , fiet Terminus sequens ad hunc h , ut

1 quaelibet | concidit ändert Hrsg. | cuilibet, L 4f. numeros (1) Triangul (2) combinatorios L 5f. interpolatione (1) in infinitum continuata (2) indefinite L 7f. sunt, (1) | degenerabunt in nicht gestr. | (2) desinent L 8 cubicam | (1) puram (2) simplicem erg. |; et L 9 paraboloides (1) altiores (2) simplices L 10 In (1) basi (2) transversali L 10 G. (1) num (2) terminus L 11 proxime (1) seqventem, ut (2) superiorem, (a) | ut nicht gestr. | (aa) G (bb) C (b) ut L 12 ut (1) exponentis ordinis (2) numerus ordinis (a) demto (un) (b) pri (c) inferioris (d) ipsius L 19 fiet (1) z (2) ut (a) terminus seqvens, ad hunc; ut z , sive hic ipse ad $q - z$ adeoque: Terminus seqvens $\sqcap \frac{z^2}{q - z}$, et terminus tertius seu seqvens seqventem, ad seqventem $z^2 \cup q - z$, ut ipse seqvens $z^2 \cup q - z$, ad $q, -z^2 \cup q - z$, sive seqvens seqventem $\sqcap \frac{z^4}{q^2 - 2qz + z^2} \cup \frac{q^2 - qz - z^2}{q - z} \sqcap (aa) z^4 \cup q - z \cup qz (bb)$ $z^4 \cup q - z \cup q^2 - qz - z^2 \sqcap z^4 \cup q^3 - q^2z \boxed{- qz^2} - z^3 \sqcap z^4 \cup q^3 - 2q^2z - z^3$ et ita porro. tamque $- q^2z \boxed{+ \dots}$ (aaa) harum (bbb) intelligi (aaaa) posset (bbbb) possit a termino | quodam in medio sumto vel descendit vel ascendi tunc judicari potest duplum semper esse valorem harum Quantitatum. Dazu, nicht gestr. Imo, video me committere errorem hoc de quolibet termino enuntiando, (aaaaa) cum sit verum, (bbbb) falsum est enim (ccccc) sic ergo redinchoandum: | (b) Terminus L

p ad q – p adeoque terminus sequens $\sqcup hp \cup q – p$. et sequens sequentem, ad sequentem $hp \cup q – p$, ut $p \neq \beta$ ad $q – p \neq \beta$ adeoque sequens sequentem erit $\sqcup hp^2 \neq hp\beta \cup q – p \cup q – p \neq \beta$. Ascenditur autem vel descenditur, prout $q – p$, vel p inferior aut superior, et prout \neq . significat + aut –. Si h sit $\sqcup z$. seu primi ordinis tunc h et q differunt unitate ipsius β . Itaque z adhibere utilius; itaque notandum priora resumi posse, modo pro 1, ponamus

1β , unde fiet v. g. $E \sqcup \frac{z}{1}$. $C \sqcup \frac{z, \hat{z} - 1\beta}{1, 2}$, $D \sqcup \frac{z, z - 1\beta, z - 2\beta}{1, 2, 3}$ etc. Itaque si sit

potestas: y^z . possumus z resolvare in quotcunque β inter se aequales, vel in numeros, vel in alias quantitates rationales vel surdas, vel fractas, ut si z sit 2, seu $y^z \sqcup y^2$, ponendo $y \sqcup x + \gamma$ binomium hoc quadratice in se multiplicatum erit, etiamsi non scribatur:

$x^2 + 2\gamma x + \gamma^2$, sed v. g. pro 1. sumatur $\frac{1}{2} \sqcup \beta$ unde binomii hujus quadratum erit

compositum ex quatuor terminis, nempe fiet: $y^2 \sqcup \frac{1}{2}x^{\frac{4}{2}} + \frac{4}{2}\gamma^{\frac{1}{2}}x^{\frac{3}{2}} + \frac{6}{2}\gamma^{\frac{2}{2}}x^{\frac{2}{2}} + \frac{4}{2}\gamma^{\frac{3}{2}}x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}\gamma^{\frac{4}{2}}$.

Unde facile intelligi potest, eodem modo etiam explicari posse per binomia, potestatem cuius exponentis est irrationalis, v. g. $\sqrt{2}$. dividendo eam in partes quotcunque aequales. Horum omnium veritas tum numeris tum calculo explicari debet. Prioris et calculo et in numeris, posterioris non nisi in numeris. Notandum vero hanc formulam in qua exponentis fractus, semper reduci posse ad formulam exponentium integrorum, ope aequationis; sed si exponentes sint irrationales, non videre me modum reducendi ad ordinarios, utcunque formetur aequatio.

Illud tantum superest excutiendum, an aliqua ratione sive arte possint ipsae β . esse inaequales, ut scilicet necesse non sit exponentes crescere vel decrescere aequaliter.

Caeterum valor ipsius y^2 , ita more Communi expressus, daret: $y^2 \sqcup \frac{1}{2}x^2 + 2\sqrt{x^3\gamma} + 3\gamma x + 2\sqrt{\gamma^3 x} + \frac{1}{2}\gamma^2$. quod facile in numeris experiri licebit, modo x et γ intelligentur

1 seqvens (1) $\sqcup p \cup q – p$ (2) $\sqcup hp \cup q – p$ L 8 rationales | sive fra erg. u. gestr. | vel L
 8f. $y^z \sqcup y^2$, (1) mu (2) ponendo (a) $y \sqcup x + \beta$ (b) $y \sqcup x + \gamma$ L 9 hoc (1) cubice (2) quadratice L 9f. scribatur: (1) y^2 (2) $x^2 +$ (a) 2β (b) $2\gamma x + \gamma^2$ L 10 pro 1. (1) compon (2) sumatur L 10 unde (1) binomium (2) binomii | huius quadratum erg. | erit L 11 fiet: (1)
 $y^2 \sqcup \frac{1}{2}\beta x^{\frac{4}{2}} + \frac{6}{2}\beta^{\frac{1}{2}}x^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{2}\beta^{\frac{4}{2}}x^{\frac{4}{2}}$ (2) $y^2 \sqcup \frac{1}{2}\beta x^{\frac{4}{2}} + \frac{4}{2}\beta^{\frac{1}{2}}x^{\frac{3}{2}} + \frac{6}{2}\beta^{\frac{4}{2}}x^{\frac{4}{2}} + \frac{4}{2}\beta^{\frac{2}{2}}x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}\beta^{\frac{4}{2}}$ (3) $y^2 \sqcup \frac{1}{2}\gamma x^{\frac{4}{2}}$ (4)
 $y^2 \sqcup \frac{1}{2}x^{\frac{4}{2}} + \frac{4}{2}\gamma^{\frac{1}{2}}x^{\frac{3}{2}} + \frac{6}{2}\gamma^{\frac{2}{2}}x^{\frac{2}{2}} + \frac{4}{2}\gamma^{\frac{3}{2}}x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}\gamma^{\frac{4}{2}}$ L 13 partes | qvocunqve ändert Hrsg. | aeqvales L
 21 daret: (1) 1γ (2) $\frac{1}{2}x^2 + (a)2x^3(b)2x\sqrt{x\gamma} + 3\gamma x + 2y^2\sqrt{x\gamma}$ (3) $y^2 \sqcup L$

esse numeri quadrati, nempe sit $x \sqcap 9$. et $\gamma \sqcap 4$, fiet: $y \sqcap x + \gamma \sqcap 9 + 4 \sqcap 13$. Jam $13 \wedge 13 \sqcap 39$. Unde

$$\begin{aligned} & \frac{13}{169} \\ & y^2 \sqcap \frac{1}{2}x^2 + 2x\sqrt{x\gamma} + 3\gamma x + 2\gamma\sqrt{\gamma x} + \frac{1}{2}\gamma^2 \\ & 169 \quad \frac{81}{2} \sqcap 40\frac{1}{2} + 2 \wedge 9\sqrt{36} \sqcap 108 + 108 + 2 \wedge 4 \wedge 6 \sqcap 48 + 8. \quad \text{Sed} \end{aligned}$$

5 hic calculus non consentit.

Ideoque rei investigandae causa scribamus: $bx^2 + cx\sqrt{x\gamma} + d\gamma x + e\gamma\sqrt{\gamma x} + f\gamma^2 \sqcap ax^2 + 2a\gamma x + a\gamma^2$. et junctis in unum irrationalibus caeterisque ordinatis:

$$B \left\{ \begin{array}{l} + b x^2 \\ - a \dots \end{array} \right. D \left\{ \begin{array}{l} + d \gamma x \\ - 2a \dots \end{array} \right. F \left\{ \begin{array}{l} + f \gamma^2 \\ - a \dots \end{array} \right. - c x \sqrt{x\gamma} - e\gamma \dots$$

10 et quadrando,

$$\begin{aligned} & B^2 x^4 + 2BD x^3\gamma + 2BF x^2\gamma^2 \\ & \quad + D^2 \dots + 2DF x\gamma^3 + F^2 \gamma^4 \sqcap 0. \\ & \quad - c^2 \dots - 2ce \dots - e^2 \dots \end{aligned}$$

Jam ponatur $b \sqcap f$. adeoque $B \sqcap F$. item $c \sqcap e$. quod ex ipsa calculi natura pendet,
15 cum enim x et γ . sint indefinita, altera pro altera sumi potest, neque ulla diversitatis ratio intelligi potest, cum non nisi situ sive ordine varient, idem enim est $x + \gamma$. et $\gamma + x$. quare et quadrata eorum eadem, aequatio ergo et pro F ponendo B , et pro e ponendo c , ita stabit

4 Am Rand:

$$\begin{array}{r} 2 \\ 9 \quad 18 \quad 36 \\ \hline 6 \quad \frac{6}{108} \quad \frac{3}{108} \end{array}$$

1 fiet: (1) $y \sqcap x + 9$ (2) $y \sqcap x + \gamma$. L 4 169 (1) $\frac{96}{2} \sqcap 48$ (2) $\frac{81}{2} \sqcap 40\frac{1}{2}$ L 14 ponatur (1)
B \sqcap F. (2) b \sqcap f. L 17 ergo (1) per B^2 sive F^2 divisa, (2) (eas) ponendo (3) et pro (a) f b (b) F L

$$\begin{array}{l} B^2 x^4 \left\{ \begin{array}{l} + 2BD x^3\gamma + 2B^2 x^2\gamma^2 + 2BD x\gamma^3 + B^2 \gamma^4 \\ \quad + D^2 \\ - c^2 \dots - c^2 - c^2 \end{array} \right. \end{array} \odot$$

Jam haec aequatio cum alia simili ejusdem valoris conferatur, scilicet: $x^2 + 2x\gamma + \gamma^2$, ducatur in $x^2 + \frac{h}{a}x\gamma + \gamma^2$. productum ducatur in B^2 , fiet:

$$\begin{aligned} & B^2 x^4 + 2B^2 x^3\gamma + B^2 x^2\gamma^2 \\ & + B^2 \frac{h}{a} \dots + 2 \frac{B^2 h}{a} \dots + \frac{B^2 h}{a} x\gamma^3 \\ & \quad + B^2 \dots + 2B^2 \dots + B^2 \gamma^4 \end{aligned} \quad \text{D.}$$

Hanc formulam priori non similem tantum sed et coincidentem esse, intelligi potest, si fingamus formulam $bx^2 + cx\sqrt{x}\gamma$ etc. esse aequationem duarum radicum aequalium potius, quam formulam quadrati binomii. Unde suffecerit eam potius aequalem poni nihilo quam alteri $ax^2 + 2ax\gamma + a\gamma^2$ adeoque omissa a. ponemus B et b , vel D vel d , et F vel f . aequales. Aequationes ergo collatitiae oriuntur duae, una, per quam $D \sqcap \frac{2B^2a + B^2h - c^2a}{2Ba}$. adeoque

$$\begin{aligned} & D^2 \sqcap + 4a^2 B^4 \underbrace{\left(-4a^2 B^2 c^2 \right)}_{\text{III}} + a^2 c^4 \cup 4B^2 a^2 \\ & \quad \boxed{+ \frac{4ah}{\text{II}}} - 2ah \\ & \quad + h^2 \end{aligned} \quad 15$$

quem valorem inserendo alteri collatitiae, fiet:

$$\begin{aligned} & \boxed{8B^4 a^2} \boxed{+ 4a^2 B^2 c^2} \boxed{- 4B^4 ha} \dots \sqcap 0. \\ & \quad \boxed{- 8\dots} \end{aligned} \quad 20$$

4 scilicet: (1) $ax^2 + 2ax\gamma + a\gamma^2$, (2) $x^2 + 2x\gamma + \gamma^2$ L 5 in | h gestr. | $x^2 + \frac{h}{a}x\gamma + \gamma^2$. (1) fiet:

(2) productum L 9 priori (1) et (2) non L 13 collatitiae erg. L

3 $-c^2 \dots - c^2 - c^2$: Hier und im Folgenden bis S. 232 Z. 2 treten einzelne Verschreibungen und kleinere Versehen bei den Umformungen auf, die sich auf die Bestimmung der Gleichungen von S. 232 Z. 10–12 auswirken.

Habemus ergo inventas aequationes duas, unam $D \sqcap 2aB^2 - ac \cup 2aB$, alteram:
 $+ h$

$h^2 - \frac{2c^2a}{B^2}h + \frac{a^2c^2 + 4a^2B^4}{B^2} \sqcap 0$. Unde duae habebuntur arbitriae, nempe B . et c . quas determinare licebit, si cogitemus si velimus habere qualitatem numerorum combinatoriorum, ut scilicet, ex duobus primo β , ut alias pro Tabula combinatoria appellavimus,
5 sive ut hoc loco vocabimus b ; et secundo antea appellato z , hoc loco vero c , caeteri sequantur, proxime scilicet sequentem nempe D (quem supra appellaveramus c) faciendo $\frac{z, z - \beta}{1, 2}$. Imo praeterea necesse est hoc loco c (supra D) seu $\frac{z, z - 1\beta, z - 2\beta}{1, 2, 3}$ aequari ipsi \underline{c} hoc loco \underline{z} , ut scilicet numerorum combinatoriorum natura servetur, Denique necesse est ipsam b (supra β) aequari ipsi f sive per numerorum combinatoriorum naturam,
10 ipsi $\frac{z, z - 1\beta, z - 2\beta, z - 3\beta}{1, 2, 3, 4}$. Habemus ergo aequationes: $D \sqcap 2aB^2 - ac \cup 2aB$, et
 $+ h..$

$h^2 - \frac{2c^2a}{B^2}h + \frac{a^2c^4 + 4a^2B^4}{B^2} \sqcap 0$ et $D \sqcap \frac{c, c - B}{1, 2}$ et $c \sqcap \frac{c, c - B, c - 2B}{1, 2, 3}$, et denique $B \sqcap \frac{c, c - B, c - 2B, c - 3B}{1, 2, 3, 4}$. Quae aequationes cum sint numero quinque, incognitae autem sint D , h , c , B adeoque quatuor tantum, hinc praesumendum est calculum esse impossibilem, nisi theorema subsit, cuius subtilitate ipsa rerum natura calculo consu-
15 luisse putanda sit. Itaque si nihil aliud hoc scilicet ex ejusmodi inquisitione discemus, an scilicet Numerorum Combinatoriorum Tabulam interpolatam potestatis exponentium fractorum accommodare possibile sit, nam si de fractis impossibilitas detegatur, non erit cur de surdis laboremus.

4 f. appellavimus, (1) hoc (2) hoc loco vero b. (3) sive L 6 f. faciendo (1) $z -$ (2) $\frac{z, z - \beta}{1, 2}$ (a)

incognitas ergo habemus D (supra c) B (supra β) c (supra z) (b) Imo L 7 loco (1) e \sqcap c (2) $c | \sqcap$ nicht gestr. | (supra (a) z (b) D) (aa) aeqvari (bb) seu L 9 ipsi f (1) hoc loco (2) sive L 11 C \sqcap (1) $\frac{z, z - 1}{1, 2, 3}$ (2) $\frac{C, C - B, C - 2B}{1, 2, 3}$, L 14 subsit, (1) in qvo ipsa na (2) cuius L 16 Tabulam (1)

Subsectione (2) interpolatam L 17 fractis (1) spes non (2) impossibilitas L

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	
$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{4}{2}$		
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{6}{2}$			
$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{2}$				
$\frac{1}{2}$					

5

Si $y \sqcap x + \gamma$. deberet esse

$$y^{\frac{4}{2}} \sqcap + \frac{1}{2}x^{\frac{4}{2}} + \frac{4}{2}x^{\frac{3}{2}}\gamma^{\frac{1}{2}} + \frac{6}{2}x^{\frac{2}{2}}\gamma^{\frac{2}{2}} + \frac{4}{2}x^{\frac{1}{2}}\gamma^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2}\gamma^{\frac{4}{2}}$$

Sed hoc esse absurdum facile judicari potest, quia ponendo x . et γ numeros esse quadratos, et x imparem et γ parem vel contra; patet non posse non summam esse numerum fractum, cum tamen $y^{\frac{4}{2}}$ sit numerus integer, nisi velis aequationem esse inter $\frac{1}{2}y^{\frac{4}{2}}$ et $\frac{1}{2}x^{\frac{4}{2}} + \frac{4}{2}x^{\frac{3}{2}}\gamma^{\frac{1}{2}}$ etc. quemadmodum $1y^2 \sqcap 1x^2 + 2x\gamma + 1\gamma^2$. Sed nec sic res procedet, fiet enim binomium istud nimis magnum; itaque haec Tabulae Combinatoriae interpolatio locum non habet, per $\frac{1}{2}$.

Generaliter quaestio eo redit, magnitudinis datae potentiam datam, datis magnitudinis et potentiae partibus exprimere. Quod si res per numeros combinatorios exitum reperire non potest, quaerendi sunt alii ope methodi supra praescriptae, per aequationes similes, et inductione aliquot casuum facta. Construatur Tabulae species, quae forte et ad irrationalia poterit extendi.

3 $\frac{1}{2}$ (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{2}{2}$ L 4 $\frac{1}{2}$ (1) $\frac{3}{4}$ (2) $\frac{3}{2}$ L 6 f. $\frac{1}{2}$ (1) $\frac{5}{2}$ $\frac{1}{2}$ (2) Si L 9 hoc (1) imposs (2) esse
 (a) ge (b) absurdum L 15 redit, (1) datam potentiam cuiusdam literae, aliarum literarum potentia exprimere, (a) da (b) magnitudine | et *nicht gestr.* | (aa) ratione in partes sectis, (b) potentia | datis erg. | in partes sectis, (c) magnitudini (2) magnitudinis L 19–234,1 extendi. (1) $y^{\frac{4}{2}}$ seu (2) $y^{\frac{4}{2}}$ seu $\sqrt{y^4}$
 (3) $y^{\frac{3}{2}}$ seu $\sqrt{y^3} \sqcap \beta x^{\frac{1}{2}} + 1x^{\frac{2}{2}}\gamma^{\frac{1}{2}} + 2x^{\frac{1}{2}}\gamma^{\frac{2}{2}} + \beta | x \text{ gestr.} | \gamma^{\frac{3}{2}}$ (c) $\sqrt{y^3} \sqcap \beta x^{\frac{1}{2}} + zx^{\frac{2}{2}}\gamma^{\frac{1}{2}} + zx^{\frac{1}{2}}\gamma^{\frac{2}{2}} + \beta\gamma^{\frac{3}{2}}$
 (4) Qvoniā L

10

15

Quoniam necesse non est, numeros illos esse combinatorios, et quoniam semper erunt arbitrariae literae, hinc eae ita explicentur semper constante modo, ut inde Tabula numerorum ejusmodi condi possit, etsi plane diversa a combinatoria vel combinatoria interpolata, modo constans. Denique quaerendum est quod inveniri possint expressiones
5 pro exponentibus surdis. Malum est quod tunc ista reductio institui non potest. Sed videtur alia institui posse reductio per appropinquationes perpetuas, pro surdis sumendo fractorum seriem simul appropinquantem more meo, at videndum an ita res reduci possit ad analysis, seu an harum appropinquationum Termini reperiri possint.

Sequitur Schediasma *de Exponentibus Fractis et Surdis*.

10 36₂. DE FORMULIS OMNIUM DIMENSIONUM, PARTES TERTIA ET QUARTA

Februar 1675

Überlieferung: L Notiz: LH 35 III A 34 Bl. 5. 1 Bl. 4°. 1 S. auf Bl. 5 r°. Rückseite leer.
Cc 2, Nr. 909

15 Feb. 1675

De formulis omnium dimensionum

De Exponentibus Fractis et Surdis

De infiniti et indefiniti differentia

Vide Schediasma Januarii 1675. *de formulis omnium dimensionum* constans duabus
20 partibus.

Constat si exponentes sint integri aut rationales, numeris combinatoriis valores binomialium exprimi. At vero si sint fracti, aut irrationales nullam video rationem inter-

1 combinatorios, (1) hinc procedendo per omnes series eligatur nova (2) et L 16 De ...
dimensionum erg. L 18 De infiniti ... differentia erg. L 19 Vide (1) pro (2)
Schediasma L 21 rationales, (1) eos exprimi numeris combinat(→) valores (2) numeris L

7 more meo: vgl. VII, 3 N. 33. 9 de Exponentibus: vgl. N. 36₂. 19 de formulis: vgl. N. 36₁.

polandi numeros combinatorios, praeter inquisitionem analyticam, non nisi pro fractis tamen tentabilem. Hoc loco vero venit in mentem rationis, quae hoc nititur fundamento, quod omnis numerus irrationalis reprezentari potest infinita serie rationalium; et omnis numerus fractus infinita serie integrorum; quare videamus an numerorum quoque combinat[or]iorum seriebus infinitis uti liceat.

5

Experiamur primum in finitis, sit $y \sqcap x + b$, videamus quid sit $y^{z-\omega}$, fiet

$$1y^{z-\omega} [+] \frac{z-\omega}{1} y^{z-\omega-1} [+] \frac{z-\omega, z-\omega-1}{1, 2} y^{z-\omega-2} \text{ etc.}$$

Cumque z et ω sint integri, et posito eorum numero finito etiam $z - \omega$, sit integer, patet modo series numerorum $z - \omega$ etc. sit finita, succedere hunc numerorum combinatoriorum usum.

10

$$\frac{1}{1+b} \sqcap 1 \left(\frac{-b}{1+b} \right) - b \left(\frac{+b^2}{1+b} \right) + b^2 - b^3 \frac{+b^4}{1+b}.$$

b autem est integer ideo $b^3 \sqcap b^2$. Sed et $-b + b^2 \sqcap -b^3 + b^4$. Itaque non potest demonstrari quod de finitis quoteunque verum est, de infinitorum quoque serie verum esse. Quoniam scilicet posteriora non decrescunt; ideoque nec locum habet ratiocinatio Archimedea, per deductionem ad absurdum; unde sequitur fallacem esse Methodum infinitorum, neque admittendam, nisi quando deductione ad absurdum demonstrari potest; alioqui enim demonstrari posse, ex eo quod in finitorum numero quantocunque res

15

1 numeros (1) combinat(-) (2) combinatorios, (a) nisi qvam nunc (b) praeter L 1 f. fractis | illic gestr. | tamen L 5 f. liceat. (1) Sit y^{4-1} (2) Experiamur ... sit (a) y^{4-1} et (aa) $y \sqcap x + a$ (bb) $y \sqcap x + b$. fiet: $y^{4-1} \sqcap 1x^{4-1} +$ (b) $y^{z-\omega} \sqcap$ (c) $y \sqcap x + b$ L 10 f. usum (1) $\frac{a}{a+b} \sqcap (a) 1 + \frac{-b}{a+b}$ (b) $a \left(\frac{-b}{a+b} \right)$ (2) $\frac{1}{1+b} L$ 12 $b^3 \sqcap b^2$. (1) Videndum an sit $1 - b \sqcap b^2 - b^3$ (2) Sed et (a) $b^2 - b^3$ (b) $-b^2 + b$ (c) $-b + b^2$ L 12 f. potest (1) effici (2) demonstrari L

6 fiet: Anstatt wie angekündigt y durch $x + b$ zu ersetzen, substituiert Leibniz y mit $y + 1$. Dies beeinträchtigt die grundsätzliche Überlegung nicht. 11 $\frac{1}{1+b}$: Auf der rechten Seite der Gleichung wendet Leibniz sukzessive die ersten Schritte einer Entwicklung einer Reihendarstellung durch fortgesetzte Division auf $\frac{1}{1+b}$ an. Den Term $\frac{-b}{1+b}$ der ersten Zerlegung von $\frac{1}{1+b}$ stellt Leibniz im darauffolgenden Schritt als $-b + \frac{b^2}{1+b}$ dar, $\frac{b^2}{1+b}$ im Anschluss als $b^2 - b^3 + \frac{b^4}{1+b}$. Die Streichung der ersetzen Terme kennzeichnet Leibniz, indem er diese einklammert. Die rechte Seite ist somit als $1 - b + b^2 - b^3 + \frac{b^4}{1+b}$ zu lesen. 14 f. ratiocinatio: vgl. ARCHIMEDES, *Quadratura parabolae*, prop. XXIII u. XXIV.

succedit, idem succedere etiam in infinito. Unde sequitur illustri exemplo quantum inter-
sit inter infinitum, et indefinitum. Quod enim de indefinito terminorum numero verum
est, non est de infinito. Et certe: indefinitus terminorum numerus est finitus; non ergo
infinitus. Indefinitum ergo non est infinitum. Sed si fractio resolvi posset in integros infi-
5 nitos in infinitum decrescentes; verum foret, quod scilicet numerorum Combinatoriorum
adhiberi posset interpolatio; ad numeros potestatum exprimendos; deductione ad absur-
dum; assumta differentia, si scilicet error adsit et continuata serie ad terminos usque
differentia majores; quin etiam etsi termini crescant, si tamen differentiae terminorum
 $-b^3 + b^4$, etc. concrevissent, idem potuisset demonstrari. Hinc sequitur si qua metho-
10 dus demonstretur de fractis, eandem demonstrari posse de s u r d i s , hac ad absurdum
deductione, quia omnes surdae quantitates possunt resolvi in fractas rationales, ita ut
termini continue decrescant. Methodus autem pro fractis videtur indagari posse, ea quam
coepi ratione in schediasmate *de formulis omnium dimensionum* parte 2^{da}, nempe per ar-
bitrarias ascriptas, reducta postea aequatione, cum enim sint literae arbitrariae, videtur
15 methodus quaedam generalis ipsius z ope caeteras inveniendi literas haberi posse. Quo
semel facto, omnium figurarum quadratura analyticae poterunt haberi; et laborandum
erit postea de reductione expressionum transcendentium, quando id fieri potest.

6 exprimendos; (1) demon (2) s⟨um⟩ (3) deductione *L* 7 error (1) absit (2) adsit *L*
10 s u r d i s , (1) qvia mutato (2) hac *L* 11 rationales, (1) qvare si qvi possu (2) Tantum ergo (3)
ita *L* 17 reductione (1) figura (2) expressionum *L*

13 parte 2^{da}: vgl. N. 36₁ ab S. 226 Z. 16.

37. DE AEQUATIONE QUADRATICA
[Frühjahr 1673]

Überlieferung: L Konzept: LH 35 XIV 2 Bl. 76–77. 1 Bog. 2°. 2 S. zweispaltig beschrieben.

Textfolge Bl. 76 r°, 77 v°. Rest des Bogens leer.

Cc 2, Nr. 8491

5

Datierungsgründe: Das Wasserzeichen des Papiers ist für das Frühjahr 1673 und von Herbst 1674 bis Frühjahr 1675 belegt. In den Jahren 1673–1675 verwendet Leibniz das Gleichheitszeichen = bis Mitte 1674, *Rq* als Quadratwurzelzeichen bis Herbst 1673. Das vorliegende Stück wird durch VII, 2 N. 1 fortgesetzt.

Des Cartes *Geom. lib. 1. lit. K. pag. 6. edit. 1659.*

10


Si habeatur aequatio: $z^2 = az + b^2$. ut inveniam z . facio Triangulum rectangulum *NLM*. cuius unum latus *LM*. sit aequale b . radici videlicet \square^{tae} quantitatis cognitae b^2 alterum autem latus *LN*. = $\frac{1}{2}a$. Deinde producta *MN*. base ejusdem Trianguli usque ad

O. ita ut *NO* sit aequalis *NL*. erit tota *OM* = z . Ergo: $z = \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}a^2 + b^2}$. Quodsi habeatur $y^2 = -ay + b^2$. a base *MN*. aufero *NP*. aequalem *NL*. eritque reliqua *PM*. aequalis y . Ita ergo $y = \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}a^2 + b^2}$. (Nota hic Cartesius jungit lineola capiti imminente partes ejusdem quantitatis, ubi potest esse aequivocatio. Item Cartesius semper dicit potius $y^2 = -ay + b^2$. quam $y^2 = b^2 - ay$. ut malit praefigere – initio, quam ordinem illum turbare.)

15

10 Darüber: NB. *Transact. Phil.* num. 64 et num. 63 ubi de lib. Slus. et Ferguson num. 49.

10 Des Cartes: Vgl. R. DESCARTES, *Geometria*, 1659, DGS I S. 6 f. 1,20 f. *Transact. . . . num. 49*: Gemeint sind *An account of two books. I. Renati Franc. Slusii Mesolabum*. In: *Philosophical Transactions* IV, Nr. 45 vom 25. März/4. April 1669, S. 903–912; J. COLLINS, *An account, concerning the resolution of equations in numbers*. In: *Philosophical Transactions* IV, Nr. 46 vom 12./22. April 1669, S. 929–934; *An Accompt of four books. III. Labyrinthus Algebrae, auct. Joh. Jac. Ferguson*. In: *Philosophical Transactions* IV, Nr. 49 vom 19./29. Juli 1669, S. 996–999.




[Fig. 1]

Denique si habeatur $z^2 = az - b^2$. facio $NL = \frac{1}{2}a$. et $LM = b$. ut ante. Deinde non

duco lineam per puncta M et N . ut in duobus aliis casibus sed duco MQR . parallelam ipsi LN . centroque N descripto per L . circulo secante MQR in punctis Q et R . erit

5 MQ . vel MR . aequalis lineae quae sitae z . Hoc enim casu illa duobus modis exprimitur:

$$z = \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}a^2 - b^2} \text{ vel } z = \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}a^2 - b^2}.$$



[Fig. 2]

Si circulus centrum habens in puncto N . transiensque per punctum L . non secet nec

tangat rectam MQR ; nullam aequatio radicem admittet, seu problema erit impossibile.

10 Possunt autem hae radices infinitis ferme aliis modis inveniri, sed hae sunt simplicissimae.

Beaunius ad hoc locum duplices annotat demonstrationes, alteras Geometricas, alteras Algebraicas. Missis Geometricis, Algebraicam consideremus. $z = \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}a^2 + b^2}$ ita demonstrat: Ergo $\sqrt{\frac{1}{4}a^2 + b^2} = z - \frac{1}{2}a$. Et = eorum \square^{ta} . $z^2 - az + \frac{1}{4}a^2 = \cancel{\frac{1}{4}a^2} + b^2$. Ergo $z^{[2]} = b^2 + az$. Ita demonstrabitur $y = -\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}a^2 + b^2}$. Nam ideo $y + \frac{1}{2}a = \sqrt{\frac{1}{4}a^2 + b^2}$. Et horum \square^{ta} $y^2 + ay + \frac{1}{4}a^2 = \frac{1}{4}a^2 + b^2$. Ergo $y^2 = -ay + b^2$. 5
 Ita demonstrabitur $z = \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}a^2 - b^2}$. Ergo: $z - \frac{1}{2}a = \sqrt{\frac{1}{4}a^2 - b^2}$. Ergo horum \square . $z^2 - az + \frac{1}{4}a^2 = \frac{1}{4}a^2 - b^2$. Ergo $z^{[2]} = az - b^2$. Ita demonstrabitur quoque ultimus modus tertii casus $z = \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}a^2 - b^2}$. Ergo $\frac{1}{2}a - z = \sqrt{\frac{1}{4}a^2 - b^2}$. Et \square^{ta}
 $\frac{1}{4}a^2 - az + z^2 = \frac{1}{4}a^2 - b^2$. Ergo $z^2 = az - b^2$.

Tota inventi ratio eo nititur, ut statuendo incognitos in eodem loco, adscripto que aliquo cognito posset extrahi Radix. Cum nec Cartesius nec alii dicant hanc aequationes reducendi Methodum ab ipso inventam, nec ego id dicere ausim. Est tum utique summae utilitatis Beaunii demonstratio contraria forma resoluta, monstrat inventi modum. Sed hoc notabile est, quod ex ipsius Cartesii lib. 3. p. 69. annotat Schotenius, eandem aequationem $z^2 = az + b^2$ aliam quoque habere Radicem, minorem quam nihil, nempe 10
 loco $z = \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}a^2 + b^2}$ hanc $z = \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}a^2 + b^2}$. Quod eodem modo demonstratur. 15

1 ad (1) hunc Cartesii *nicht gestr.* (2) hoc locum (a) duas (b) duplices L

1 annotat: Fl. de BEAUNE, *Notae breves*, 1659, DGS I S. 112–114. 14 annotat: Fr. van SCHOTEN, *Commentarii*, 1659, DGS I S. 162 f. u. 281–283.

$z - \frac{1}{2}a = \sqrt{\frac{1}{4}a^2 + b^2}$. Ergo $\square =$ sunt: $z^2 + \frac{1}{4}a^2 - az = -\frac{1}{4}a^2 + b^2$. Hic quaestio oritur
 an jam cum Schotenio istud $-\frac{1}{4}a^2 + b^2$, ubi videtur totum $\frac{1}{4}a^2 + b^2$ esse – seu adimi
 debere nihilo, possit concipi, ut $b^2 - \frac{1}{4}a^2$. Quae quaestio ad aliam redit, an radicis nihilo
 minoris quadratum possit esse aliquid. Rem in numeris experiamur, si $2 - 4. = 0 - 2.$
 5 ducas in se habebis priore modo $4 + 16 - 16 = 4$. perinde ac si multiplicasses $4 - 2$. Si 0.
 adhibeas habebis: $0^2 + 4 - 4. \hat{=} 0$. en ergo 4. Loco numeri ergo nihilo minoris intelligenda
 ejus inversa. Sed haec innituntur isti regulae $- \hat{=} +$. $0 - 4. \hat{=} 0 - 3. = 12$. Nota
 cum dicitur $z = \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}a^2 + b^2}$ cum z . sit minor 0. ideo $0 - z = \sqrt{\frac{1}{4}a^2 + b^2} - \frac{1}{2}a =$
 aliquid. Et ideo $0 - z$ (etc.) non est semper numerus nihilo minor, si scilicet ipse z .
 10 sit nihilo minor. Eodem modo Schotenius admonet $y^2 = -ay + b^2$. habere non tantum
 radicem $y = -\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}a^2 + b^2}$. sed et pro $+\sqrt{}$. ponendo $-\sqrt{}$. radicem falsam. Idem
 in $z = \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}a^2 - b^2}$. et aliis Schotenius non dicit, sed videtur subintelligi posse,

4–7 *Nebenbetrachtung: NB.* additio numeri nihilo minoris est subtractio, et sub-
 tractio ejus additio, alterius numeri nihilo majoris.

$$1 + b^2. (1) \text{ Ergo } \square. z^2 + \frac{1}{4}a^2 - \frac{1}{2}az = -\frac{1}{4}a^2 + b^2. \text{ Ergo } z^2 - az = -b^2. \text{ Ergo } z = -b^2 + az.$$

Ego ergo ex demonstratione ista reperi errasse Schotenius, non enim oritur ut ipse ait (2) Ergo L

$$4 \text{ experiamur, (1) esto } z = \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}a^2 + b^2} \text{ (a) esto 1 et b esto: (2). } \frac{1}{2} - \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{16}{4}}. \text{ Ergo } z = \frac{2}{4} - (a)$$

$$\frac{17}{4} = (0 - \frac{15}{4}) \text{ (b) Rq } \frac{17}{4} \text{ Ergo } z - \frac{1}{2}a = -\sqrt{\frac{1}{4}a^2 + b^2} + \frac{2}{4} - \text{Rq } \frac{17}{4} - \frac{2}{4} = -\text{Rq } \frac{17}{4}. \text{ Ergo } \square^{\text{ta}} \text{ eorum}$$

$$z^2 + \frac{1}{4}a^2 - az = -\frac{1}{4}a^2 + b^2 + \frac{1}{4} + \frac{16}{4} + \frac{1}{4} - \frac{2}{4} - \text{Rq } \frac{17}{4} = (2) \text{ si } L$$

1 $\square =$ sunt: Leibniz erkennt zunächst nicht, dass das Minuszeichen durch das Quadrieren wegfällt, und vermutet einen Fehler bei Schooten. Kurz danach erkennt er seinen Irrtum, korrigiert aber den Text nicht durchgehend.

etsi hoc ille non innuat. Notat Cartesius eodem modo si has aequationes habeas: $x^4 = -ax^2 + b^2$ tunc $x = \sqrt{-\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}a^2 + b^2}}$. Addit Schoten: Si sit $z^4 = az^2 + b^2$ fore $z = \sqrt{\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}a^2 + b^2}}$. Item si sit $z^4 = az^2 - b^2$. fore $z = \sqrt{\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}a^2 - b^2}}$. Radix ex $z^4 - az^2 + \frac{1}{4}a^2 = \frac{1}{2}a - z^2$.

S ch o t e n ad C a r t e s . l i b . 1 . l i t . M . p . 1 6 4 . Quoties in problemate Geometrico determinata est unitas, seu linea quaedam quae pro unitate habetur, tunc radicem quadratam extrahere ex linea quadam, est invenire medium proportionalem inter ipsam et unitatem. (: Addo 1 — 2 — 3 — (6). M u l t i p l i c a r e lineam per lineam eo casu est invenire quartam proportionalem quae ita sit ad secundam, uti tertia ad primam, vel quae ita sit ad secundam, ut prima ad tertiam, ac proinde invenienda est linea, quae ita est ad unam datarum, ut altera datarum est ad unitatem. D i v i d e r e lineam per lineam est 3 — 6 — 1 — (2) itidem invenire quartam proportionalem, 6 — 3 — 1 — $\left(\frac{1}{2}\right)$ seu invenire lineam quae ita sit ad unitatem, ut duae datae sunt inter se. Et haec linea quaesita repraesentat duarum linearum r a t i o n e m . [:)] Quotiescunque in problemate geometrico eadem quantitas ex partibus inaequalium dimensionum componiatur, toties necesse est unitatem esse datam; alioquin problema non est Geometricum, sed in Numeris solvendum. Data unitate dimensio minor supponenda multiplicari per unitatem, ut aequetur majori. (: Si unitas data non est tunc multiplicatione linearum et augetur dimensio, divisione et radicum extractione minuitur, ratio est, quia pro unitate supponitur Quadratillum vel Cubulus minor qualibet dabili. :) Caeterum si nobis data sit aequatio Geometrica in qua unitas in linea quadam data est, multiplicatio ista divisioque et differenda est, dum absoluta sit aequationis politura seu reductio. Et reductio facienda est, quasi problema esset in Numeris, facta politura, fiant multiplicationes divisionesque etc. [per] 1 ut adhibita data unitate.

¹ Cartesius (1) idem esse, si loco (a) $z = (b)$ $z^2 = az + b^2$. intelligas $z^4 = az^2 + b^4$. fieri enim $z = \sqrt{\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}a^2 + b^2}}$ (aa) Et si y (bb) Et si $x^4 = -a$ (2) eodem L

S ch o t e n ad C a r t e s. lib. 1. lit. M. p. 164. *G e o m.*

In aequatione data $z^2 = az - b^2$. necesse est b non esse majus quam $\frac{1}{2}a$. alioquin aequatio est impossibilis. Debet enim b^2 subtrahi ex $\frac{1}{4}a^2$. Sed cum sit $z^2 - az = -b^2$. seu $az - z^2 = b^2$. et fiat: $z^2 - az + \frac{1}{4}a^2 = b^2 + \frac{1}{4}a^2$ non video quid coegerit Schotenium 5 dicere b^2 subtrahi debere ex $\frac{1}{4}a^2$. cum addantur potius sibi. Idem in numeris experiamur.

$$\begin{aligned} a & \text{ esto } 6. \ b \text{ esto } 4. \ \text{patet } b \text{ esse majus quam } \frac{1}{2}a. \ \text{Quaeritur } z. \ \text{Cum } z. \ \text{sit } Rq \overline{b^2 + \frac{1}{4}a^2}, +a. \\ b^2 & = 16. \ \frac{1}{4}a^2 = 9. \ a = 6. \ \text{Ergo } Rq \sqrt{b^2 + \frac{1}{4}a^2} + a \\ & \quad \begin{array}{c} 16 + 9 \\ \backslash / \\ Rq \end{array} \\ 10 & \quad 25 = 5 + 6 = 11. \end{aligned}$$

Sed hoc absurdum. Ratio est quod non dicendum $z = Rq \sqrt{b^2 + \frac{1}{4}a^2} + a$. quasi fuisset initio quidem $z - a$. Nam quid in eodem jure dici potuisset $a - z$. Utrum ergo eligi debeat ex aequatione determinandum, et aequatio data monstrat a esse majus quam z . quoties b

4 f. *Dazu:* Recte Schotenius. Vide sequentem plagulam. NB.

$$\begin{aligned} 1 \ S c h o t e n \dots G e o m. \ erg. L & \quad 3 \ \frac{1}{4}a^2. \ (1) \ Cum \ fiat \ z^2 + az - \frac{1}{4}a^2 = b^2 - \frac{1}{4}a^2 \ (2) \ sed \ (3) \\ \text{sed } L & \quad 6f. +a. \ (1) \ Erit \ 6 + Rq \ (2) \ Erit \ 6 + (Rq, (a) \ 16 + 9, =) \ 5. \ \text{Ergo } z \text{ erit } 11. \ \text{probemus } (aa) \\ z^2 & = b^2 \ (bb) \ z^2 = az - b^2. \ (b) \ 4 + 9, =) \ Rq 13. \ z = Rq 13 + 6. \ \text{Ergo } z^2 = 13 + 36 + Rq 156 \ (12) \ \text{Ergo} \\ z^2 & = \begin{array}{r} az \\ 61 \\ 36 + 21 \\ \hline \end{array} \ \begin{array}{r} -b^2 \\ 36 \\ \hline \end{array} \ (3) \ b^2 = 16 \ L \quad 12 \ z - a. \ (1) \ \text{sed intelligi debet} \ (2) \ \text{Nam } L \quad 13 \ qvam \\ \text{circiter} & \quad \begin{array}{c} \backslash / \\ 57c. \end{array} \\ z. \ (1) \ \text{est enim } z^2 & = az - b^2 \ (2) \ qvoties \ L \end{aligned}$$

4 fiat: Auf der rechten Seite der folgenden Gleichung müsste $-b^2$ stehen. Leibniz glaubt zunächst irrtümlich an einen Fehler bei Schooten, erkennt aber später seinen Irrtum und merkt dies an. Im Folgenden beeinträchtigen weitere Versehen die Rechnungen. 6 +a: Richtig wäre $\frac{1}{2}a$. Der Fehler pflanzt sich fort. 6,14 sequentem plagulam: VII, 2 N. 1.

est majus quam $\frac{1}{2}a$. Quod quaeremus ex ipsa aequatione. Necessaria enim ista inquisitio est, ad extrahendas radices ex Apotomis. $z = az - b^2$. Jam z supponitur esse quantitas nihilo major, ergo az est majus quam b^2 . Ergo $az = b^2 + bx$. Ergo $\frac{az}{b} = b + x$. Ergo $\frac{az}{b} - b = x$. seu $\frac{az - b^2}{b} = x$. Jam suppon \langle itur \rangle a majus quam b . seu $b + y = a$. Erit $\frac{bz + yz - b^2}{b} = x$. seu $bz + yz - b^2 = xb$. vel $bz + yz = xb + b^2$. vel $z = \frac{xb + b^2}{b + y}$. Sed 5
quaerenda est brevior via.

$$z^2 = az - b^2. \text{ Ergo } z = Rq \lfloor az - b^2 \rfloor.$$

$$z^2 + b^2 = az. \quad z^2 + b^2 + 2zb = az + 2zb.$$

$$z + b = Rq \lfloor az + 2zb \rfloor.$$

$$\text{Item: } z^{[2]} + 2az + a^2 = 3az + a^2 - b^2.$$

$$\text{Ergo } z + a = Rq \lfloor 3az + a^2 - b^2 \rfloor.$$

$$\text{Similiter } 2az + b^2 + a^2 = z^2 + 2b^2 + az.$$

$$\text{Ergo } a + b = Rq \lfloor z^2 + 2b^2 + az \rfloor.$$

Sed jam quaeramus $a - b$. quoniam a supposuimus majus quam b . et videamus qualia caetera futura sint. Id ita fiet:

$$z^2 + b^2 + a^2 - 2ab = az - b^2 + b^2 + a^2 - 2ab. \text{ Ergo}$$

$b^2 + a^2 - 2ab = az - b^2 + b^2 + a^2 - 2ab - z^2$. Ergo cumque a sit majus ex hypothesi pro eo supponamus $b + c$. Ergo erit

$$b^2 + b^2 + c^2 + 2cb - 2b^2 - 2bc = bz + cz + 2b^2 + 2c^2 + 4cb - 2b^2 - 2bc - z^2.$$

$$\text{Ergo } c = Rq, bz + cz + 4cb - z^2.$$

$$\text{Ergo } c^2 + z^2 = bz + cz + 4cb.$$

$$c^2 = bz + cz + 4cb - z^2.$$

$$\text{Ergo } z^2 = bz + cz + 4cb - c^2.$$

4 seu (1) $a + y = b$. erit $\frac{az + yz - b^2}{b} = x$ (2) $b + y = a$ L 7 Ergo $|z^2 ändert Hrsg. | = Rq L$

11f. $z + a = Rq \lfloor 3az + a^2 - b^2 \rfloor$ (1) Similiter $z + b^2 + 2zb = az + 2zb$ Ergo $z -$ (2) Similiter L 14 jam (1) constituamus $a -$ (2) qvaeramus L

2 $z = az - b^2$: Leibniz weicht ab von der Anfangsgleichung $z = az - b^2$, zu der er ab Z. 7 zurückkehrt.
12 Similiter: Auf der rechten Seite der Gleichung fehlt der Term $+a^2$, die anschließende Folgerung ist nicht richtig. 18 Ergo erit: Die folgenden Umformungen sind fehlerhaft.

$$\text{Ergo } \frac{z^2}{z} = z = b + c + \frac{4cb}{z} - \frac{c^2}{b}.$$

Ergo si a est majus quam b . tunc z . est majus quam b . item majus quam c . Restat inquirendum an sit majus quam $b+c = a$. Quod sciemus si determinabimus utrum majus

$$\text{sit } \frac{4cb}{z} \text{ an } \frac{c^{[2]}}{b}. \frac{4cb}{z} \cancel{\times} \frac{c^2}{b} = \dots \frac{4cb^2 - c^2z}{zb}. 4cb^2 \text{ etc.} = c^2z \text{ etc. Ergo } \cancel{Ab^2} \frac{etc.}{c4} = \frac{cz}{4} \frac{etc.}{c4}.$$

5 Ergo $b = \frac{Rqcz}{2}$. Ergo $c^2 = z \wedge \frac{Rqcz}{4} + cz + 4cRq \frac{cz}{2} - z^2 \cdot c^2 = \frac{Rqz^3c}{2} + cz + \frac{Rq16c^3z}{2} - z^2$.

$$c^4 + z^4 + 2z^2c^2 = \frac{z^3c}{2} + \cancel{c^2z^2} + \frac{8c^3z}{2}. \text{ Nondum Exitum reperio. Per numeros manifestum}$$

est z . non esse majus quam a . sed contra dicendum $a - z = Rq, b^2 + \frac{1}{4}a^2, = 5$. Ita enim

$$6 a = 5 + z. \text{ Ergo } a - 5 = z. \text{ Ergo } z = 1.$$

4 Nebenrechnung: $\frac{4cb^2 - c^2z}{zb}$

8 Darunter: Vide seq.

3 $b+c=a$. (1) Redeamus ad initia. $z^2 = az - b^2$. si $a=b$. Ergo $z^2 = bz - b^2$. Ergo $z^2 + b^2 + (2)$
 Qvod $L \quad 8 z = 1. | (1) z = (2) z^2 = az - b^2$ Male calcularam initio (3) $\frac{aa + 4zz = 4az}{4} 4az - aa = 4a$
 $\wedge z - a \quad 4zz \quad 4az - gestr. | L$


6 $c^4 + z^4 + 2z^2c^2$: Leibniz unterlaufen beim Quadrieren Flüchtigkeitsfehler. Er versucht eine numerische Probe. 8,10 Vide seq.: Leibniz setzt die Untersuchung in VII, 2 N. 1 fort.

38. INVENIRE GENERATRICEM TROCHOIDIS
[Ende 1676]

Überlieferung: L Notiz: LH 35 VIII 10 Bl. 8. 1 Bl., ca. 20 cm × 12 cm. $1\frac{1}{2}$ S.
Cc 2, Nr. 00

Datierungsgründe: Der Träger des Stückes hing ursprünglich mit jenem des von Leibniz auf Ende 1676 datierten Stückes *Generalis diatyposis* (N. 32) zusammen.

5



[Fig. 1]

BP, p. GC, c.

$dx : dy :: y : p$. Ergo $d\bar{x} p$ aequ. $d\bar{y} y$ et $\int \bar{p} d\bar{x}$ aequ. $\frac{1}{2} yy$, si p datur ex data x . Quod si p datur ex y , fiet x aequ. $\int \frac{dy}{p}$.

10

$AT : TE :: dx : dy$. TE aequ. $AT \frac{dy}{dx}$.

8 (1) $AT : TE :: dx : dy$. (2) $BP, p. L$ 11 TE aeqv. $AT \frac{dy}{dx}$ erg. L

$EC : AB :: dc : dx$ fiet EC aequ. $\frac{dc}{dx}x$ et TC aequ. $TE + EC$, seu TC aequ. $AT \frac{dy}{dx} + \frac{dc}{dx}x$.

Jam $AT^2 + TC^2$ aequ. $xx + yy$. Sit AT aequ. θ , et TC sit z fiet $\theta^2 + z^2$ aequ. $xx + yy$ unde differentialiter fiet: $\theta d\theta + z dz$ aequ. $x dx + y dy$.

5 $AT : AE :: dx : dc$ seu AT aequ. $AE \frac{dx}{dt}$.

$MA : MB$ seu $t - x : x :: AE : BC, y$.

Ergo AE aequ. $\frac{ty - xy}{x}$. Ergo AT aequ. $\frac{\overline{ty - xy} dx}{x dc}$. Est autem t aequ. $y \frac{dx}{dy}$. Ergo

AT seu θ aequ. $\frac{yy \overline{dx}^2}{x dy dc} - y \frac{dx}{dc}$. Jam data curvae quadratura datur $\int \theta dc$, et eadem data

datur $\int y dx$. Ergo data curvae quadratura datur $\int \frac{yy \overline{dx}^2}{dy}$. Quam relationem in curva

10 praesenti habent AT, TC, AC , eam in trochoide ejus habent CB, BP, PC .

AT ductae in GC , seu θ in dc , sunt in trochoide ipsae y ductae in $dx + dp$.

Data trochoide invenire ejus generatricem, reducitur ad hoc problema, dato elemento trochoidis invenire curvam. Nam data curva dantur ejus AP , ergo et differentiae ipsarum; sunt autem ipsae eaedem cum ipsis GC generatricis, seu cum curvae generatricis Elementis. Contra ex data methodo inveniendi generatricem, videndum an habeatur methodus inveniendi curvam elementi quaesiti. Et desideratur, ut ex datis differentiis

1 TE + EC. (1) fiet: (2) seu L 3 f. fiet ... differentialiter erg. L 5 seu (1) AE $t - x$ (2)
 AT aeqv L 7 $\frac{ty - xy}{x}$. Ergo (1) AE (2) AT L 12 Data (1) curva invenire eius trochoidem, est (2)
 trochoide L 12 f. problema, (1) data curva invenire elementum curvae (2) dato elemento | trochoide
 $\ddot{a}ndert$ Hrsg. | invenire L 13 data (1) Trochoide (2) curva L 14–16 GC (1) Trochoidis, seu cum
 curvae trochoidis (2) generatricis, ... Elementis. (a) Et contra si data (b): sed non contra licebit ex
 data generatric (c) contra ex | dato $\ddot{a}ndert$ Hrsg. | methodo inveniendi generatricem, (aa) non habetur
 methodus (bb) videndum ... inveniendi (aaa) curvae (bbb) curvam L

6 $t - x : x$: Leibniz setzt $t = MB$. Das korrekte Verhältnis lautet daher $(t - x) : t = AE : y$. Der Fehler belastet die Überlegungen bis Z. 9. Das dortige Ergebnis für die Quadratur wird durch weitere Versehen beeinträchtigt.

ipsarum AP habeatur curva; seu ut ex datis $dx + d\frac{\overline{dy}y}{dx}$ aequ. $dx x^{\cdot\cdot}$ fiet $x + \frac{dy}{dx}$ \square
 $\int dx x^{\cdot\cdot}$ et $x dx + dy y$ aequ. $\overline{dx} \int \overline{dx x^{\cdot\cdot}}$ seu $\frac{1}{2}xx + \frac{1}{2}yy$ aequ. $\int \overline{dx} \int \overline{dx x^{\cdot\cdot}}$. Unde patet opus
 prius esse ad quadraturas, adhoc ut ex data methodo inveniendi trochoidis generatricem,
 reperiatur methodus pro elemento curvae. Prius enim invenienda (trochoides) curva cuius
 differentiae AP sint datae quod fit ut dixi per quadraturas. 5

$$\begin{aligned} 1 \text{ ex datis } (1) x \text{ et } (2) dx + (a) dy & (b) \frac{d\overline{dy}y}{dx} \quad (c) d\overline{dy}y L \quad 2 \ x dx + dy y \ (1) \text{ aeqv } \iint (2) \text{ aeqv} \\ (a) \int dx \int \overline{dx x^{\cdot\cdot}} & (b) \overline{dx} \int \overline{dx x^{\cdot\cdot}} L \quad 4 \text{ invenienda } (1) \text{ tro } (2) \text{ (trochoides) } L \end{aligned}$$

1 $x^{\cdot\cdot}$: Leibniz erklärt diese ungewöhnliche Notation hier nicht. Andere Stücke, in welchen er sie gebraucht, sind einige Jahre jünger (etwa LH 35 VIII 10 Bl. 1–2, datiert auf den 29. November 1681). Die Bedeutung der Notation ergibt sich aus der Gleichung, in der sie hier verwendet wird. Diese ist äquivalent zu $dx x^{\cdot\cdot} = dx + dp$ und lässt sich zu $x^{\cdot\cdot} = 1 + \frac{dy^2}{dx^2}$ beziehungsweise zu $x^{\cdot\cdot} = \left(\frac{dc}{dx}\right)^2$ umformen; $x^{\cdot\cdot}$ ist also das Quadrat des Bogenelements. [noch]

39. AUS UND ZU PIERRE COURCIER, SUPPLEMENTUM SPHAEROMETRIAIE

8. März 1676

Überlieferung: L Konzept: LH 35 XIII 3 Bl. 206. 1 Bl. 2°. 2 S. — Leibniz hat im separierten Index, S. 73–76 des Druckes (LH 35 XIII 3 Bl. 207–208; Cc 2, Nr. 1350 B), die auf S. 73 befindliche Überschrift *Index* ergänzt zu: „*Index Supplementi Sphaerometriae P. Courcier*“. — Wörtliche Zitate werden kursiviert, dabei werden Auslassungen von einzelnen Wörtern in der Regel nicht eigens vermerkt. Orthographie und Interpunktions von Leibniz, gegebenenfalls abweichend von der Quelle, werden stillschweigend übernommen.

Cc 2, Nr. 1350 A


8. Martii 1676.

S u p p l e m e n t u m S p h a e r o m e t r i a e , sive Triangularium et aliarum in

Sphaera figurarum quoad areas mensuratio per R. P. C o u r c i e r S. J.

Mussiponti apud Claudium Cardinet 1675.

15 *Superficies cujuslibet integrae portionis Sphaerae demta sua circulari basi est aequalis circulo, cuius semidiameter aequatur linea rectae ductae a vertice ad circumferentiam basis illius portionis.*




[Fig. 1]

Circulus rad. $AE \sqcap$ superf. AHE .

20 *Quae linea est chorda subtendens arcum maximi circuli transeuntis per verticem dictae portionis, et in ejusdem peripheriam cadentis ad angulos rectos; portio sphaerae comprehensa duobus semicirculis magnis in eisdem polis se secantibus, vocatur Sectio p e p o n a l i s.*

12 sive |Triangulorum ändert Hrsg.| et (1) aliorum (2) aliarum L 16 f. ad (1) basim (2)
circumferentiam basis L 18 f. Fig. 1 ... AHE erg. L


Residua sphaerae portio sectio Antipeponalis. Sectio peponalis ab aequatore secatur in duo Triangula, quae vocat birectangula, quia duo anguli ad aequatorem recti. Complementum Trianguli ad superficiem hemisphaerii vocat Anti-birectangulum.



[Fig. 2]

Theor. 1. *In sectionibus peponalibus est area ad aream, ut angulus ad polum ad angulum.*

Seu sectiones peponales sunt ut anguli ad polum. Hoc non satis probat, etsi satis videatur clarum. Ut *totum ad totum*, ait, *ita pars similis ad similem partem*. Anguli et sphaera eodem modo secantur.



[Fig. 3]


5 ad polum erg. L

5

10

Theor. 2. In Triangulis Sphaericis (+ circulis magnis comprehensis +) in quibus duo latera simul sumta semicirculo aequalia, se habent areae, ut anguli duobus lateribus comprehensi scilicet $GEFG$ ad $(G)(E)(F)(G)$, ut angulus in E ad ang. in (E) . Nam $GEFG$ Triangulum aequale Triangulo HEI . si arcus GOF transeat in O medio per aequatorem. Nam utrumque sectionis peponalis dimidium. Patet sectiones peponales esse ut angulos, ergo et eorum dimidia. $GE + EF$ faciunt semicirculum, ut patet.

Prop. 3. Problema: Triangulo sphaerico cuius duo latera simul sumta sunt aequalia semicirculo invenire aliud aequale quod habeat vel latus vel angulum datum, cum duobus lateribus semicirculo aequalibus. Hoc facile.




10

[Fig. 4]

Datum ABC . quaesitum cuius angulus AH , erit HAI , et I determinatur circuli magni arcu ducto HEI .

Nunc progrediamur ad Triangula in quibus latera simul sumta non faciunt semicirculum et Prop. 5. Problema: Invenire aream Trianguli Sphaericci isoscelis cuius crura simul sumta sunt semicirculo majora aut minora.

4 medio erg. L 6f. patet | Iam porro progressus ostendit, qvomodo dato Triangulo Sphaericco (magno scil.) aliud inveniri possit, cuius duo latera simul aeqvalia semicirculo. gestr. | (1) In (2) Hoc praestat (3) prop. L




[Fig. 5]

Sit Triang. ABC . $AB \sqcap AC$. BA et BC continua in D ut sectio peponalis fiat erit ADC Triangulum cujus duo latera AD , AC faciunt semicirculum (nam $AD + AC \sqcap AD + AB$.) Ergo Triangulum ADC haberetur, ergo si auferatur a sectione peponali, etiam data, restabit area dati ABC .

5

Hinc problema solvit prop. 6. Invenire isosceles birectangulum dato alteri isosceli aequale: hoc modo: Si[t] propositum triangulum isosceles, tolle supplementum anguli verticalis, ex summa angulorum ad basin residuum, erit angulus verticalis Trianguli birectanguli aequalis cum isoscele dato. Scilicet p r o p. VI. Invenire isosceles birectangulum dato alteri isosceli aequale:


10



[Fig. 6]

Dati isoscelis ABC . producatur basis BC . lat., AB . ut fiat pepo. [...] Anguli ABC . duplus ABF . Ergo Birectangulum $DBF \sqcap$ peponi $ABCG$. Si tollas GAC ex pepone sive ex DBF vel quod eodem recidit, ut patet ex prop. 2. Si tollatur angulus GAC vel ipsi sumtus aequalis DBI ex DBF remanebit verticalis angulus $\nabla^{li}IBF$, quod aequale ∇^{lo} 15 isosceli dato ABC .

15



[Fig. 7]

Prop. VII. Invenire isosceles birectangulum dato Triangulo rectangulo vel scaleno cuilibet non rectangulo aequale. In isoscele ABC. ducatur a vertice A. perpendicularis arcus AK, ergo bisecatur isosceles in duo aequalia Triangula rectangula. AKB. AKC.

5 *utriusque area, seu birectangulum ei aequale sic invenietur facile. Si ex $\nabla^{\text{ang.}}$ ABC. dimidio anguli ABF tollatur angulus ABI seu dimidius anguli CAG relinquetur enim angulus IBE qui est verticalis, angulus Trianguli birectanguli IBE quod est aequale cum rectangulo AKB vel AKC in isoscele ABC. Hic enim processimus per medietates sicut in praecedenti problemate per totalitates. Ut autem se habet totum ad totum, ita medietas ad*

10 *medietatem. Eodem modo in omnibus rectangulis Triangulis reperiri potest birectangulum aequale, ut satis patet, si nempe ex altero acutorum tollatur dimidium supplementum duplicati alterius acuti anguli, id est, dimidium supplementum anguli BAC qui est angulus duplicatus anguli BAK. Quod enim relinquetur erit angulus verticalis birectanguli cum dato rectangulo aequalis. [...] Hinc autem satis patet idem quod supra contingere, id est*

15 *obtineri birectangulum aequale dato rectangulo, sive istud datum sit pars isoscelis ut contingit in triangulo isoscele ABC, sive sit pars Scaleni, ut contingit in triangulo Scaleno ABO. Semper enim eodem modo obtinebitur dictum birectangulum dato rectangulo aequale. Imo hinc colligitur modus facillimus metiendi Triangula sphaerica quaelibet. Nam isosceles birectangulum aream suam prodit angulo suo verticali. Quodlibet autem isosceles non birectangulum facile revocatur ad birectangulum, sicut et quodlibet rectangulum revocari potest ad birectangulum. Imo et quodlibet etiam scalenum revocari potest ad birectangulum, quia dividi potest in duo rectangula, et duo rectangula ad duo birectangula, et duo birectangula ad unum birectangulum, cuius videlicet angulus verticalis adaequet duos angulos verticales duorum aliorum birectangulorum.*

Prop. 8. Triangula aequalia sphaerica habent aequalem summam angulorum.

Et prop. 9. est hujus conversa. Sequuntur aliquot problemata usque ad prop. 15. quae horum consequentiae; item alia in quibus ex tribus datis Trianguli reliqua inveniuntur, et area anguli unius vel lateris locum subit. Meminisse autem oportet per Trigonometriam, quodlibet trianguli latus facile reperiri, datis aut repertis angulis ∇^{li} sphaericici. 5

Prop. 25 ad 29. notanda habet Problemata de arcuum trientibus, exempli causa, *si latus aequilateri Trianguli facti ad verticem isoscelis birectanguli abscindat in tertia parte complementum anguli verticalis dicti isoscelis, erit istud aequilaterum illi isosceli aequale.*

Prop. 31. *Si sphaerico isosceli birectangulo fiat ad ejus verticem aliud isosceles aequale prioris tantae parti, quantae ipsum posterius est pars certi polygoni regularis, et habens in vertice centrale angulum istius certi polygoni; angulus ad basin istius posterioris isoscelis compositus erit ex semiangulo polygoni rectilinei regularis cuius assumptus est centralis angulus, et ex dimidia parte tantae portionis anguli verticalis prioris isoscelis, quot habet polygonum latera. Nimirum ut habeantur polygonorum regularium centrales anguli oportet tantum dividere 360 per numerum laterum polygoni, quotiens enim erit centralis angulus. Ut vero habeantur anguli polygoni rectilinei, tollendus est angulus centralis polygoni ex 180. residuum erit angulus polygoni rectilinei.* 10 15

Polygona:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Centrales anguli	120	90	72	60	51 $\frac{3}{7}$	45	40	36	32 $\frac{8}{11}$	30	20
Anguli polygoni rectilinei	60	90	108	120	128 $\frac{4}{7}$	135	140	144	147 $\frac{3}{11}$	150	
Semiang. polyg. rectil.	30	45	54	60	64 $\frac{2}{7}$	67 $\frac{1}{2}$	70	72	73 $\frac{7}{11}$	75	

In Prop. 41. ait autor se dare jam dimensionem omnium arearum superficiei spherae, circulis comprehensorum non vero linearum aliarum *quae in superficie sphaerae describi possent, ut parabolicae, Hyperbolicae, Ellipticae, de quibus inquit olim nobis sermo fuit in opusculo de Sectione Conicae, Sphaericae, Cylindricae, superficierum ab in-* 25

15 polygonorum (1) rectilineorum (2) regularium L

26 opusculo: P. COURCIER, *Opuscolum de sectione superficie sphaericae*, 1663.

vicem. NB (+ non capio quomodo in sphaerae superficie describi possent hujusmodi curvae. +)

Determinare limites angulorum quos habet quodlibet polygonum regulare. Prop. 32.
Polygona regularia [Sphaerica] non habent se semper eodem modo in quantitate suorum
 5 *angulorum, sicut polygona rectilinea, quae angulos suos semper eosdem habent. Puta*
Trigona semper habent angulos grad. 60. Tetragona 90. [...] At sphaerica angulos illos
variant, cuius variationis limites hic postulantur. Quoniam autem ex praecedenti proposi-
tione et Corollario angulus polygoni Sphaericci componitur ex angulo polygoni rectilinei et
 10 *tanta parte anguli verticalis isoscelis birectanguli polygono Sphaericco aequalis, quot habet*
polygonum latera fit ut minimus limes tunc habeatur, si anguli polygoni rectilinei nihil
addatur; maximus vero si angulo polygoni rectilinei tanta portio addatur, quanta est pars
numeri 360 per numerum laterum polygoni divisa in quotiente relictta. Quorum limitum
differentia excursio angulorum nominari potest. [...] Et haec excursio juncta cum primo
sive minimo limite, dat limitem maximum.

15 His omnibus si jam addatur Archimedis artificium quo invenit portiones sphaericae superficie, et circulo parallelo comprehensas, jam omnes denique circulorum in sphaera intersectiones puto haberri possunt.

Hinc subjicit problema *Prop. 42. Data trium in terrae superficie locorum longitudine et latitudine, invenire aream superficie interceptam.*

20 Et *Prop. 43.* hoc notat: *Areae triangulorum Sphaericorum habentium aequalia cum Triangulis rectilineis latera aliquando sunt minores areis rectilineorum, aliquando majores aut aequales.*

Non est hic, inquit consulenda imaginatio sola, quae gibbositatem sphaericae superficie considerans facile sibi persuadebit, nunquam contingere, ut areae Triangulorum sphaericorum habentium aequalia cum rectilineis latera, sint minores areis rectilineorum.
 25 Verum rationem et experientiam sequendo dico, innumera, esse tam quae majorem, quam quae minorem habeant aream: *Hic libentissime* (inquit in fine) *subjicerem tabulam quam pro gradibus et minutis compositam birectangulorum quam peponum habeo, sed cogit omittere defectus typorum numeralium.* Subjicit recapitulationem.

21 minores | angulis ändert Hrsg. | rectilineorum L

40. MARGINALIEN IN BLAISE PASCAL, TRAITÉ DU TRIANGLE ARITHMETIQUE

Überlieferung: *LiH* Marginalien und Unterstreichungen in Bl. PASCAL, *Traité du triangle arithmetique*, Paris, 1665: HANNOVER *Leibniz-Bibl.* Nm-A 605. — Gedr.: VII, 3 N. 28 S. 323 Z. 25–29 (tlw.)
Cc 2, Nr. 00

5

Datierungsgründe: Leibniz' Beschäftigung mit Pascals Schriften, die 1665 im Band *Traité du triangle arithmetique* erschienen sind, spiegelt sich in zahlreichen Stücken wider. Für alle Texte mit Ausnahme von N. 40₆ finden sich Belege, die die einzelnen Marginalien und Unterstreichungen in verschiedenen Zeiträumen zwischen Frühjahr 1672 und Frühjahr 1673 sowie Ende 1673 bis Mitte 1674 verorten.

10

Aufschluss auf die Datierung der Marginalien an N. 40₆ gibt die letzte Anmerkung, die in Verbindung mit der Notiz LH 35 XII 2 Bl. 1 v^o und dem Konzept *De periodis fractionum decimalibus* (LH 35 III A 25 Bl. 1–3 u. 7–10) steht. Inhaltlich baut das Konzept auf den Arbeiten an den Stücken LH 35 III A 25 Bl. 15 r^o u. 14 v^o sowie LH 2 V 2 Bl. 46 v^o auf. Leibniz' Datierung der Schrift *De periodis fractionum decimalibus* auf Januar 1687 sowie sein Hinweis, dass die zugrundeliegenden Beobachtungen erst kürzlich entstanden seien, lässt eine Entstehung der Marginalie im Winter 1686/87 erschließen. Aus formalen und inhaltlichen Gründen ist von einer zeitgleichen Entstehung der übrigen Marginalien an diese Schrift Pascals auszugehen.

15


Die Schriften des Marginalexemplars erscheinen als Text, die zugehörigen Seitenzahlen sind in eckigen Klammern vorangestellt. Die Orthographie und ein Großteil der Textauszeichnungen wurden an die Grundsätze der Textgestaltung dieser Ausgabe angepasst. Kursivierungen einzelner Wörter oder kurzer Passagen, mit denen in den Schriften von Pascal Einzelheiten wie neue Bezeichnungen oder in den konkreten Rechenbeispielen allgemeine Lösungsansätze auftretende Werte hervorgehoben werden, wurden nicht mit übernommen. Marginalien aus Leibniz' Hand werden als Fußnoten zum Text wiedergegeben, seine Unterstreichungen durch Sperrung der entsprechenden Passagen hervorgehoben.

20

25

40₁. ZUR KLAPPTAFEL [Frühjahr – Herbst 1672]

Datierungsgründe: Vgl. N. 40.



2,4 *Daneben:*

Combinaisons

1	dans 6 se peut prendre à	6	differentes fois	<i>in Tabula</i>	N
2	15		ξ
3	20		ρ
4	15		K
5	6		Q
6	1		V

2,5 *Daneben:*

y rerum diversae	unitates	$\frac{y}{1}$
y rerum	com2nationes	$\frac{y, y - 1}{1, 2}$
	con3nationes	$\frac{y, y - 1, y - 2}{1, 2, 3}$
	con4nationes	$\frac{y, y - 1, y - 2, y - 3}{1, 2, 3, 4}$

2,8 *Daneben in Spalte 6:* $\text{\scriptsize \texttt{III}} \vdots \vdots \vdots \vdots \text{\scriptsize \texttt{III}} \vdots \vdots \vdots \text{\scriptsize \texttt{II}} \vdots \vdots \text{\scriptsize \texttt{I}} \vdots \vdots \vdots$ **2,10** diversae *erg. LiH*

3,2–8 Combinaisons: Vgl. Bl. PASCAL, *Divers usages du triangle arithmetique*, 1665, S. 4 f. [Marg.] (PO III S. 469–471) und DERS., *Combinationes*, 1665, S. 22 u. S. 32 f. [Marg.] (PO III S. 557 u. 586–593). Vgl. auch Leibniz' Auseinandersetzung mit dieser Thematik in N. 25. **3,10–13** y rerum diversae: Leibniz gibt hier die *a. a. O.*, S. 32 f. [Marg.] (PO III S. 586–593) dargestellten Zusammenhänge wieder. N. 25 belegt ebenfalls Leibniz' Beschäftigung mit diesem Thema, enthält jedoch keine Ansätze zur

Formalisierung. **3,14** $\text{\scriptsize \texttt{III}} \vdots \vdots \vdots \vdots \text{\scriptsize \texttt{III}} \vdots \vdots \vdots \vdots$: Gleiche und ähnliche Figuren finden sich in VII, 3 N. 3 S. 21–26.

40₂. ZUM TRAITTÉ DES ORDRES NUMERIQUES
 [Herbst 1672 – Winter 1672/73]

Datierungsgründe: Vgl. N. 40.

[S. 5 f.]

5 ... La maniere dont il a pris cette mesme proposition est telle.

En la progression naturelle qui commence par l'unité, un nombre quelconque estant mené dans le prochainement plus grand, produit le double de son triangle.

Le mesme nombre estant mené dans le triangle du prochainement plus grand, produit le triple de sa pyramide.

10 Le mesme nombre mené dans la pyramide du prochainement plus grand, produit le quadruple de son triangulo-triangulaire; et ainsi à l'infiny, par une methode generale et uniforme.

Voila comment on peut varier les enonciations. Ce que je monstre en cette proposition s'entendant de toutes les autres, je ne m'arresteray plus à cette 15 maniere accommodante de traitter les choses, laissant à chacun d'exercer son genie en ces recherches, où doit consister toute l'estude des Geometres: car si on ne scait pas tourner les propositions à tous sens, et qu'on ne se serve que du premier biais qu'on a envisagé, on n'ira jamais bien loing: ce sont ces diverses routes qui ouvrent les consequences nouvelles, et qui, par des enonciations assorties au sujet, lient des propositions, qui sembloient 20 n'avoir aucun rapport dans les termes où elles estoient conceües d'abord. ...

5 il: Bei der Passage in Z. 6–12 handelt es sich um eine französischsprachige Wiedergabe einer Beobachtung von Fermat, die dieser in einem Brief von Anfang Juni 1638 (*FO* II S. 70; *CM* VII S. 279) Mersenne mitgeteilt hatte. Später wurde sie als *Observatio D. P. F.* in *Diophanti Alexandrini De Multangulis Numeris Liber Unus*, 1670, S. 16 (*FO* I S. 341) veröffentlicht. Leibniz bezieht sich auf diese Übersetzung in S. 208 Z. 8 – S. 209 Z. 3. 13 varier les enonciations: Leibniz weist auf die unterstrichene Passage in *Aus und zu Galileis Discorsi*, VI, 3 N. 11₂ S. 167 Z. 10f. sowie später in VI, 3 N. 22₂ S. 331 Z. 8–11 hin.

40₃. ZU DE NUMERORUM CONTINUORUM PRODUCTIS

[Ende 1672 – Frühjahr 1673 sowie Ende 1673 – Mitte 1674]

Datierungsgründe: Vgl. N. 40.

[S. 13]

De numerorum continuorum productis,
seu
De numeris qui producuntur
ex multiplicatione numerorum serie naturali procedentium.

5

Numeri qui producuntur ex multiplicatione numerorum continuorum a nemine, quod sciam, examinati sunt. Ideo nomen eis impono nempe, producti continuorum.

10

...

[S. 16]

...

7 *Neben der zweiten Überschrift:* Producti continuorum cum progressionе harmonica, plurimum habent connexionis. Sed hoc Pascalius non observavit. Nimirum:

$\frac{1}{1} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{4}$ etc. est series progressionis harmonicae, reducendo omnes ad unum nomen fiet:

$$\frac{2, 3, 4 + 1, 3, 4 + 1, 2, 4 + 1, 2, 3}{1, 2, 3, 4}$$

14 f. continuorum (1) sunt progressionis harmonicae. (2) cum progressionе harmonica | plurimum habent connexionis *erg.* |, sed ... non (a) noverat (b) observavit *LiH*

14–18 Producti ... $\frac{2, 3, 4 + 1, 3, 4 + 1, 2, 4 + 1, 2, 3}{1, 2, 3, 4}$: Leibniz' Beschäftigung mit der Summation der

ersten Glieder der harmonischen Folge und die in der späteren Ergänzung der Marginalie angegebene Partialsumme sind in VII, 3 N. 10 S. 134 f. sowie in N. 11 S. 140 f. belegt. Zudem sind der Summe der harmonischen Progression die Stücke VII, 3 N. 27 und 28 gewidmet. In letzterem weist Leibniz explizit auf S. 323 Z. 2 – S. 324 Z. 5 auf den in der Marginalie erwähnten Zusammenhang zwischen den Produkten aufeinanderfolgender Zahlen und der harmonischen Progression hin.

Problema.

Dato quocunque numero, invenire tot quot imperabitur, numeros continuos ex quorum multiplicatione factus numerus, sit maximus ejus speciei qui in dato numero continetur.

- 5 Oportet autem datum numerum non esse minorem producto totidem numerorum ab unitate continuorum.

Datus sit numerus verbi gratia 4335. Oporteatque reperire verbi gratia quatuor numeros continuos ex quorum multiplicatione factus numerus sit maximus qui in dato 4335 continetur, eorum omnium qui producuntur ex multiplicatione quatuor numerorum 10 continuorum.

Sumantur ab unitate tot numeri continui quot sunt numeri inveniendi, nempe quatuor in hoc exemplo, 1, 2, 3, 4, quorum per productum, 24, dividatur numerus datus sitque quotiens, 180. Ipsius quotientis inveniatur radix ordinis numerici non quidem quarti sed sequentis nempe quinti sitque ea, 6. Ipse, 6, est primus numerus, secundus 7, 15 tertius 8, quartus 9.

...

404. ZU NUMERICARUM POTESTATUM GENERALIS RESOLUTIO

[Ende 1672 – Frühjahr 1673]

Datierungsgründe: Vgl. N. 40.

- 20 [S. 19]

...

Problema.

Dato quolibet numero invenire radicem propositae potestatis maxima quae in dato continetur.

¹³ radix ordinis: Die von Leibniz unterstrichene Passage steht in einem inhaltlichen Bezug zu Bl. PASCAL, *Numericarum potestatum generalis resolutio*, 1665, S. 19 [Marg.] (PO III S. 550 f.), die Leibniz ebenfalls mit einer Unterstreichung und einer Anmerkung versehen hat. VII, 1 N. 106 S. 673 Z. 19 f. belegt Leibniz' Auseinandersetzung mit dem von Pascal vorgestellten Problem.

Sit datus numerus v.g. 4335, et invenienda sit radix gradus v.g. quarti maximi numeri quarti gradus seu quadrato quadrati qui in dato numero contineatur.

Inveniantur, ex praecedente tractatu, quatuor numeri continui, quia quartus gradus proponitur, quorum productus sit maximus ejus speciei qui in 4335 contineatur, sintque ipsi, 6, 7, 8, 9.

5

...

40₅. ZU POTES TATUM NUMERICARUM SUMMA

[Juli – Dezember 1672]

Datierungsgründe: Vgl. N. 40.

[S. 36]

10

...

Ad summam Potestatum cuiuslibet progressionis inveniendam
unica ac generalis methodus.

Datis quotunque numeris, in qualibet progressione, a quovis numero inchoante,
invenire quarumvis potestatum eorum summam.

15

14 Ergänzung von arithmeticā über progressionē

3 *Gestr. Bem. an praecedente tractatu*: Sed in praecedente tractatu opus fuit radicum extractione. *LiH*

3 *praecedente tractatu*: Vgl. Bl. PASCAL, *De numerorum continuorum productis*, 1665 [Marg.] (PO III S. 528–543), insbesondere *Problema*, S. 538–543. 15 opus fuit: Beim Verweis auf die Stelle im vorausgehenden Traktat in VII, 1 N. 106 S. 673 Z. 19 f. erwähnt Leibniz den vermeintlichen Fehler Pascals nicht. 17 arithmeticā: Die Anmerkung, dass Pascals Beobachtung nur für die arithmetische Progression gilt, findet sich ebenso in VII, 3 N. 43 S. 442 Z. 15–17.

40₆. ZU DE NUMERIS MULTIPLICIBUS
 [Winter 1686/87]

Datierungsgründe: Vgl. N. 40.

[S. 42]

5

De numeris multiplicibus.

Ex sola characterum numericorum additione agnoscendis.

...

[S. 42 f.]

...

10

Propositio unica.

Agnoscere ex sola additione characterum dati cuiuslibet numeri, an ipse sit alterius dati numeri multiplex.

Ut haec solutio fiat generalis, litteris utemur vice numerorum. Sit ergo divisor, numerus quilibet expressus per litteram A ; dividendus autem, numerus expressus per litteras $T\,V\,N\,M$, quarum ultima M exprimit numerum quemlibet in unitatum columna collatum; N , vero, numerum quemlibet in denariorum columnna; V , numerum quemlibet in columna centenariorum; T , autem numerum quemlibet in columna millenariorum, et sic deinceps in infinitum: ita ut si litteras in numeros convertere velis, assumere possis loco

6 *Im Anschluss:* Non haec tantum sed et his ampliora mea methodo inveni.

18–263,2 *Am Rand:*

$10 - fA$ aequ. B

$100 - fA10 - gA$ aequ. C

$1000 - fA100 - gA10 - hA$ aequ. D

19 mea methodo: Gemeint sind wohl Ergebnisse, die Leibniz in seinem Konzept *De periodis fractio- num decimalibus* (LH 35 III A 25 Bl. 1–3 u. 7–10) vom Januar 1687 vorstellt. Auf die vorliegende Schrift Pascals verweist Leibniz zuvor schon in VII, 2 N. 5 S. 37 Z. 11. Den dort verfolgten Ansatz arbeitet Leibniz jedoch nicht vollständig aus.

ipsius, M , quemlibet ex novem primis characteribus verbi gratia 4, loco N quemlibet numerum ut 3, loco V quemlibet numerum ut, 5; et loco T , quemlibet numerum ut 6; et collocando singulos illos characteres numericos in propria columna; prout collocatae sunt litterae quae illos exprimunt, proveniet hic numerus, 6 5 3 4, divisor autem A erit numerus quilibet ut 7. Missis autem peculiaribus his exemplis generali ista enunciatione omnia amplectimur.

Dato quocumque dividendo $TVNM$, et quocumque divisore A , agnoscere ex sola additione characterum numericorum T , V , N , M , utrum ipse numerus $TVNM$ exacte dividatur per ipsum numerum A .

Ponantur seorsim numeri serie naturali continui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et caet. a dextra ad sinistram sic.

et caet.	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
et caet.	K	I	H	G	F	E	D	C	B	

Jam ipsi primo numero, 1, subscribatur unitas.

Ex ipsa unitate decies sumpta, seu ex 10 auferatur A quoties fieri poterit, et supersit B qui sub 2 subscribatur.

Ex B decies sumpta seu ex 10 B , auferatur A quoties poterit, et supersit C qui ipsi 3 subscribatur.

Ex 10 C , auferatur A quoties poterit et supersit D qui ipsi 4 subscribatur.

Ex 10 D , auferatur A etc. in continuum.

Nunc sumatur ultimus character dividendi M , qui quidem et primus est a dextra ad sinistram, scribaturque seorsim semel; primo enim numero 1, subjacet unitas.

Jam, sumatur secundus character N et toties repetatur quot sunt unitates in B , qui secundo numero subjacet, hoc est multiplicetur N per B et sub M ponatur productus.

jam sumatur tertius character V , et toties repetatur quot sunt unitates in C , sub tertio numero subjecto, seu multiplicetur V per C et productus sub primis ponatur.

Sic denique multiplicetur quartus T per D , et sub aliis scribatur.

Et sic in infinitum.

21 *Marginalie im Druck:*

M

N in B

V in C

T in D

Dico prout summa horum numerorum, M , $\dagger N$ in B , $\dagger V$ in C , $\dagger T$ in D , est ipsius A multiplex aut non, et quoque ipsum numerum $TVNM$, esse ejusdem multiplicem, vel non.

Etenim si propositus dividendus unicum haberet characterem M sane prout ipse esset multiplex ipsius A , numerus quoque M esset ejusdem A multiplex, cum sit ipse numerus totus.

Si vero constet duobus characteribus, NM , dico quoque, prout M , $\dagger N$ in B , est multiplex A , et ipsum numerum, NM , ejusdem multiplicem esse.

Etenim character N in columna denarii, aequatur $10N$,

10	Verum ex constructione, est	$10 - B$. multiplex A .
	Quare ducendo $10 - B$ in N est	$10N - B$ in N multiplex A .
	Si ergo contingit et esse	$M, \dagger B$ in N multiplicem A .
	Ergo ambo ultimi multiplices juncti	$10N \dagger M$ erunt multipl. A .
15	Id est N in columna denarii et M in columna unitatis, seu numerus	NM est multiplex A .

Q. E. D.

Si numerus dividendus constet tribus characteribus, VNM , dico quoque ipsum esse aut non esse multiplicem A , prout, $M, \dagger N$ in $B \dagger V$ in C , erit ipsius A multiplex, vel non.

20	Etenim character V , in columna centenarii, aequatur $100, V$.	
	At ex constructione, est	$10 - B$, multiplex, A .
	Quare multiplicando $10 - B$ per 10	$100 - 10B$, multip. A .
	Et ducendo ipsos in V	$100V - 10B$ in V , mult. A .
	Sed est etiam ex constructione,	$10B - C$, multip. A .
25	Quare ducendo in V ,	$10B$ in $V - C$ in V , mult. A .

10–15 Am Rand:

$10 - B$ aequ. fA

$10N - BN$ aequ. NfA

$10N - BN + BN + M$ aequ. $NfA + VA$

Ergo $10N + M$ aequ. $NfA + VA$

Sed ex ostensis	100 $V - 10B$, in V , mult. A .
Ergo juncti duo ultimi	100 $V - C$ in V , mult. A .
Jam vero ostendemus ut in secundo casu	10 $N - B$ in N , mult. A .
Ergo juncti duo ultimi	100 $V + 10N - C$ in $V - B$ in N , mult. A .
Ergo si contingat hos numeros	C in $V + B$ in $N + M$, esse mult. A .
Ambo ultimi juncti nempe	100 $V, + 10N, + M$; et mult. A .
Seu V in columna centenarii N denarii et M unitatis, hoc est numerus VNM , est multiplex, A . Q. E. D.	

Non secus demonstrabitur de numeris ex pluribus characteribus compositis. Quare prout etc. Q. E. D.

10

Exemplis gaudemus.

Quaero, qui sint numeri multiplices numeri 7? Scriptis continuis, 1, 2, 3, 4, 5, etc. subscribo, 1, sub 1.

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
6	2	3	1	5	4	6	2	3	1

15

Ex unitate decies sumpta, seu ex 10 aufero 7 quoties potest, superest 3 quem pono sub 2.

Ex 3 decies sumpto, seu ex 30 aufero 7 quoties potest, superest 2 quem pono sub 3.

Ex 20 aufero 7 quoties potest, superest 6 et pono sub 4.

Ex 60 aufero 7 quoties potest, superest 4 et pono sub 5.

20

Ex 40 aufero 7 quoties potest, superest 5 et pono sub 6.

Ex 50 aufero 7 quoties potest, superest 1 et pono sub 7.

Ex 10 aufero 7 quoties potest, et redit 3 et pono sub 8.

Ex 30, aufero 7 quoties potest, et redit 2 et pono sub 9.

264,21–265,6 Am Rand:

$$\begin{array}{rcl}
 100V - 10BV & \text{aequ. } & 10VfA \\
 + 10BV & \text{aequ. } & VgA \\
 - CV & & \\
 + 10N - BN & \text{aequ. } & NfA \\
 \hline
 CV + BN + M & \text{aequ. } & V A \\
 \hline
 100V + 10N & + M & \text{aequ. } \dots A
 \end{array}$$

Et sic credit series numerorum, 1, 3, 2, 6, 4, 5, in infinitum.

...

1 *Bemerkung am Rand:* Est periodus residuorum decimalis fractionis dati numeri

$\frac{1}{7}$ *BCDEF*
0 1 3 2 6 4 5 1 3 2 6 4 5 1 3 2 etc. nam: $\frac{1}{7}$ aequ. 0142857142857 etc.

$\frac{1}{7}$ *BCDEF*
1 1 1 1 1 1 1 *PQRSTUV*
~~X~~ 0 0 0 0 0 0 0 f 0 1 4 2 8 2 5 7
7 7 7 7 7 7 7

$$\begin{array}{ll} AP + B & \text{aequ. } 10 \\ AQ + C & B0 \\ AR + D & C0 \end{array}$$

B. C. D. etc. sunt minores quam 7.

3f. periodus (1) decimalis fractionis dati numeri $\frac{1}{7}$ aequv. 0132645 (a) imo error: non sunt (b) imo error est, (aa) non sunt (aaa) numeri, sed (bbb) qvotientes periodici, sed residui (bb) nam $\frac{1}{7}$ aequv.

0142857142857 etc (2) residuorum ... numeri (a) 0 1 3 2 6 4 5 (b) 0 1 3 2 6 4 5 1 3 2 6 4 5 1 3
PQRSTUV
etc *LiH* 5-8 0 1 4 2 8 2 5 7 (1) AP aequv. 10 (2) AP + B aequ 10 (a) P. Q. R. (b) B. C. D. etc. *LiH*
AQ aequv. B0 AQ + C B0
AR aequv. C0 AR + D C0

PQRSTUV

5 0 1 4 2 8 2 5 7: Leibniz gibt die Dezimalperiode von $\frac{1}{7}$ fehlerhaft an. 6-8 $AP + B$ aequ. 10 ...

C0: Vgl. S. 263 Z. 14–20. 10-12 132645: Dieselbe falsche Annahme, dass es sich bei der urprünglich angegebenen Zahlenfolge 132645 um die Dezimalperiode von $\frac{1}{7}$ handelt, findet sich ebenso im Stück LH 35 XII 2 Bl. 1 v°, in dem sich Leibniz mit der vorliegenden Schrift Pascals auseinandersetzt. Leibniz erkennt dort den Fehler und korrigiert ihn.

41. FORMAE COMBINATORIAE
20. Oktober 1675

Überlieferung: L Konzept: LH 35 XII 1 Bl. 16. Der Länge nach ungefähr halbiertes Bl. 2°,
ca 35 × 13 cm, rechts relativ glatte, links unregelmäßige Schnittkante. 1 S. auf Bl. 16 r°.
Auf Bl. 16 v° VII, 7 N. 56. — Gedr.: LKK 2, 1976, S. 48–51.
Cc 2, Nr. 1079

5

20. Octob. 1675

F o r m a e C o m b i n a t o r i a e

In Omni combinatione sunt characteres. Ex characteribus existunt formae. Formae sunt perfectae aut imperfectae. Imperfectae reducuntur ad perfectas, addendo aut adiumento et in plures resolvendo. Characteres sunt Capitales aut incidentes. Characteres in Combinatoria generali non aliud habent discrimen, quam ut intelligantur diversa, nec opus est, ut diversitatis speciem excutiamus. Formae perfectae Elementares sunt aut Compositae. Elementares sunt ut $m \mid m^2 \mid mn \mid m^2n \mid mnv$ etc. vel $m^2 \mid m^2n$, ubi $n \mid . \mid v \mid bn^2 \mid dm^2v$

in posteriori b et d . sunt incidentes. Cum eaedem incidentes afficiunt Capitales similes

10

15

7 f. 20' Octob. ... C o m b i n a t o r i a e erg. L 9 Ex (1) characteris (2) characteribus (a)
Elementa existunt Combinandi, (b) existunt L 11 resolvendo. (1) Formarum perfectarum sunt gradus.
Sunt | enim *nicht gestr.* | (2) Characteres L 13 excutiamus. (1) | Si *nicht gestr.* | (a) cha (b) in form
(2) Formae L 14 m | erg. Hrsg. | (1) m² (2) m² | (a) mn (b) mn L 14 m² (1) m²v (2)
n | n² | v | bn² | dm²n

m^2n, L
 dm^2v

9 characteres: Vgl. N. 51.

tunc formas Elementares appello concordantes ut m^2n , vel quod coincidit mnm (NB.

$$\begin{array}{ccc} \cdot & v & \cdot & n \\ n^2 & m & & mvm \\ \cdot & v & \cdot & v \\ v^2 & m & & nv n \\ \cdot & n & \cdot & v \end{array}$$

ubi ut obiter dicam has duas formas coincidere est theorema demonstrabile et quod alias in infinitum formas extenditur, et tamen quivis videt esse identicam propositionem, re resoluta usque ad characteres simplicissimos. Ut hinc appareat theore-

5 mata nihil aliud dare quam modum contrahendi cogitationes per characteres ut facilior reddatur ratiocinatio sed hoc obiter) discordantes essent si quilibet terminus haberet

peculiarem affectorem, ut si esset $\frac{1}{b}m^2n$. Semiconcordantes sunt, si concordant
 $c m^2v$
etc.

quaedam partes formae, ut bm^2n . et harum sunt varii gradus. Nam fieri potest, ut non sit

$$\begin{array}{c} v \\ cn^2 m \\ v \end{array}$$

hoc in singulis partibus ut si his addatur adhuc dv^2m . Partiales formae sunt,

$$e..n$$

10 quaecunque enuntiandi aliquod compendium constans accipere possunt, ut m^2n . Totum

$$v$$

enim affectionem habet communem. Rectius appelles Membrum, etc. Potest fieri semi concordantia, si forma aliqua concordet quae ipsa per se constituit perfectam formam,

1 f. formas | Elementales ändert Hrsg. | appello (1) consonas (2) concordantes (a). Sin mi (b) ut m^2n , (aa) Sin (bb) vel | qvod coincidit erg. | mnm (| NB. erg. | ubi L 6 obiter |, ändert Hrsg. | (1)

$$\begin{array}{ccc} \cdot & v & \cdot & n \\ n^2 & m & & mvm \\ \cdot & v & \cdot & v \\ v^2 & m & & nv n \\ \cdot & n & \cdot & v \end{array}$$

praetere (2) discordantes L 7 peculiarem (1) multiplicatorem, (2) affectorem, L 8 quaedam (1) formae, qvae ipsae per se perfectae intelligi possent, aliis scilicet literis (2) partes L 8 ut (1) m (2) bm^2n . L 9 adhuc (1) m (2) dv^2m . L 11 appelles (1) Coef (2) coaffertas (3) Membrum, L

$$\begin{array}{ccc} v & & e..n \\ cn^2 m & & \\ v & & \end{array}$$

12 constituit (1) gradum (2) perfectam L

ut $mnm.$ est perfecta per se, si non accedat litera $v.$ Unde melior est dispositio haec: mm
 n

etc. quam m^2n etc. quia praecedens distinguit formas per se perfectas. Haec de formis
 v

Elementaribus. Sequuntur Formae Graduum, quae scilicet gradum integrum complent,
ut: si in unam surgas, $\frac{m^2 + mn}{n^2} \quad m$ item $\frac{m^3 mnm}{n^3 n}$ | $\frac{m^2 mn m}{n^2 n}$. Eaeque rursus sunt
 A B

aut repetunt formas graduum priorum, aut omnes aut quasdam ut $A. B.$ simul, aut non
repetunt ut $A.$ tantum. Hae jam formae continent apicem Combinatoriae artis, et ipsius
Calculi generalis in universum.

Condantur jam Tabulae, ubi statim si inceperimus nonnihil Caetera se 5
ipsis patebunt, ac scribi poterunt prima pro formis illis Elementaribus Concordantibus, quae du-
cantur in se invicem, prodibunt aliae graduum superiorum, et hinc jam apparent resolutio
aliarum similium. Et modus formam datam investigandi, sitne divisibilis an indivisibilis
etc. et quo nam addito vel ademto fiat resolubilis. Hoc elegantissima theorematum dabit pro
concordantibus, et forte modum resolvendi omnes aequationes etc. Pro discordantibus,
eodem procedendum modo, et habebitur etiam progressio ac tabula, ut imposterum talia
nullo negotio scribi possint. Condita discordantium Tabula, sequetur major illa Tabula, 10
qua continetur apex combinatoriae. Nimirum Tabula tollens literas, ob plures aequatio-
nes. Nimirum formulae graduum cogitentur esse aequationes, sive nihilo aequales, et ope
tabularum superiorum facilius calculabitur, admirabilis illa Tabula, qua semel data et
ad gradus satis altos continuata, restabit calculus omnis et omnes multiplicationes, divi-
siones, radicum extractiones, fient imo saepe et formularum additiones et subtractiones 15
fient transscribendo tantum ex tabula, et quasdam in ea literas supponendo nihilo aequales.
Hac Tabula continetur omnis comparatio formarum, cum enim quaedam coincidere
dicimus aequationem dicimus. Comparatio autem formarum combinatoria est. Hactenus
omnis consideratio fuit non nisi rationalium, at ex iisdem jam oriuntur irrationalium
20

$$\begin{array}{l} 1 \text{ haec: (1) } m^2 \text{ (2) } mm \text{ } L \quad 3 \text{ Seqvuntur (1) formae perfectae (2) Formae } L \quad 4 \text{ item (1) } m^2 v^3 \\ \text{ (2) } \frac{m^3 mnm}{n^3 n} \mid \begin{array}{l} (a) \frac{m^2 mn}{n^2 n} \quad (b) \frac{m^2 mn m}{n^2 n} \end{array} \quad 12 \text{ elegantissima (1) dabit (2) theorematum | dabit erg. |} \\ \hline A \quad \text{aut} \quad B \end{array}$$

(a) qvo (b) pro L 18 superiorum (1) facillime cal (2) facilis L 21f. aeqvales. (1) Haec Tabula
comparetu (2) Hac L

inventiones omnes. Nimirum cum comparando obtinetur pura quaedam potestas coincidens cuidam dato. At affectae quaelibet potestas secundi gradus redi potest pura. Et Cubica redi potest pura ex data secundi gradus affecta. Et ita porro in infinitum. Id est pro cubo resolvendo habetur aequatio $x^6 \cdot x^3 \cdot x^0 \sqcap 0$. pro quadrato-quadrato: 5 $x^{12} \cdot x^8 \cdot x^4 \cdot x^0 \sqcap 0$. pro surdesolido $x^{20} \cdot x^{15} \cdot x^{10} \cdot x^5 \cdot x^0 \sqcap 0$. Quaelibet autem aequatio data surdesolida v.g. $y^5 \cdot y^4 \cdot y^3 \cdot y^2 \cdot y^0 \sqcap 0$. reduci potest ad ejusmodi aequationem 20^{mi} gradus per artem infallibilem analyticam; quod ope Tabulae superioris jam conditae, nullo negotio fiet. Hinc jam progrediemur ad resolutiones per irrationales aequationum plurium incognitarum, quando scilicet fieri potest, ut nulla ex pluribus 10 incognitis in irrationali contineatur, vel una non, vel duae non, etc. Sed et hic explicabitur quando aequatio aliqua dividi potest per aliam rationalem vel irrationalem; ut simplicissimae obtineantur reductiones.

Omni theoremate compendioso oblato quaerendus est modus quo commode inveniri potuisset, quod semper fiet per certos quosdam novos characteres, ipsam relationem sive 15 progressionem indicantes combinationum. Quando calculando redimus ad aequationem similem datae, et quasi per Circulum, signum est tamen quibusdam sublatis vel destrutis, potuisse nos hoc praevenire. In Geometria jam situs addendus, cuius ope plurima compendiose habentur, quaerendus semper modus demonstrandi per analysin compendiosam, theorema Geometricum, et contra per ductum linearum theorema analyticum. 20 Hunc enim velut lapidem lydium nobis natura dedit et originem inventionum. Memini quae calcularam de meae curvae anonymae ad cissoeidem ventione facile ostendi per ∇^{la} similia. Praeclarum illud Vietae de Supplemento Geometriae. Quaerendae constructiones simplicissimae ex ipsa Geometria: Novis opus ad eam rem characteribus. Geometria sine

1 obtinetur (1) qvantitas qvaedam (2) pura L 4 est (1) cubus reducitur (2) pro L 6 v.g.
 (1) $x^5 \cdot x^4$ (2) $y^5 \cdot y^4 \cdot y^3 \cdot y^2 \cdot y^0 \sqcap 0$. L 7 analyticam; (1) si scilicet (2) | qvod erg. | ope L
 22 de (1) situ (2) Supplemento L

21 f. qvae . . . similia: Gemeint sind die Berechnungen in VII, 6 N. 8 S. 94–106, die Leibniz in der auf dieser Vorlage basierenden französischsprachigen Fassung III, 1 N. 39₂ wohl im Oktober 1674 an Huygens gesendet hatte. In beiden Stücken wählt er für die von ihm erstmals in VII, 6 N. 8 S. 94 Z. 11 – S. 95 Z. 12 eingeführte Kurve die auch hier genannte Bezeichnung. Auf die Verwendung der Kurve in J. GREGORY, *Exercitationes geometricae*, 1668, prop. VI, S. 23 f. hatte Huygens Leibniz allerdings bereits in seinem Antwortschreiben III, 1 N. 40 vom 6. November 1674 hingewiesen. Vgl. die Erl. zu VII, 6 N. 8 und zu III, 1 N. 39₂ u. N. 40. 22 Vietae: Fr. VIÈTE, *Supplementum geometriae*, 1593 (VO S. 240–257).

figuris demonstrari potest imo demonstratur reapse. Nam non magis figurae necessariae ad demonstrationes Geometricas quam moduli ad Mechanicas. Itaque falsum est Geometriam servire ad imaginationem nam et ipsa contrahit ideas, adhuc magis quam Algebra, quemadmodum doctrina de motu adhuc magis quam utraque. Nam ejus characteres plus essentiae involvunt, nam Geometria per magnitudinem etiam situm seu locum; Motus praeterea et ordinem sive tempus. Data descriptione Logarithmicae et Quadratricis uno tractu, sive sectrice anguli et sectrice rationis, constructiones omnes Geometricae eo reduci debent, unde videndum quomodo sine analysi ex ipsis ducantur irrationales per ductum tantum linearum.

1 figuris (1) demonstratur (2) demonstrari L 7 sive (1) sectione (2) sectrice L

42. DE DISCRIPTIONIBUS NUMERORUM

[April – Dezember 1670 (?)]

Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 XII 1 Bl. 17. 1 Bl. 2°. 1 S. auf Bl. 17 r°. Bl. 17 v° leer. —

Gedr.: LKK 2, 1976, S. 256–258.

5 Cc 2, Nr. 00

Datierungegründe: Aus inhaltlichen Gründen fällt das vorliegende Stück in die Anfänge von Leibniz' Auseinandersetzung mit Zerfällungen. Die Erwähnung der *Dissertatio de arte combinatoria* legt Ende März 1666 als gesicherten *terminus post quem* für die Entstehung fest. Die intensive Verwendung diakritischer Zeichen spricht für eine Datierung noch vor Leibniz' Aufenthalt in Paris. Vor diesem Hintergrund erweist sich Leibniz' Hinweis auf den Begriff *Zerfällung* als deutschsprachige Entsprechung für *discriptio* ebenfalls als stimmig. Unmittelbar im Anschluss an die *Dissertatio de arte combinatoria* führt Leibniz lediglich Arbeiten zum Teilbereich der juristisch-kombinatorischen Themen fort, und dies auch nur in geringem Umfang. Insbesondere sind für diese Zeit keine Hinweise auf eine Weiterführung der Beschäftigung mit Fragen der Kombinatorik oder die kombinatorische Behandlung mathematischer Probleme im überlieferten Textkorpus vorhanden. Erst um die Zeit des ersten Briefs an Athanasius Kircher vom 16. Mai 1670 (II, 1 N. 20a), in dem sich Leibniz auf Kirchers 1669 neu erschienene *Ars Magna Scientiæ Combinatoria* bezieht und sich selbst als Gelehrten im Bereich der Kombinatorik vorstellt, beginnen Bezüge auf die Kombinatorik erneut und in der vollen Breite des thematischen Spektrums sichtbar zu werden — sei es durch Verweise auf seine *Dissertatio*, der Verwendung der Kombinatorik als Methode in den Rechtswissenschaften, dem Auftreten der Kombinatorik als Methode und als Teilbereich der Mathematik, oder auch im grundsätzlichen Verständnis der Welt als *combinatio* etwa in Bezug auf Materie oder Bewegungen von Planeten. Somit liegt eine genauere Datierung des vorliegenden Stücks in die Zeit ab etwa April 1670 nahe. Leibniz verweist außerdem auf die Nutzung maschineller Rechenverfahren zur Lösung umfangreicher Berechnungen. Zudem bestehen enge inhaltliche und methodische Bezüge (Gewichte; Rechenverfahren; als *Zerfällungen* auffassbare Zahlenzerlegungen auf LH 42, V Bl. 16 r°; Verwendung von Differenz-Schemata als Analysemittel) zu Passagen auf dem Bogen LH 42 V Bl. 15–16, auf dem sich auch der Anfang von Leibniz' ältestem überlieferten Konzept *Instrumentum arithmeticum* (Druck in Reihe VIII) zur Rechenmaschine befindet. Üblicherweise werden die ältesten erhaltenen Arbeiten zu Leibniz' Rechenmaschine in das Jahr 1670 datiert. Die Entstehungszeit des vorliegenden Stücks lässt sich dadurch weiter auf die Zeit bis Ende 1670 eingrenzen.

De Discerptionibus numerorum dixi nonnihil in *Arte combinatoria*. Discerptio *Zerfällung* est enumeratio partium omnium numeri dati. Duo hic indagari summatim merentur, primum via exhibendi dati numeri discerptiones omnes, deinde discerptio ex qua componi possunt numeri omnes. De illo alibi. Delibavi nonnihil in *combinatoria*, ubi ostendi numeros progressionis Geometricae duplæ componi ex omnibus complexionibus numeri dati.

De Discerptione ex qua omnes numeri componantur nunc aliquid dicam. Sciendum ergo ex numeris progressionis geometricæ duplæ ab unitate deinceps componi numeros

alios omnes qui non sint summo progressionis majores, v. g. 1. 2. 4. 8. 16. 32.
0 1 2 3 4 5

64. 128. 256. 512. 1024. 2048. 4046. 8192. Sume numerum minorem quam 8192. Is
6 7 8 9 10 11 12 13

componetur ex quibusdam numeris antecedentibus simul sumtis. Ultimus semper ex omnibus addito 1. ut 16 ex 1. 2. 4. 8 + 1. Numerus datus 5205 ex 4096. Hujus rei ratio

$$\begin{array}{r} 1024 \\ 64 \\ 16 \\ 4 \end{array}$$

1 Darüber am oberen Rand des Blatts:

8

$$\begin{array}{ccccccc} & & 4 & & 12 & & \\ & & 2 & & 6 & & 18 \\ & 1 & & 3 & & 9 & & 27 \end{array}$$

14–17 (1) $\langle 12 \rangle$ teilw. gestr. (2) $\langle 8 \rangle$ L 2 dati. (1) Notabile (2) duo L
 $\begin{array}{ccc} 6 & 18 & \\ 3 & 9 & 27 \end{array}$ $\begin{array}{ccc} 4 & 12 & \\ 2 & 6 & 18 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \end{array}$
 4 f. in | practica gestr. | combinatoria, L 9 v. g. (1) 1. 2. (2) 1. L 10 8192. (1) sumere (2)
 $\begin{array}{ccc} & & \\ 1 & 2 & 0 \end{array}$ 13

sume L

14–17 Das Zahlenschema erläutert den Zusammenhang zwischen den beiden Gewichtssätzen in Aufgabe XI in Teil 9 von Schwenters *Deliciae Physico-Mathematicae*, auf die sich Leibniz auf S. 274 Z. 19 f. bezieht. 1 dixi nonnihil: *Dissertatio de arte combinatoria*, 1666, S. 9 f. u. S. 55–57 (VI, 1 N. 8 S. 176 u. S. 209 f.). 4 alibi: Vgl. N. 44 und N. 43. 5 ostendi: *Dissertatio de arte combinatoria*, 1666, S. 9 f. (VI, 1 N. 8 S. 176).

profundius consideranti facile appareat. Quia eadem est differentia differentiarum, quaesita differentia, progressionum et cum additae semper praecedentes in progressionibus differant unitate, idem erit in differentiis progressionum, jam semper differentiae differentiarum unitate pauciores et differentiae differentiarum de differentiis rursus et ita 5 porro, ergo prodeunt numeri omnes, quod non fit in aliis progressionibus. Seco numerum datum in binas partes, et partes rursus. Datus ergo numerus vel est aliquis horum vel non est sed datis minor, si non est sume progressionem proxime minorem. Si addes ei omnes sequentes, habebis ipsum duplum, sed hic non debet duplus ergo in caeteris continetur v. g. in 1. 2. 4. 8. 16. Si esset 15. contineretur in 1. 2. 4. 8. simul si esset 14. continetur 10 in 8. 4. 2. ita ademisti 1. Si esset 13. contineretur in 8. 4. 1. ita ademisti rursus 1. ergo semper procedendo potes adimere unitatem. Ergo omnes numeros exhibere. Et hoc verum est de omnibus numeris progressionis geometricae duplae etiam non incipientibus ab unitate. Dummodo progrediaris usque ad fractiones.

Ex hac proprietate multa sequuntur usus non contemnendi, primum enim si pondera, mensurasque tam longitudinum quam capacitatum ita ordines, non erit opus nisi tot ponderibus quot sunt numeri progressionis duplae, et non nisi semel quolibet. V. g. pone libram divisam esse in 8192. partes, et te habere 14 illa pondera enumerata quorum primum ponderet $\frac{1}{8192}$. secundum $\frac{2}{8192}$, tertium $\frac{4}{8192}$ etc. Poteris cuilibet ponderi dato minori his solis inter se conjunctis aequipondium dare. Animadvertisit jam quiddam tale 20 Schwenterus. Potest et alias esse usus in divinando. Divinabo enim numerum sumtum ab alio non nominatum modo ordine detrahama numeros progressionis Geometricae duplae. Pone numerum sumtum divinandum esse 19. Jubeo eum dicere sitne numerus supra 100. aut 200 aut 500. Si dicit esse infra 100 v. g. jubeo detrahere 64. Si negat se posse jubeo detrahere sequentem etc. Si potest jubeo detrahere 64 inde 32. quamdiu potest. Ubi desinit

1 apparel. (1) Qvia omnes praecedentes differunt unitate a seqvente (2) qvia $L = 3$ semper (1) differentia differentiae unitate minor (2) differentiae $L = 6$ et (1) dat (2) partes $L = 7$ sume (1) datum qv (2) progressionem $L = 9$ in 1. 2. 4. 8. 16 (1) sume 8. (2) Si $L = 9$ in | 1. 2. 3. 4. 8. ändert Hrsg. | simul $L = 10$ in 8. 4. 2. (1) 1. Si (2) ita $L = 11$ exhibere (1) Ex hac p (2) Et $L = 16$ duplae, (1) usque (2) | et erg. | non $L = 17$ et | de ändert Hrsg. | habere $L = 17$ pondera (1) praecedentia (2) enumerata $L = 18$ cuilibet (1) numero (2) ponderi $L = 24$ detrahere (1) 32 (2) 64 L

19 Animadvertisit: D. SCHWENTER, *Deliciae Physico-Mathematicae oder Mathematische und Philosophische Erquickstunden*, 1636, Teil 9, XI. Aufgabe, S. 368 f. 20 usus in divinando: a. a. O., Teil 1, I. Aufgabe, S. 17–19.

posse numeros pares continuos detrahere noto, sumo proximum per saltum unum duosve et ita usque ad unitatem sumendi a. numeri progressionis duplae palliati, v. g. pro 16 detrahe 9. 3. 2. si non potest successive omnes jam scis non posse detrahere 16. Ultimus maximusque usus erit, ut puto, in multiplicando et dividendo ope practicae Italicae huc restrictae. Esto numerus 5205. multiplicandus per 365. Sume omnes discriptiones numeri multiplicandi 5205. ex numeris progressionis duplae, omnes item multiplicantibus 365. illius sunt enumeratae paulo ante, hujus sunt 256. 64. 32. 8. 4. 1. Jam debet esse Tabula pythagorica magna, cui jam omnium numerorum progressionis duplae in se invicem multiplicationes sint inscriptae. His inter se additis habebis productum. Sed cogitandum hic de compendiis primum inveniendi dati numeri discriptiones, deinde addendi. Utrumque 10 praestandum per machinam. Nota pro 256 possunt in se duci 3. et 5. etc.

1. 3 4. 5 9. 7 16. 9 25. Notum est numeros quadratos differre numeris imparibus deinceps ab unitate, hinc sequitur ex numeris quadratis quoque inter se compositis posse oriri alios omnes. v. g. 23. ex 16. 9 – 2. 18 ex 16 + 4 – 2. Paulo aliter res instituenda.

1 pares (1) detrahere noto (2) continuos L 3 omnes erg. L 5 per (1) 301 (2) 365 L
 6 multiplicandi erg. L 6 f. multiplicantibus 365. (1) nempe (2) illius sunt (a) enumerata (b) enumeratae L
 11 Nota . . . etc. erg. L 14 alios | detraho 1. erg. u. gestr. | omnes. L 14 ex 16. (1) 9+1. (2) 9–2 L
 14 instituenda. | Summae numerorum imparium constituunt numeros progressionis Geometricae duplae,
 v. g. (1) 1. 2. (2) 1. 3. 5. 7. 9 gestr. | L
 4 8.

43. REGULA DISCERPTIONUM UNIVERSALIS
 [Juli – Dezember 1672]

Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 III B 14 Bl. 4. Fragment eines Blattes, max. [noch] cm × [noch] cm. Obere Kante gerade beschnitten, unten und links ursprüngliche Blattränder, auf der rechten Seite erstreckt sich von der oberen Ecke bis etwa [noch] cm über der unteren Ecke eine max. [noch] cm keilförmig nach innen reichende Schnittkante, wobei die schmalste Stelle des Blattes ca [noch] cm über dem unteren Rand liegt. Bl. 4 bildete ursprünglich zusammen mit LH 35 XII 1 Bl. 15 (N. 44) die unteren beiden Drittel eines Blattes 2°. 1 S. auf Bl. 4 v°. Bl. 4 r° leer. An der linken Schnittkante fehlen Teile einzelner Zeichen, die auf LH 35 XII 1 Bl. 15 r° erhalten sind. — Gedr.: LKK 2, 1976, S. 261.
 Cc 2, Nr. 520 A

Datierungsgründe: S. N. 44.

R e g u l a D i s c e r p t i o n u m U n i v e r s a l i s

Si qua quaeritur discerptio dati Numeri et Exponentis seu partium numeri, quaerantur discerptiones exponentis unitate minoris omnium numerorum praecedentium, ita tam
 15 men ut semper adimatur a sequentis numeri discerptionibus numerus numerorum praece-
 dentium, quorum discerptiones assumuntur, productum erit discerptiones dati exponentis
 quaesitae. Haec est solutio universalis, cujus compendia particularia pro numerorum et
 exponentium ratione privata methodo inveniri possunt.

13 f. U n i v e r s a l i s (1) Sumantur (a) excerptiones (b) excerpt (c) discerpti (2) Si *L*
 14 f. Exponentis | seu partium numeri *erg.* |, (1) quaeratur discerptio (2) quaerantur (a) com2nationes,
 (b) discerptiones com2natae eius numeri, (3) discerptiones *L*

44. REGULA DISCERPTIONUM ET TRISCERPTIONUM UNIVERSALIS
 [Juli – Dezember 1672]

Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 XII 1 Bl. 15. Unregelmäßig beschnittener Teil eines Blattes, das ursprünglich zusammen mit LH 35 III Bl. 4 (N. 43) die unteren beiden Drittel eines Blattes 2° bildeten, max. [noch] cm × max. [noch] cm. Linke Kante gerade beschnitten, obere Kante bogenförmig beschnitten, rechte und untere Kante ursprüngliche Ränder des Blattes. In der rechten unteren Ecke fehlt N. 43. 1 S. auf Bl. 15 r°. Bl. 15 v° leer. An der Schnittkante Fragmente von Zeichen von N. 43. — Gedr.: LKK 2, 1976, S. 259–261.
 Cc 2, Nr. 520 B

5

Datierungsgründe: N. 43 wurde nach N. 44 auf demselben Textträger begonnen. Der letzte Absatz von N. 44 entstand nach Abschluss von N. 43, aber noch vor der physischen Trennung beider Stücke. N. 43 befand sich ursprünglich zwischen S. 280 Z. 19 und S. 281 Z. 1 von N. 44. — Das Wasserzeichen des Papiers ist für Juli – Dezember 1672 belegt. Die Verwendung von f als Gleichheitszeichen und die Nutzung von f. als Abkürzung von *facit* in Gleichungen verweisen ebenfalls auf eine Entstehung von N. 44 zu Beginn von Leibniz' Aufenthalt in Paris.

10

15

Regula discerptionum et triscerptionum universalis

[Erster Ansatz]

1	1	6						
2	3	5 + 1.		4 + 2.		3 + 3.		
3	3	4 + 1 + 1.		3 + 2 + 1.		2 + 2 + 2.		
4	2	3 + 1 + 1 + 1.		2 + 2 + 1 + 1.				
5	1	2 + 1 + 1 + 1 + 1.						
6	1	1 1 1 1 1 1						

20

16 Regula ... universalis erg. L 20 3 (1) 4 + 2 + {6} (2) 4 + 1 + 1. L 21 3 + 1
 + 1 + 1. (1) 2 + 1 + (2) 2 + 2 + 1 + 1. L

	$1 \mid 1 \mid 8$	$6 + 2.$	$5 + 3.$	$4 + 4.$
	$2 \mid 4 \mid 7 + 1.$	$5 + 2 + 1.$	$4 + 3 + 1.$	$3 \quad 3. \quad 2.$
	$3 \mid 4 \mid 6 + 1 + 1.$	$4 + 2 + 1 + 1.$	$3 + 3 + 1 + 1.$	$2 + 3 + 1 + 1.$
5	$4 \mid 4 \mid 5 + 1 + 1 + 1.$			
	$5 \mid 3 \mid 4 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1$	$3 \quad 2 \quad 1 \quad 1 \quad 1$	$2 \quad 2 \quad 2 \quad 1 \quad 1$	
	$6 \mid 2 \mid 3 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1$	$2 \quad 2 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1$		
	$7 \mid 1 \mid 2 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1$			
	$8 \mid 1 \mid 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1$			
10		$1 \mid 1. \mid 4$		
		$2 \mid 2 \mid 3 + 1.$	$2 + 2.$	
		$3 \mid 1 \mid 2 + 1 + 1.$		
		$4 \mid 1 \mid 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1$		

10. 6. 5. 1. 1. 1. 1. 4. 2. 1. 1. 1. 1. 3. 3. 1. 1. 1. 1. 3. 2. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 1.

10. 5. 6. 1. 1. 1. 1. 5. 2. 1. 1. 1. 4. 3. 1. 1. 1. 3. 3. 2. 1. 1. 3. 2. 2. 2. 1.

15 Discerptio numeri in partes tot quot sunt in eo unitates et in partes tot quot sunt in eo unitates demta 1. est semper non nisi una.

1 Am Rand:

$$\begin{array}{r} 3 \\ 2 \quad 1 \\ 1 \quad 2 \\ \hline 1 \quad 3 \\ \hline 7 \quad 6 \end{array}$$

17–21 Am Rand: (1) 4 (2) 3 L 3 | 3 | (1) 3 (2) 4 L 5 | 5 | (1) 4 (2) 3 | 4 1 1 1 1 | (a)

$$\begin{array}{r} 3 \quad 2 \\ 2 \quad 1 \\ \hline 1 \end{array}$$

2 (b) 3 2 1 1 1 (aa) 2 3 1 1 (bb) 2 2 1 (cc) 2 2 2 1 1 L 8 | 1 | (1) 2 (2) 1 1 1 1 1 1 1 L

13 10. (1) 5 (2) 6 L 13 4. 2. 1. 1. 1. | 3. 3. 1. 1. 1. erg. | (1) 3. 2. 1. (2) 3. 2. 2. 1. 1. L

14 5. 2. 1. 1. 1. (1) 4. 3. 2. 2. (2) 4. 3. 1. 1. 1. L 14f. 3. 2. 2. 2. 1 (1) unter 4. 3. 1. 1. 1.: 4. (a) 2.

(b) 3. 2. 1 (2) omnes discriptiones numeri in partes tot qvot sunt unitates et in partes tot qvot sunt in eo unitates demta 1. sunt (3) discerptio ... qvot sunt | in erg. | eo erg. Hrsg. | unitates L

3 f. | 3 | ... 2 + 3 + 1 + 1.: Es fehlen die Zerfällungen 4 + 2 + 2, 3 + 2 + 2 + 1 und 2 + 2 + 2 + 2; die Zerfällung 2 + 3 + 1 + 1 ist fehlerbehaftet. Tatsächlich gibt es somit fünf Zerfällungen von 8 in je drei sowie fünf Zerfällungen in je vier Teile. 14 10. 5. ... 3. 2. 2. 2. 1: Es fehlen die Zerfällungen 2. 2. 2. 2. 2 und 4. 2. 2. 1. 1.

Quaerere summam discerptionum sine Tabula, id ego aliis relinqu.

Usus quidam discerptionum Harsdorf. Recreat. 2. contin. 2. pars 1. prop. 21. Adde Arnaldi Elementa Geometrica.

[*Zweiter Ansatz, gestrichen*]

| | | | | | |
|----|---|----|-------------------|------------|----------|
| 1 | 1 | 1) | 1. | | 5 |
| | 1 | 1) | 2 | | |
| 2 | 2 | 1) | 1 + 1. | | |
| | 1 | 1) | 3 | | |
| | 2 | 1) | 2 + 1. | | |
| 3 | 3 | 1) | 1. 1. 1. | | 10 |
| | 1 | 1) | 4 | | |
| | 2 | 2) | 3 + 1. | 2. 2. | |
| | 3 | 1) | 2. 1. 1. | | |
| 5 | 4 | 1) | 1. 1. 1. 1. | | |
| | 1 | 1) | 5 | | 15 |
| | 2 | 2) | 4. 1. | 3. 2. | |
| | 3 | 2) | 3. 1. 1. | 2. 2. 1. | |
| | 4 | 1) | 2. 1. 1. 1. | | |
| 7 | 5 | 1) | 1. 1. 1. 1. 1. | | |
| | 1 | 1) | 6 | | 20 |
| | 2 | 3) | 5. 1. | 4. 2. | 3. 3. |
| | 3 | 3) | 4. 1. 1. | 3. 2. 1. | 2. 2. 2. |
| | 4 | 2) | 3. 1. 1. 1. | 2. 2. 1. 1 | |
| | 5 | 1) | 2. 1. 1. 1. 1. | | |
| 11 | 6 | 1) | 1. 1. 1. 1. 1. 1. | | 25 |

2 Harsdorf. (1) Scr. (2) Recreat. 2 (a) contin 1. (b) contin. L 9 f. 2 + 1. (1) 6 (2) 3 L 12 3
+ 1. (1) 2 + 2 (2) 2. 2. L 13 f. 2. 1. 1. (1) 10 (2) 5 L

2 Harsdorf ... prop. 21.: G. Ph. HARSÖRFFER, *Delitiae mathematicae et physicae. Der Mathematischen und Philosophischen Erquickstunden zweyter Theil*, 1651, Teil 1, 21. Aufgabe, S. 23–25.

3 Arnaldi ... Geometria: [A. ARNAULD], *Nouveaux elemens de Geometrie*, 1667, Solution d'un des plus celebres et des plus difficiles Problèmes d'Arithmetique, appellé communement Les Quarrez Magiques, S. 325–345.

| | | | | | | | |
|----|----|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| | 1. | 1) 7. | | | | | |
| | 2. | 3) 6. 1. | 5. 2. | 4. 3. | | | |
| | 3. | 4) 5. 1. 1. | 4. 2. 1. | 3. 3. 1. | 3. 2. 2. | | |
| | 4. | 3) 4. 1. 1. 1 | 3. 2. 1. 1. | 2. 2. 2. 1. | | | |
| 5 | 5. | 2) 3. 1. 1. 1. 1. | 2. 2. 1. 1. 1. | | | | |
| | 6. | 1) 2. 1. 1. 1. 1. 1. | | | | | |
| | 13 | 7) 1) 1. 1. 1. 1. 1. 1. | | | | | |
| | 1. | 1) 8 | | | | | |
| | 2. | 4) 7. 1. | 6. 2. | 5. 3. | 4. 4. | | |
| 10 | 3. | 5) 6. 1. 1. | 5. 2. 1. | 4. 3. 1. | 3. 3. 2. | 4. 2. 2. | |
| | 4. | 5) 5. 1. 1. 1. | 4. 2. 1. 1. | 3. 3. 1. 1. | 3. 2. 2. 1. | 2. 2. 2. 2. | |
| | 5. | 4) 4. 1. 1. 1. 1. | 3. 2. 1. 1. 1. | 2. 3. 1. 1. 1. | 2. 2. 2. 1. 1. | | |
| | 6. | 4) 3. 1. 1. 1. 1. 1. | 2. 2. 1. 1. 1. 1. | 1. 3. 1. 1. 1. 1. | 1. 2. 2. 1. 1. 1. | | |
| | 7. | 2) 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. | | | | |
| 15 | 26 | 8) 1) 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | | | | | |

Ut inveniatur discerptio dati Exponentis et numeri, primum a Numero subtrahendus est exponens demta unitate ut $7 - 3 - 2$, f. ⟨5⟩.

[Dritter Ansatz, nicht gestrichen]

$$\begin{array}{ccccccccc}
 7 + 1. & & 6 + 2. & & 5 + 3. & & 4 + 4. & & 3 + 5. \\
 6. 1. 1. 5. 2. 1. 4. 3. 1. & \cancel{5. 1. 2.} & 4. 2. 2. 3. 3. 2. & \cancel{4. 1. 3.} & \cancel{3. 2. 3.} & \cancel{3. 1. 4.} & \cancel{2. 2. 4.} & \cancel{2. 1. 5.} & \cancel{1. 1. 6.}
 \end{array}$$

$$16-18 exponens (1) ut (a) 6 - 3. f. 3. (b) 7 - 3. f. 4. (2) demta L \quad 18-281,1 \quad \begin{matrix} 2+6 \\ \cancel{1. 1. 6.} \end{matrix} \quad \left| \begin{matrix} 1. 7. \text{ gestr.} \\ 1. \end{matrix} \right| \text{ Nota } L$$

7 13: Die Angabe der Gesamtzahl der Zerfällungen von 7 ist fehlerbehaftet. 12–15 5: In den Zeilen der Zerfällungen von 8 in fünf, sechs und sieben Teile treten Dopplungen auf. Die Einträge der zweiten Spalte spiegeln somit die Anzahlen der Einträge in den Zeilen dieser Tabelle, nicht jedoch diejenigen der voneinander verschiedenen Zerfällungen von 8 in die jeweils in der ersten Spalte angegebenen Anzahlen von Teilen wider. Dies überträgt sich auf die Angabe der Gesamtzahl links neben der Tabelle. 16 7 – 3 – 2: Leibniz führt die Modifikation des Beispiels nicht konsequent zu Ende.

Nota sunt tot discriptionum colligendarum classes quot numeri antecedentes, semper prima novae classis jam continetur in prima classe, et secunda novae classis in 2^{da} classe, et si plures sunt vel totidem classes (seu numeri praecedentes) quot termini novae tota nova nihil valet seu non nisi repetitio est. Hinc statim apparent quae classes abolendae ea scilicet cuius discriptiones (exponentis praecedentis) non sunt plures unitatibus numeri classium praecedentium. Et si una classis ergo omnes classes numerorum reliquorum minorum.

1 Nota (1) semper prima discriptio sumta a discriptionibus (2) sunt L 5 praecedentis) (1) pauciores (2) non L

45. DE NUMERO FORMARUM

Februar 1676

Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 XII 1 Bl. 18. 1 Bl. 2^o. 1 S. auf Bl. 18 r^o. Bl. 18 v^o leer. —

Gedr.: LKK 2, 1976, S. 264 f.

5

Cc 2, Nr. 1342

Febr. 1676.

De Numero Formarum.

Exemplum memorabile fallentis inductionis. Nimimum
sex primi termini numerorum hujus seriei coincidere
10 cum sex primis terminis seriei Numerorum primitivorum.

Reliqui vero expectationi non respondere

10 terminis (1) numerorum (2) seriei Numerorum (a) primorum (b)
primitivorum *L* 11–283,2 respondere (1) 0 0 (2) Diffiae 1 a. (a) b (b) 1 *L*

| | | | |
|---------|----|---|--|
| Diffiae | 1 | a. | |
| | 1 | | |
| | 2 | $a^2 ab$ | |
| | 1 | | |
| | 3 | $a^3 a^2 b abc$ | |
| | 2 | | |
| | 5 | $a^4 a^3 b a^2 b^2 a^2 bc abcd$ | |
| | 2 | | |
| | 7 | $a^5 a^4 b a^3 b^2 a^3 bc a^2 b^2 c^2 a^2 bcd abcde$ | |
| | 4 | | |
| | 11 | $a^6 a^5 b a^4 b^2 a^4 bc a^3 b^3 a^3 b^2 c a^3 bcd a^2 b^2 c^2 a^2 b^2 cd a^2 bcde abcdef$ | |
| | 4 | | |
| | 15 | $a^7 a^6 b a^5 b^2 a^5 bc a^4 b^3 a^4 b^2 c a^4 bcd a^3 b^3 c a^3 b^2 c^2 a^3 b^2 cd a^3 bcde a^2 b^2 c^2 d a^2 b^2 cde a^2 bcdef abcdefg$ | |
| | 5 | | |
| | 20 | $a^8 a^7 b a^6 b^2 a^6 bc a^5 b^3 a^5 b^2 c a^5 bcd a^4 b^4 a^4 b^3 c a^4 b^2 c^2 a^4 b^2 cd a^4 bcde a^3 b^3 c^2 a^3 b^3 cd a^3 b^2 c^2 d a^3 bcdef a^2 b^2 c^2 d^2 a^2 b^2 cdef a^2 bcdefg abcdefgh$ | |
| | 5 | | |
| | 25 | $a^9 a^8 b a^7 b^2 a^7 bc a^6 b^3 a^6 b^2 c a^6 bcd a^5 b^4 a^5 b^3 c a^5 b^2 c^2 a^5 b^2 cd a^5 bcde a^4 b^4 c a^4 b^3 c^2 a^4 b^3 cd a^4 b^2 c^2 d a^4 b^2 cde a^4 bcdef a^3 b^3 c^3 a^3 b^3 c^2 d a^3 b^3 cde a^3 b^2 cdef a^3 bcdefg a^2 b^2 c^2 d^2 e a^2 bcdefgh abcdefghj$ | |

6f. 2 (1) 4 (2) 5 L 15 $a^4 b^2 c^2$ (1) $a^4 bcde$ (2) $a^4 b^2 cd$ (a) $a^4 b^2 cd$ (b) $a^4 bcde$ (aa) a^4 (bb) $a^3 b^3 c^2 \dots a^3 b^2 cde$ (aaa) a^2 (bbb) $a^3 bcdef$ | $a^2 b^2 c^2 d^2 erg.$ | $a^2 b^2 cdef L$ 16f. 5 (1) 24 (2) 25 L 17 $a^2 b^2 c^2 d^2 e erg. L$

14–17 5 20 ... abcdefghj: Die Angaben zu den Anzahlen der Formen vom Grad 8 und 9 beziehen sich auf den Stand in der Handschrift vor der Ergänzung der Einträge $a^2 b^2 c^2 d^2$ in Z. 15 und $a^2 b^2 c^2 d^2 e$ in Z. 17. Tatsächlich gibt es zusammen mit den nicht aufgeführten Formen $a^2 b^2 c^2 de$ bzw. $a^3 b^2 c^2 d^2$, $a^3 b^2 c^2 de$, $a^2 b^2 c^2 def$ und $a^2 b^2 cdefg$ insgesamt 22 Formen vom Grad 8 und 30 vom Grad 9. Die Differenzen zu den Anzahlen an Formen vom vorausgehenden Grad müssten korrekt 7 und 8 betragen.

Patet hinc facile esse aliquando condere Hypothesin primis initii satisfacientem. Ut hoc loco si quis ordine ponat seriem numerorum ab unitate crescentium quorum differentiae sint Numeri progressionis Geometricae duplae geminati, continuando ad sextum usque terminum eosdem reperiet numeros cum sex prioribus numeris primitivis 1. 2. 3.

5 5. 7. 11. coincidentes.

Hinc si quis aestimare velit probabilitatem successus, sive quanto pignore contra aliud datum a quovis propositum pignus, certandum sit: considerare debet quam variis modis satisfieri possit huic problemati: seriem invenire, quae propositos numeros habeat terminos primos.

10 Deinde considerare debet quae possit esse inter seriem propositam et hypothesin a nobis factam, connexio.

Hoc loco tres habemus Hypotheses seu serierum fundamenta, quae sex dant primos numeros 1. 2. 3. 5. 7. 11. eosdem. Prima est seriei numerorum primitivorum. Secunda est seriei quae continet Numeros formarum in quolibet gradu; tertia est seriei, cujus terminorum differentiae sunt numeri progressionis Geometricae duplae ab unitate incipientis geminati.

Facile est Numerum formarum gradus cujusdam dati concinnare ex Numero formarum graduum praecedentium certa ratione alteratorum. Unde regula habebitur naturam explicans progressionis.

4 terminum (1) eundem reperiet terminum (2) eosdem $L - 8f.$ habeat, (1) pro terminis primis (2) terminos $L - 12$ serierum (1) regulas (2) fundamenta, quae (a) omnes (b) sex (aa) habent (bb) dant $L - 13$ Prima est (1) series (2) seriei $L - 13f.$ Secunda est (1) series (2) seriei $L - 14$ est (1) series, qv (2) seriei, L

46. NOTAE AD TRIANGULA NUMERORUM ET AD ALGEBRAM
 [Erste Hälfte Mai 1676]

Überlieferung: *LuT* Aufzeichnung (Tschrinhaus für Leibniz mit Bemerkungen von Leibniz):
 LH 35 XV 5 Bl. 16. 1 Bl. 2°. 1 S. auf Bl. 16 v°. — Auf Bl. 16 r° Leibniz' eigenhändiger
 Auszug seines Briefes an H. Bond vom 13. Mai 1676 (II, 1 N. 127 bzw. III, 1 N. 802).
 Cc 2, Nr. 1418

5


10

Datierungsgründe: Die Anordnung der beiden Stücke lässt vermuten, dass das vorliegende Stück zuerst auf dem Blatt gestanden hat. Es dürfte aber nicht wesentlich früher als der Auszug anzusetzen sein. Der Brief an H. Bond war bereits am 18. Mai 1676 in London (s. III, 1 S. 374), woraus sich die Datierung ergibt.

10

[*Erster Teil*]

[*Tschirnhaus*]



15

20

1 3 5 7 9
 2 4 6 8 10

2 3

27

81

24

81

24

57

25

1,13–19 Die Verbindungsstriche sowie einige der Einsen des Schemas stammen möglicherweise von Leibniz' Hand. 20 Den Verbindungsbogen hat wahrscheinlich Leibniz hinzugefügt; vgl. VII, 1 N. 92 S. 594 (Februar 1676) u. N. 94 S. 613 (April 1676).

[Zweiter Teil]

[Leibniz]

$$0, 1, , + 1 \sqcap 1$$

$$1, 2, , + 2 \sqcap 4$$

$$2, 3, , + 3 \sqcap 9 \text{ etc.}$$

$$0, 1, 2, , + 1 \sqcap 1$$

$$1, 2, 3, , + 2 \sqcap 8$$

$$2, 3, 4, , + 3 \sqcap 27$$

$$1, 4, , + 4, 3 \sqcap 16$$

$$3, 6, , + 6, 3 \sqcap 36$$

[Dritter Teil]

[Tschirnhaus]

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$$

1—2—3

$$a + b, \varphi Zc$$

$$\frac{1}{a} + \frac{2}{a+b} + \frac{1}{b}$$

$$\frac{1}{a} + \frac{3}{2a+b} + \frac{3}{a+2b} + \frac{1}{b}$$

17 Darunter in Tschirnhaus' Hand, schräg gesetzt und verwischt: $\frac{2c+4cc}{2c} \frac{2c^3}{\dots}$

6 0, 1, 2 ... $\sqcap 1$ erg. L 9 (1) 3, 4, , + 4 $\sqcap 16$ (2) 1, 4, , L 15 a + c, φZb T, ändert Hrsg.
3, 6, , + 3, 6 $\sqcap 36$
3, 6, , + 3, 4 \sqcap

16 $\frac{1}{a} \left(\frac{2}{a+b} \right) + \frac{1}{c} T$, ändert Hrsg.

13–17 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$: Vgl. das drei Monate zuvor von Tschirnhaus in VII, 3 N. 55 S. 732 Z. 11 – S. 733

Z. 6 entwickelte harmonische Dreieck.

[Vierter Teil]

$$\begin{array}{l} \alpha + b \not\sim cc + 2cd + dd \\ a \not\sim cc \qquad \qquad b \not\sim 2cd \end{array}$$

$$\alpha^2 + 2ab + b^2 \not\sim c^2 + 3cd^2 + 3c^3d + d^3$$

$$\begin{array}{lll} a^2 \not\sim c^3 & 2ab \not\sim 3c^2d & b^2 \not\sim 3cd^2 + d^3 \\ a \not\sim \sqrt{c^3} & b \not\sim \frac{3c^2d}{2a} & \frac{9c^4dd}{4c^2} \not\sim 3c^3d + d^3 \\ & & \frac{9cdd}{4} \\ & & 9cdd \not\sim 12c^3d + d^3 \\ & & 9cd \not\sim 12c^3 + dd \\ & & \hline & & dd \not\sim 9cd - 12c^3 \\ & & d \not\sim 3c + \sqrt{9cc - 12c^3} \\ & & d \not\sim 3c + c\sqrt{9 - 12c} \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 3 \quad b \not\sim 2cd \quad | a+b \not\sim \text{gestr.} \mid T \quad 5 \quad (1) b^2 \not\sim d^2 \quad (2) b^2 \not\sim 3cd^2 + d^3 \quad T \quad 6 \quad (1) c^3 + 3c^2d + \frac{9c^4dd}{4a^2} \not\sim \\ 3c^3d + d^3 \quad (2) \frac{9c^4dd}{4c^2} \not\sim 3c^3d + d^3 \quad T \end{array}$$

1–288,13 Vierter Teil: Im letzten Teil des Stückes werden Gleichungen der Form $(a+b)^n = (c+d)^{n+1}$ für $n = 1, 2$ und 3 betrachtet, wobei jeweils $a^n = c^{n+1}$ sowie $na^{n-1}b = (n+1)c^nd$ gesetzt wird.

3 $b \not\sim 2cd$: Unter den gegebenen Voraussetzungen ergibt sich $d = 0$ und folglich auch $b = 0$. Außer den trivialen Lösungen der so reduzierten Gleichung existieren für $n = 1$ keine Lösungen.

4 $c^3 + 3cd^3 + 3c^3d + d^3$: Gemeint ist $c^3 + 3c^2d + 3cd^2 + d^3$. Das Versehen geht in die rechte Gleichung von Z. 6 ein und belastet so die Berechnung von d im vorliegenden Ansatz; weitere Fehler treten hinzu. Im Neuansatz ab S. 288 Z. 1 geht Tschirnhaus von der korrekten 3. Potenz des Binoms $c + d$ aus und gelangt zu einem aussagekräftigen Ergebnis. Diesem zufolge existieren für $n = 2$ auch nicht-triviale reelle Lösungen der Gleichung. Dabei legt die Wahl einer der Größen die drei anderen fest.

$$\begin{array}{lll}
a^2 \not\sim c^3 & 2ab \not\sim 3c^2d & b^2 \not\sim 3cd^2 + d^3 \\
a \not\sim \sqrt{c^3} & 2b\sqrt{c^3} \not\sim 3c^2d & \frac{9ddc}{4} \not\sim 3cd^2 + d^3 \\
& 2b \not\sim \frac{3c^2d}{2\sqrt{c^3}} & 9d\cancel{d}c \not\sim 12cd^2 + 4\cancel{d}^3 \\
& b \not\sim \sqrt{\frac{9c^4dd}{4\cancel{d}^3}} & 9\cancel{d}c \not\sim 12cd + 4\cancel{d}d \\
5 & b \not\sim \sqrt{\frac{9cdd}{4}} & \cancel{d}c \not\sim 12c + 4d \\
& b \not\sim \frac{3d}{2}\sqrt{c} & 0 \not\sim 3c + 4d \\
& bb \not\sim \frac{9ddc}{4} & -3c \not\sim 4d
\end{array}$$

[Leibniz]

$$\begin{aligned}
& \boxed{a^3} + \boxed{3a^2b} + 3ab^2 + b^3 \sqcap \boxed{c^4} + \boxed{4c^3d} + 6c^2d^2 + 4cd^3 + d^4 \\
10 & \quad a^3 \sqcap c^4 \quad 3a^2b \sqcap 4c^3d \quad b \sqcap \frac{4c^3d}{3a^2 \sqcap 3\sqrt[3]{c^8}} \quad a \sqcap \sqrt[3]{c^4} \\
& \text{Ergo } b \sqcap \frac{4}{3}\sqrt[3]{\frac{c^3d^3}{c^2}} \quad b \sqcap \frac{4}{3}\sqrt[3]{\frac{d^3}{c^2}} \quad ab \sqcap \frac{4c^3d}{3\sqrt[3]{c^4}} \\
& 3ab^2 \sqcap \sqrt[3]{c^4}, \frac{16d}{9}\sqrt[3]{\frac{1}{c^2}} + b^3 \\
& \sqrt[3]{c^2}, \frac{16\cancel{d}}{9} + \frac{64}{27}\frac{d^{\cancel{d}2}}{c^2} \sqcap 6c^2d^2 + 4cd^3 + d^4 \quad [\text{Rechnung bricht ab}]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
10 \text{ f. } b \sqcap \frac{4c^3d}{3a^2 \mid \sqcap 3\sqrt[3]{c^8} \text{ erg.}} \quad a \sqcap \sqrt[3]{c^4} \quad (1) \text{ Ergo } \frac{\sqrt[3]{c^4}, 16c^6d^2}{3\sqrt[3]{c^8}} + \frac{64c^9d^3}{\cdot} \quad (2) \text{ Ergo } 3a \quad (3) \text{ Ergo } b \sqcap \\
(a) \frac{4}{3}\sqrt[3]{\frac{c^3d^3}{c^8}} \quad (b) \frac{4}{3}\sqrt[3]{\frac{c^3d^3}{c^2}} \quad L
\end{aligned}$$

11 $b \sqcap \frac{4}{3}\sqrt[3]{\frac{c^3d^3}{c^2}}$: Richtig wäre $b = \frac{4}{3}d\sqrt[3]{c}$. Zusammen mit weiteren Versehen in der Gleichung der nächsten Zeile belastet der Fehler die Rechnung bis zu ihrem Abbruch. — Tatsächlich gilt für $n = 3$, dass die Gleichung nur triviale Lösungen mit $b = 0$ und $d = 0$ besitzt. 12 $3ab^2 \sqcap \dots b^3$: Leibniz rechnet fortlaufend, daher besteht keine Gleichheit zwischen den beiden Seiten der Gleichung.

47. DE AEQUATIONIBUS CUBICIS ET BIQUADRATIS REDUCTIS
 [Oktober – Dezember 1676]

Überlieferung: L Notiz: LH 35 XII 2 Bl. 150. 1 Bl. 2°. Ca $\frac{2}{3}$ S. auf Bl. 150 v°. Die erste Zeile der Seite gehört zu VII, 3 N. 73 (vgl. ebd., S. 835 Z. 13). — Auf Bl. 150 r° der Rest von VII, 3 N. 73 sowie VIII, 2 N. 99. Beschriftung der beiden Seiten des Blattes gegenläufig.
 Cc 2, Nr. 1515 B

5

10

15

Datierungsgründe: Vgl. die Gründe für die Datierungen von VII, 3 N. 73 sowie VIII, 2 N. 99, insbesondere die Erwähnung von J. B. TAVERNIER, *Les six voyages*, 2 Bde, Paris, 1676 in letzterem Stück. Wie wir aus einem Brief von Leibniz an Ferdinand von Fürstenberg aus dem Dezember 1676 (I, 2 N. 209 S. 239) wissen, hatte er das am 1. Oktober 1676 erschienene Werk noch zur Kenntnis genommen, bevor er drei Tage darauf Paris verließ. Da auf dem Blatt offensichtlich zuerst VII, 3 N. 73, dann VIII, 2 N. 99 und zuletzt unser Stück niedergeschrieben wurde, stellt der 1. Oktober 1676 den *terminus post quem* dar. Das Papier stammt aus Paris; sein Wasserzeichen ist ansonsten für März bis August 1676 belegt. Eine Verwendung des Papiers in den auf Leibniz' Abreise aus Paris folgenden Monaten ist naheliegend.

$$\begin{aligned} & x^4 * qx^2 + rx + s \sqcap 0 \\ & x \sqcap \frac{ay + b}{cy + d} \quad x^2 \sqcap \frac{a^2y^2 + 2aby + b^2}{c^2y^2 + 2cdy + d^2} \\ & x^4 \sqcap \frac{y^4 + 4by^3 + 6b^2y^2 + 4b^3y + b^4}{c^4y^4 + 4c^3dy^3 + 6c^2d^2y^2 + cd^3y + d^4} \end{aligned}$$

Et aequatio erit:

$$\begin{array}{ccccccccc} x^4 & 1 & \sim & a^4y^4 & + & 4a^3by^3 & + & 6a^2b^2 & + & 4ab^3y & + & b^4 \\ * & & * & * & & * & & * & & * & & * \\ qx^2 & q & \sim & a^2c^2y^4 & & 2a^2cdy^3 & & a^2d^2y^2 & & 2abd^2y & & d^2b^2 \\ & & & & & 2abc^2y^3 & & 4abcdy^2 & & 2b^2cdy & & \\ & & & & & & & c^2b^2y^2 & & & & \\ rx & r & \sim & ac^3y^4 & & 3ac^2dy^3 & & 3acd^2y^2 & & ad^3y & & bd^3 \\ & & & & & bc^3y^3 & & 3bc^2dy^2 & & 3bcd^2y & & \\ s & s & \sim & c^4y^4 & & 4c^3dy^3 & & 6c^2d^2y^2 & & 4cd^3y & & d^4 \end{array}$$

20

25

18 f. erit: (1) | 1 y⁴ + 4b y³ + 6b² y² + 4b³ y + b⁴ nicht gestr. | (2) x⁴ 1 ∼ L
 s + 4sc³d ... + 6sc²d² .. + 4scd³ . + d⁴s

$$d \sqcap -\frac{4b + 2qbc^2 + rbc^3}{2qc + 3rc^2 + 4sc^3}, b$$

$$c^2$$

1,17–19 Nebenrechnung:

$$\begin{array}{r} a^2 y^2 + 2ab y + b^2 \\ c^2 y^2 + 2cd y + d^2 \\ \hline + a^2 d^2 y^2 + 2abd^2 y - d^2 b^2 \\ + 2a^2 cd y^3 + 4acdb \dots + 2cdb^2 \dots \\ a^2 c^2 y^4 + 2abc^2 \dots + c^2 b^2 \dots \end{array}$$

1,20 f. Nebenrechnung:

$$\begin{array}{r} a y + b \\ c y + d \\ \hline ad y - db \\ ac y^2 - bc y \\ \hline c^2 y^2 + 2cd y + d^2 \\ ad^2 c y^2 - ad^3 y - d^3 b \\ \hline d^2 bc \dots \\ + 2acd^2 y^2 + 2cd^2 b y \\ + 2ac^2 d y^3 - 2bc^2 d y^2 \\ \hline ac^2 d y^3 - c^2 bd y^2 \\ ac^3 y^4 - c^3 b y^3 \end{array}$$

1 $d \sqcap$: Konsequentergerechnet ergäbe sich $d = -\frac{4a^3 + 2qac^2 + rc^3}{2qa^2c + 3rac^2 + 4sc^3} b$. Der Fehler geht darauf zurück, dass Leibniz den Koeffizienten a und seine Potenzen in S. 289 Z. 16–26 erst ergänzt, nachdem er bereits die Gleichung für d aufgestellt hat. Auch die verbesserte Gleichung in der folgenden Zeile ist noch belastet. Der Ansatz, den Leibniz hier verfolgt, um d zu bestimmen, ist ohnehin untauglich: Zwar formt er die Gleichung $x^4 * qx^2 + rx + s \sqcap 0$ erfolgreich in eine andere Gleichung 4. Grades um (S. 289 Z. 19–26), doch ist die neue Gleichung nicht mit der Ausgangsgleichung identisch, da er in dieser nicht lediglich x substituiert, sondern sie zudem mit $(cy + d)^4$ multipliziert hat. Die Voraussetzungen für einen Koeffizientenvergleich sind somit nicht gegeben.

$2\varrho qa + 3rc^2a + 4sc^3a \sqcap 0$. Tunc in termino secundo non supererit d , adeoque ope ipsius d possumus tollere terminum penultimum nulla habita ratione secundi. Sed malim quod evanescit b .

$$\begin{aligned}
 & x^3 * qx + r [\sqcap 0] \\
 x \sqcap \frac{y+b}{cy+d} & \quad x^3 \sqcap \frac{y^3 + 3by^2 + 3b^2y + b^3}{c^3y^3 + 3c^2dy^2 + 3cd^2y + d^3} & 5 \\
 \\
 1x^3 & \quad [1] \curvearrowright y^3 + 3by^2 + 3b^2y + b^3 \\
 * & \quad * \quad * \quad * \quad * \\
 qx & \quad [q] \curvearrowright c^2y^3 + bc^2y^2 + 2bcdy + bd^2 \\
 & \quad \quad \quad 2cdy^2 \quad d^2y \\
 r & \quad [r] \curvearrowright c^3y^3 + 3c^2dy^2 + 3cd^2y + d^3 & 10 \\
 \\
 d \sqcap -\frac{+3 + 1c^2}{2c + 3c^2} b
 \end{aligned}$$

8 f. Nebenrechnung:

$$\begin{array}{r}
 c^2y^2 + 2cdy + d^2 \\
 \hline
 y + b \\
 \hline
 + bc^2y^2 \quad 2bcdy \quad bd^2 \\
 c^2y^3 \quad 2cdy^2 \quad d^2y
 \end{array}$$

2 terminum (1) ultim (2) penultimum L 3 qvod (1) rursus qvia (2) evanescit L

11 $d \sqcap$: Leibniz verfolgt auch für die reduzierte Gleichung 3. Grades den untauglichen Ansatz des Koeffizientenvergleichs. Dabei berücksichtigt er allerdings die Koeffizienten q und r nicht.

48. NOTAE AD RADICUM SERIES

[Frühjahr bis Sommer 1673]

Überlieferung: L Notiz: LH 38 Bl. 22. 1 Bl. 4°. $\frac{1}{4}$ S. quergeschrieben auf Bl. 22 r°. — Auf dem Rest der Seite um 90° gedreht VIII, 1 N. 11 sowie eine nicht von Leibniz' Hand stammende fragmentarische Notiz, welche die Aussage „72 + 5 (id est) 77“ ad rd ita [ut] 72 ad tang“ und darunter stehend das Wort „rad“ umfasst. Rückseite leer.

5 Cc 2, Nr. 1557

Datierungsgründe: Das auf derselben Seite des Blattes niedergeschriebene Stück VIII, 1 N. 11 wird von den Herausgebern aus inhaltlichen Gründen auf Sommer 1673 datiert. Sehr ähnliche Formeln wie 10 in unserer Notiz finden sich in den Stücken VII, 4 N. 15₂ und 16₁. Diese datieren die Herausgeber auf Frühjahr bzw. spätes Frühjahr 1673. Bei unserer Notiz könnte es sich um eine nicht zu Ende geführte Nebenbetrachtung zu den dortigen Überlegungen handeln.

$$\begin{array}{cccc}
 \gamma & 2\gamma - 1 & 3\gamma - 3 & 4\gamma - 6 \\
 \hline
 & \gamma & & \\
 \frac{\gamma}{\gamma} & \frac{2\gamma - 1}{\gamma} & \frac{3\gamma - 1 - 2}{\gamma} & \frac{4\gamma - 1 - 2 - 3}{\gamma} \\
 \\
 15 & \gamma & \gamma & \gamma \\
 Rq \gamma & Rq_1 2\gamma - 1 & Rq_1 3\gamma - 3 & Rq_1 4\gamma - 6 \\
 \\
 Rq 2\gamma - 1 \frac{\gamma}{\gamma} = & & & \\
 Rq \gamma, \gamma^2 - \frac{1}{\gamma} & & & \\
 \\
 Rq 1 & Rq 2 - \frac{1}{\gamma} & Rq 3 - \frac{3}{\gamma} & Rq 4 - \frac{6}{\gamma} \\
 \\
 \frac{2\gamma}{1} = 2 & \frac{3\gamma}{3} = & \frac{4\gamma}{6} = \frac{5}{15} & \frac{6}{21} \\
 \\
 14 \quad \frac{2\gamma - 1}{\gamma} \quad (1) \quad \frac{3\gamma - 3}{\gamma} \quad (2) \quad \frac{3\gamma - 1 - 2}{\gamma} \quad L
 \end{array}$$

13 $\frac{\gamma \dots 4\gamma - 6}{\gamma}$: Vgl. diese Darstellung mit der in VII, 4 N. 15₂ S. 246 Z. 4, wo im Nenner allerdings β anstelle von γ steht. 16 $Rq \gamma \dots Rq_1 4\gamma - 6$: Diese Zeile ist fast identisch mit ebd., S. 255 Z. 2 sowie mit ebd., N. 16₁ S. 256 Z. 22; dort wird jedoch jeweils die Dreieckszahl 3 übersprungen.

49. NUMERUM DATUM DIVIDERE IN DUOS QUADRATOS
Mai 1675

Überlieferung: L Notiz: LH 35 IX 11 Bl. 7–8. 1 Bog. 2^o. $\frac{1}{3}$ S. gestrichenen Textes auf Bl. 7 r^o.

— Über dem gestrichenen Text die Datierung „May 1675“ und der zum Text auf dem Rest des Bogens gehörende Titel „Frottement part. (2)“. Unterhalb des gestrichenen Textes Teil 2 von VIII, 2 N. 34₁, auf Bl. 7 v^o u. 8 r^o Teil 3 von VIII, 2 N. 34₁, auf Bl. 8 v^o der Beginn von VIII, 2 N. 34₂.

5

Cc 2, Nr. 965 A teilw.

Maji 1675

$y^2 + x^2 \sqcap ab$. Sit y pariter et x talis ut fractus quoque possit esse et quidem major unitate, ergo dividendo numeratorem per suum nominatorem habebimus $\beta + \frac{\gamma a}{\gamma + \delta} \sqcap y$ et $\theta + \frac{\lambda a}{\lambda + \mu} \sqcap x$. Unde $\beta^2 + \frac{2\beta\gamma a}{\gamma + \delta} + \frac{\gamma^2 a^2}{\gamma^2 + 2\gamma\delta + \delta^2} + \theta^2 + \frac{2\theta\lambda a}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda^2 a^2}{\lambda^2 + 2\lambda\mu + \mu^2} \sqcap ab$.

10

$ab - x^2 \sqcap y^2$. Pone $ab \sqcap c^2 + da$, fiet:

$c^2 + da - x^2 \sqcap y^2$. Extrahendo jam radicem:

12 f. $\sqcap ab$. (1) $\beta^2\gamma^2 + \beta^22\gamma\delta + \beta^2\delta^2 -$ (2) $ab - x^2 \sqcap y^2$ L 14–294,1 radicem: (1) $y \langle n \rangle c^2$

$$(2) y \sqcap \frac{c^2 + da - x^2}{c} \quad (3) \text{ sit jam } L$$

~~✓~~

4 May 1675: Die Datierung gehörte ursprünglich wohl zum vorliegenden Stück und lautete lateinisch „Maji 1675“. Leibniz hat sie nicht gemeinsam mit dem Stück gestrichen, sondern lediglich in „May 1675“ geändert, als er den französischen Titel für den später auf dem übrigen Bogen niedergeschriebenen Text ergänzte. 10 $y^2 + x^2 \sqcap ab$: Das vorliegende Stück enthält Nebenbetrachtungen zu dem zahlentheoretischen Problem, wann eine gegebene natürliche Zahl in eine Summe aus zwei Quadraten zerlegbar ist. Leibniz behandelt dieses von Ozanam an ihn herangetragene Problem in VII, 1 N. 78 u. 79 eingehender. Die Bedeutung des Problems hebt Leibniz in seinem Brief an Oldenburg vom 20. Mai 1675 hervor (vgl. III, 1 N. 51 S. 249). — Die Setzung $x^2 + y^2 = ba$, bei der Leibniz im vorliegenden Stück dreimal ansetzt, findet sich in VII, 1 N. 78 S. 539 Z. 16.

$$\begin{array}{r} \text{Sit jam } x^2 \sqcap z^2 + \frac{6zc}{5} + \frac{9c^2}{25}. \text{ Unde } \frac{16}{25}c^2 - \frac{6}{5}zc - z^2 \\ \hline \frac{4}{5}c - \frac{6}{8}z \\ \hline \frac{8}{5}c \end{array}$$

Et fiet: $\frac{36}{64}z^2 \sqcap ab - c^2$, quod est nihil.
+1

$$\begin{aligned} ab - x^2 &\sqcap y^2, \text{ seu } da + c^2 - x^2 \sqcap y^2. \text{ Pone } da \sqcap ec \neq xe, \text{ et } y \sqcap \frac{fc \neq fx}{a}. \text{ Fiet } e + c \neq x \\ &\sqcap \frac{f^2c \neq f^2x}{a^2}. \quad \frac{aec \neq xea}{a} + c^2 \sqcap ab. \\ 5 \quad ea^2 + ca^2 \neq xa^2 &\sqcap f^2c \neq f^2x \quad \text{seu } x \sqcap \frac{ea^2 + ca^2 - f^2c}{\neq a^2 \neq f^2} \sqcap \frac{-a^2b + ac^2 + aec}{\neq ea}. \end{aligned}$$

2 *Hilfsrechnung:* $\frac{36}{64}$
 $\frac{64}{100}$

$$\begin{aligned} 3 \quad \text{Pone } da \sqcap (1) ec \neq xe, \text{ et } y \sqcap fc \neq fx \quad (2) \mid \frac{ec \neq xe}{a}, \text{ ändert Hrsg.} | \text{ et } y \sqcap \frac{fc \neq fx}{a} \text{ fiet } e + c \neq x \\ \sqcap \frac{f^2c \mid \neq \text{ ändert Hrsg.} \mid f^2x}{a^2}. \quad (a) ec \neq xe \quad (b) \frac{aec \neq xea}{a} L \\ 5 \quad \text{seu } x \quad (1) \sqcap \frac{a^2b - c^2a - e}{c \neq x} \sqcap (2) \sqcap \frac{ea^2 + ca^2 - f^2c}{\neq a^2 \mid \neq \text{ ändert Hrsg.} \mid f^2} L \end{aligned}$$

2 nihil: Aus den Setzungen ergibt sich tatsächlich $(1 + \frac{36}{64})z^2 - ab + c^2 = 0$.

50. COMBINATORIA

[Oktober 1674 – Januar 1675]

Überlieferung: L Notiz: Zettel, ca $24 \times 5,5$ cm. 4 Z. r^o, 9 Z. v^o. Textfolge v^o, r^o. Der Streifen bildete ursprünglich zusammen mit N. 51 ca 1 Bl. 2^o und wurde (wohl von Leibniz) durch Schnitt abgetrennt. Über N. 50 und links neben N. 50 u. N. 51 auf v^o Reste weiteren Textes, der abgeschnitten wurde. Oben Bibliotheksvermerke: „gefunden in Otho Venus, Theatre moral. Brux. 1672 fol.“ und „jetzt in Comm. epist. Collins 1712“ sowie „zu IV 379^a“. Die beiden Blattfragmente wurden später wieder zusammengefügt und in Leibniz’ Handexemplar des *Commercium epistolicum D. Johannis Collins et aliorum de analysi promota*, 1712, Ms IV 379a, eingelegt.

10
Cc 2, Nr. 00

5

10

10

10

15

Datierungsgründe: Das Wasserzeichen des Papiers ist von Herbst 1674 bis Januar 1675 belegt. Das Gleichheitszeichen \equiv verwendet Leibniz ab Juni 1674. Im Text von N. 51 (S. 300 Z. 2) erwähnt er die von ihm im Oktober 1674 gefundene Trochoide der Parabel.

C o m b i n a t o r i a

Theoremata artis Combinatoriae sunt Generalia de formis rerum. In illis a priori demonstrare difficile; nisi profecta doctrina de qualitate, ut est illa de quantitate, ex^{plo} Joh. Christoph. Sturmii, multa cum per inductionem, tum etiam a posteriori, ope scientiae quantitatis, applicatione ad Calculum facta demonstrari possunt.

Calculus est subordinatus Combinatoriae, ut Arithmetica calculo; est enim calculus combinatio quorundam characterum in quaedam composita, ea lege facta, ut quantum uni adimitur vel additur omnibus, quantum uni super- vel subscribitur omnibus adimatur, addatur, super- vel subscribatur; aliisque paucis regulis observatis. Jam patet fingi posse combinationes mille aliis legibus praescriptis.

Quemadmodum caecus natus scientiam opticam discere potest, imo et in ea invenire

20

25

15 C o m b i n a t o r i a erg. L 22 vel additur erg. L

17 ex^{plo}: J. Chr. STURM, *Universalia Euclidea*, 1661; vgl. dazu auch Leibniz’ Bezugnahme in *De arte combinatoria*, 1666, S. 23–25 (VI, 1 N. 8, S. 186 f.). 25–296,1 Quemadmodum ... instrumenta: Leibniz spielt möglicherweise auf den Fall von Ulrich Schönberger an, der als Kleinkind erblindete und bis zu seinem Tod 1649 an der Universität Königsberg lehrte und Instrumente erfand; vgl. die spätere Erwähnung in den *Nouveaux essais* (VI, 6 S. 106).

theoremata, vel instrumenta; ita nos demonstrare possumus de Deo et infinito, etsi neuter habeat ideam sui objecti.

Data formula omnes modos enumerare, quibus enuntiari potest nullo forinsecus assumto: v. g.

5 $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \sqcap a^3, +3ab \wedge a+b, +b^3, \sqcap a^2, \wedge a+3b, +b^2, \wedge 3a+b.$
(unde forinsecus assumendo: $a^2+b^2, \wedge 3a+3b, -2a^2-2b^2$). Item $\sqcap a+b, \wedge +a+b, \wedge a+b,$
vel $a^2 + 2ab + b^2, \wedge a+b.$ Assumptiones forinsecae saepe utiles ad alia accendentia, destruenda.

7 alia (1) prolata (2) accendentia L

51. CHARACTERISTICA ET COMBINATORIA

[Oktober 1674 – Januar 1675]

Überlieferung: L Notiz: 1 Bl. ca 2°. Textfolge v°, r°. Das Blatt bildete ursprünglich zusammen mit N. 50 ca 1 Bl. 2° und wurde (wohl von Leibniz) durch Schnitt abgetrennt. Über dem Streifen N. 50 und links neben N. 50 u. N. 51 auf v° Reste weiteren Textes, der abgeschnitten wurde. Oben auf N. 50 Bibliotheksvermerke: „gefunden in Otho Venus, Theatre moral. Brux. 1672 fol.“ und „jetzt in Comm. Epist. Collins 1712“ sowie „zu IV 379a“. Die beiden Blattfragmente wurden später wieder zusammengefügt und in Leibniz' Handexemplar des *Commercium epistolicum D. Johannis Collins et aliorum de analysi promota*, 1712, Ms IV 379a, eingelegt.

5

10

Cc 2, Nr. 00

Datierungsgründe: s. N. 50.

Characteristica et combinatoria

Characteristica de arte formandi characteres. Novis enim opus est characteribus, quae linearum quoque ductus exprimantur, quarum ope id praestetur, et perfectius etiam quod vocabulis, ut scilicet sine visa figura omnia intelligi possint et figura si velis ex hac sola instructione duci, et ut mutari has characterum formulas idem sit, quod mutari figuram. Adjiciendi characteres, qui exprimant actionem, scilicet locum, tempus, (unde motus;) et cogitationem. Sed locus jam figuris geometricis continetur, adjiciendum tempus ergo tantum.

15

20

Separata in characteristica est doctrina Combinatoria, seu de eodem et diverso generaliter; sive de qualitate, sive de formis, ubi de similitudine loco aequalitatis, sive de identitate, loco aequationis. Nimirum calculus nihil aliud quam combinationum operatio est; synthesis quam productio alicujus formulae secundum certam combinationis legem; Analysis origo formulae secundum eandem legem investigata per comparationem cum formulis similibus quarum nota origo est. Et hinc origo in calculo, comparandi aequationes similes, quae non nisi consequentia est artis comparandi formulas similes. Theorema nihil aliud quam calculi compendia; seu modus quo statim ab initio ex aliqua formula

25

13 Characteristica et combinatoria erg. L 14 Darüber Il y a une grotte dans les pirenees, de 2 heures de profondeur gestr. L 24 est; (1) Analysis (2) synthesis L

praevideri potest qualis futurus sit calculi finis, ipso licet non facto. Unde paret, quid sit omnis scientia humana, quid demonstrationes, calculi scilicet recitatio. Definitiones vero nihil aliud quam explicationes characterum quibus utimur, ut postea inter ratiocinandum valores eas substituere possimus in locum ipsarum. Doctrina de eodem et diverso in 5 genere, manifestum est, eandem esse cum combinatoria; nam tot characteribus assumtis quot diversae res calculum ingrediuntur videmus quid ex earum combinatione nascatur. Doctrina de Harmonia est calculus quidam combinationum, seu doctrina de quantitate in ipsam doctrinam de combinationibus reflexa, est enim quaedam identitatis et diversitatis compensatio. Sunt in combinationibus quemadmodum in verbis, literae, vocabula, com- 10 mata, cola; periodi: quemadmodum in calculo comprehensiones. Additiones et subtractio- nes in calculo Mathematico vocabula seu terminos faciunt; multiplicationes non mutant vocabula, sed in ipsis coalescunt; quod scilicet ita compendiosissime omnia exprimi posse appareret, etsi hoc non sit necessarium. Quando subtrahimus signo quod differentia id dicimus; expectare nos differentiae id ipsum quod subtrahendum est addi debeat; ut tunc 15 destructione mutua additio illa subtractioni compensetur; cum pro divisione subscribimus id velimus; expectandum esse, dum id quod subscriptum est superscribatur, ut mutua compensatione tollatur sub- et superscriptio. Divisio et radicum extractio est operatio analytica, sed et resolutio rei in partes ex quibus composita est; doctrinam de radicibus et divisoribus hactenus Analystae tractavere, non de discriptionibus; cum tamen ejus ope 20 quoque inquiri possit in figurarum quadraturas, destructiones aliaque magni momenti; sed haec calculo mathematico altiora longa in ipsa Combinatoria habent fontem. Imo est et cum multiplicatio et additio res contrahit, cum v. g. $\frac{y^2}{y^3 + y^2 + y + 1}$, multiplicata per $1 - y^2$, dat $\frac{y^2 - y^4}{1 - y^4}$. Eodem modo fit aliquando ut additio reddat rem simpliciorem, v. g.

5 combinatoria; (1) nihil dici (2) nam $L = 6$ f. nascatur. (1) Qvoniam (2) doctrina de Harmonia (a) eadem est (b) qvodom (c) calculus $L = 8$ f. diversitatis (1) combinatio (2) compensatio. (a) subtractiones et divisiones (b) sunt $L = 10$ qvemadmodum in calculo (1) combinationes (a) et fractiones (b) et fra- (c) signa sunt fractionum (2) comprehensiones $L = 11$ seu terminos erg. $L = 17$ radicum | attractio ändert Hrsg. | (1) | est nicht gestr. | analysis (2) est L

22 multiplicata: Das gewünschte Ergebnis wird nicht durch eine Multiplikation mit $1 - y^2$, sondern durch eine Multiplikation mit dem Faktor $1 + y = \frac{1 - y^2}{1 - y}$ erzielt.

ad $\frac{x^2}{\sqrt{2ax - x^2}}$, adde $\sqrt{2ax - x^2}$, fiet summa: $\frac{2ax}{\sqrt{2ax - x^2}}$, quae formula priore simplicior.

Doctrina de Commatibus seu distinctionibus; etc. est combinatoriae; characteristica est quasi quaedam orthographia; formulae Etymologia quaedam; operationes quaedam syntaxis. Nimirum haec scientia est Grammatica rationis. Agendum ipsa longe rectius, quod homines vocabulis agere quotidie conantur, sed perfunctorie; et ideo multis erroribus. Vocabula saepe novis inveniendi ratiocinandique principia sunt. Cum in ingentibus rationum ductibus, quales in calculo algebraico videmus, exempli causa cum tangentes investigantur; impossibile sit imaginationem humanam per tot combinationes ire necessarii fuere characteres. Eodem modo generali inventa characteristica, non est dubitandum mira theoremata et problemata in omni doctrina inventum iri; quae nulla humana imaginatio alioquin detegere potuissest. In iis in quibus agit natura, saepe experimentis compendium ingentium calculorum fieri potest; prorsus quemadmodum calculi combinatorii ope numerorum; qui eum quodammmodo sensibus subjectum reddunt. Ideo instrumentum meum Arithmeticum Empiricae combinatoriae generali et inductionibus serviet combinatoriis; eodem modo ope experimenti optici statici, detegi possunt, quae alioquin nemo inventisset a priori. Sed characteristica in has quoque scientias introducta, et arte inveniendi theoremata et problemata, non est dubium innumera detecta iri, et experimentis comprobatura; quae alioquin nemo fuissest suspicatus, quaeque nunquam alias inventa fuissent. Scientia logica est quaedam combinatoriae in seipsam reflexio; seu cuius ego magni facio inventum, cum ejus ope possint homines adigi ad fatenda quae nolunt.

Scientia inveniendi theoremata in arte combinatoria, erit a priori ex ipsis ejus visceribus, notando quibus casibus fieri per synthesin possit, pro variis legibus combinationum, ut res faciem valde mutent; et in primis ut ex valde compositis fiant valde simplices. In omni calculo utimur comprehensionem quae multiplicationem tantum aut divisionem certae quantitatis in omnes comprehensas ducendae notant; eodem modo non est dubium alias comprehensions intelligi posse, additionum ac subtractionum quibus intelligatur, datam omnibus addendam. Aequationes non nisi formulae sunt factae ex multiplicatione formularum in quibus semper eadem quantitas; et alia; quae alia quantitas est radix; ideo fit, ut radices semper aut sensu aut cogitatione haberi possint. Ope divisionis continui in infinitum, spatiique et motus haberi possunt, ut quae alioquin seu si distinete haberi non licet, seu pro imaginariis habendae essent, inveniantur, ut quantitates irrationales; inte-

3 orthographia; (1) caeterae operationes (2) formulae L 6 sunt (1) sed considerandum est animum (2) Cum L

grae lineae fractis formulis aequales; ablationes eorum quae non insunt; constructiones problematum Tetragonisticorum ope motus. *⟨Uti⟩ de linea mea Mesolaba, qua ratio in data ratione secetur.* Sunt quaedam mira, et aegre fortasse tamen tandem per combinatoriam invenienda; v. g. lineam invenire quae se describat evolutione sui: modum invenire 5 describendi parabolam qua na*⟨vigatio⟩* utitur, in inflatione velorum; et item in aquarum jactibus. Lineam invenire quae se describat evolutione sui est unum ex problematibus plusquam difficilibus; cum in illis ne ulla quidem formula data sit, quae alioquin data est methodo functionum, seu tangentium inversarum.

Saepe fit ut res citius et facilius inveniatur vel demonstretur; per calculum Generalem; aliquando citius per domestica Geometriae principia, v. g. quod in parabola a circulo secta, summa ordinatarum in axem demissarum utrinque aequalis statim patet ex calculo, quia aequatione facta secundus terminus deest. At idem non nisi per ambages Geometricae demonstratur. Contra in plerisque simplicioribus fatendum est ea facilius inveniri Geometria quam calculo, si modo daretur ars characteristica Geometriae propria; 15 ratio est, quia calculo separatur situs a magnitudine, unde fit ut separatim inquisitis magnitudinibus, postea et de situ sit cogitandum, unde constructiones plerumque fiunt prolixae, at in geometriae purae inquisitionibus situs a magnitudine nunquam divellitur; cuius rei illustre est exemplum quod Dn. Matthion mihi proposuit. Hinc etiam scendum est posse Geometriam seu artem mutandi calculum analyticum in Geometricum 20 servire ad compendia calculatorum etiam in arte combinatoria generali; nam certe saepe facillime fiunt linearum ductu, quae non nisi maximis calculi ambagibus. Doctrina de formularum comparationibus vera est Analysis et omnium inventionum clavis una; altera est admiranda methodus ubi calculatis aliquot exemplis, investigatur eorum continuatio in infinitum; et hoc saepe facile est; et hac methodo infiniti calculi praeveniri possunt. 25 Interdum vero paulo difficilius divinare originem aliquot datarum formularum; huc pertinet Gregorii inquisitio inveniendi quantitatem quae eodem modo componatur ex infinita quaedam serie. Quae cum non succedat, nisi raro licebit ipsam potius invenire per quadraturas, e. g. quadratura parabolae. Et haec est doctrina Hypothesium datis aliquot

2 linea mea Mesolaba: Es handelt sich um die Trochoide der Parabel, vgl. VII, 3 N. 3812, S. 486.
 10–13 quod ... demonstretur: Vgl. R. DESCARTES, *Geometria*, 1659, *DGS* I S. 92, Fr. VAN SCHOOTEN, *Commentarii*, 1659, *DGS* I S. 330–343, sowie Leibniz' Bemerkungen in N. 11 S. 81 Z. 10 – S. 82 Z. 5 und seine algebraische Lösung des Problems in VII, 7 N. 7 S. 43–48. 18 exemplum: Möglicherweise handelt es sich um das von Leibniz in VII, 1 N. 11 gelöste Problem, ein Dreieck aus zwei gegebenen Seiten und gegebener Fläche zu bestimmen. [noch] 26 inquisitio: J. GREGORY, *Vera circuli et hyperbolae quadratura*, 1667.

formulis invenire regulam quandam ipsis communem; et tunc maxime perfecta est haec regula cum reciproca est, ut non tantum in quolibet seriei termino vera reperiatur, sed et contra ubi ipsa sit, termini sint, in primis si talis est, ut ope regulae termini etiam non dati inveniri possint; quod si una observatione seu regula praestari non potest, poterit pluribus inter se junctis.

Ecce ergo duas artes analyticas, alteram per demonstrationem alteram conjecturalem. Hac Conjecturali quoque praeclara in Geometria et numeris detegi posse, patet inductionibus Frenicli; *Arithmeticae infinitorum* Wallisii aliisque infinitis exemplis. Nota Characteribus pro Geometria inventis, fiet credo ut etiam Characteres habeantur ipsius quasi-situs spatiorum imaginiorum, aut potius dimensionum transcendentium, quales solvis altiores, sed exprimentur ope curvarum homogenearum; quemadmodum parabola pyramidem repraesentat. Et videndum an non arte quadam in parabola etiam soliditas pyramidis praesentari possit. Trilineum parabolicum pyramidem repraesentat; ipsa parabola sphaeram; Triangulum repraesentat conoeidem parabolicam, etc. Quemadmodum utile plana solidis homogenea, ita utile habere curvas spatiis homogeneas; utile quoque postea eas curvarum sectiones ope trochoeidum exprimi in plano, ope meae methodi tangentium inversae; item ope differentiarum reciproca; possunt figurae semper inveniri talibus quasi satisfacientes, ut error neglegi queat; et earum ope demonstrari et ratiocinari de istis licebit; et facile apparebit in quo possint istae demonstrationes applicari ad lineas veras indescriptibiles: ita hac arte inveniri poterunt calculo linearum analyticarum tangentes aliaque; supponendo eas per appropinquationem descriptas et calculando; et postea errores corrigendo; collatione cum iis, quae alioquin de figura vera esse constet.

Nota facilior est ars dechiffrandi, cum nobis ipsis licet invenire terminos quoslibet ut in scientiis juris examinandos; difficilius cum certus numerus ut cum ex datis experimentis hypothesis, ex datis aliquot literis dechiffratio quaeritur. Dechiffratio serie data plerumque in eo consistit, ut inveniamus quantitatem arithmeticę cum seriebus crescentem,

6 per (1) analysin, alter (2) comparationem aliam per in (3) demonstrationem L 15 utile (1) habere solida lineis repr(–) (2) plana L 23 f. ut ... juris erg. L 24 difficilior (1) cum (— —) ut (2) cum L

8 inductionibus: B. FRÉNICLE DE BESSY, *Solutio duorum problematum circa numeros cubos et quadratos*, 1657; J. WALLIS, *Arithmetica infinitorum*, 1656 (WO I S. 355–478). 16 f. ope trochoeidum ... reciproca: vgl. die einschlägigen Studien zwischen Oktober 1674 und Januar 1675 (VII, 3 N. 38–40; VII, 5 N. 7–29).

eodem modo ex quolibet termino compositam. Gregorius rem quaerit longe difficiliorem,
invenire e a n d e m quantitatem eodem modo ex quolibet seriei termino compositam.
Cumque ope quadraturarum inveniri possit quod ille postulat, inveniri etiam poterit fa-
cilius quod nos postulamus ope earundem; notandum est tamen id illum postulare in
5 seriebus quarum jam nota regula *(sed)* nobis ipsa regula quaeritur.

1 quaerit: s. o. Erl. zu S. 300 Z. 26.

52. NOTE SUR LES NOUVEAUX ELEMENS DE GEOMETRIE
[Mitte 1674 – Ende 1675 (?)]

Überlieferung: L Notiz: LH 35 I 19 Bl. 67. Papierfragment von unregelmäßiger Gestalt, rechts Blattkante, an den übrigen Seiten Risskanten, Größe ca. $8 \times 3,5$ cm. 7 Z. auf Bl. 67 v°, Vorderseite leer.
Cc 2, Nr. 495

5

Datierungsgründe: Die Verwendung des Französischen im vorliegenden Stück lässt eine Niederschrift in der Pariser Zeit vermuten. In unserem Stück wie auch in N. 20 (das nach Mitte 1674 entstanden sein muss) nennt Leibniz nur den Titel des anonym erschienenen Werkes von Arnauld, nicht aber den Autor. Womöglich war er zum Zeitpunkt der jeweiligen Niederschrift über dessen Namen noch nicht orientiert; andernfalls hätte er ihn als besondere Information wahrscheinlich mit angeführt. Wie er am 27. Juni/7. Juli 1690 an Vincent Placcius schreibt, hat er aber noch während seines Aufenthaltes in Paris von Arnauld selbst erfahren, dass dieser der Autor des Werkes sei (VI, 2 N. 80 S. 327). Am 12. Dezember 1675 schreibt Leibniz an Arnauld und übersendet ihm seine Ausarbeitungen zu einem von diesem gestellten Problem zur Zahlentheorie (III, 1 N. 69). In diesem Zusammenhang findet ein mündlicher Austausch statt, bei welchem Leibniz möglicherweise auch von Arnaulds Autorschaft erfährt. Somit wäre Ende 1675 ein *terminus ante quem*. Wenn man nun noch unterstellt, dass N. 20 und das vorliegende Stück auf dieselbe gründliche Lektüre der *Nouveaux elemens* zurückgehen, müsste unser Stück nach der Jahresmitte 1674 entstanden sein. Zwingend ist eine solche Datierung jedoch keineswegs; eine Entstehung des Fragments nach Leibniz' Abreise aus Paris kann nicht ausgeschlossen werden. Eine zweite Auflage des Werkes von Arnauld erschien 1683. In Leibniz' Kurzzitat aus Arnaulds Werk lautet die Schreibung wie in der zweiten Auflage *voye*, nicht *voie* wie in der Erstausgabe. Dies könnte man als Hinweis darauf werten, dass Leibniz aus der zweiten Auflage zitiert. Tatsächlich ist aber bei Leibniz generell die Schreibweise *voye* zu finden. Gewichtiger erscheint der Umstand, dass Leibniz mit der *similitude* von geometrischen Objekten argumentiert. Dies deutet darauf hin, dass seine Überlegungen aus einer Zeit stammen, in der er die Grundlagen seiner *Analysis situs* bereits entwickelt hatte, was auf eine Entstehung in der frühen Hannoveraner Zeit verweist. — Über den Verbleib der anderen Teile des ursprünglichen Trägers ist bisher nichts bekannt, so dass sich auf diesem Wege keine Informationen über den Entstehungszeitraum des Stücks gewinnen lassen. [noch]

10

15

20

25

Nouv. El. de Geom. lib. XII artic. 28. Apres avoir dit que *les circomferences des cercles sont comme leur diametres* et l'avoir prouvé selon Euclide par *voye* des polygones, il adjoute: *c'est la seule voye*. Cependant j'en ay trouvée une autre par la définition de la similitude.

30

30 *Nouv. El. de Geom.*: [A. ARNAULD], *Nouveaux elemens de geometrie*, 1667, S. 258 f.

53. TABULA DIFFERENTIARUM ET SUMMARUM
[April 1675]

Überlieferung: L Konzept: LH 35 V Bl. 6–7. 1 Bog. 4°. 8 Z. in drei Spalten kopfstehend im oberen Viertel von Bl. 7 r°. Im zweiten Viertel der Seite, ebenfalls kopfstehend, VIII, 2 N. 33. Untere Hälfte der Seite sowie Rückseite leer. Auf Bl. 6 r° u. v° Teile von VIII, 2 N. 32.
Cc 2, Nr. 945 D

Datierungsgründe: Das Stück VIII, 2 N. 32 zur mechanischen Reibung, das das andere Blatt des Bogens sowie einen weiteren Bogen einnimmt, ist von Leibniz selbst auf April 1675 datiert.

$$10 \quad xy \sqcap a^2. \text{ Ergo } y \sqcap \frac{a^2}{x}. \text{ Ergo } z \sqcap \frac{a^2}{x} - \frac{a^2}{x + \beta} \text{ seu } z \sqcap \frac{a^2 x + a^2 \beta - a^2 x}{x^2 + x\beta}. \text{ Ergo } z \sqcap \frac{a^2 \beta}{x^2}.$$

$$z \sqcap \frac{a^3}{x^2}. \text{ Unde } \frac{a^3}{x^2} - \frac{a^3}{x^2 + 2x\beta} \sqcap \omega. \text{ Unde: } \frac{\boxed{a^3 x^2} + 2a^3 x\beta \boxed{-a^3 x^2}}{x^4}. \text{ Ergo}$$

$$\omega \sqcap \frac{2a^3 \beta}{x^3}.$$

$$\frac{a^4}{x^3} - \frac{a^4}{x^3 + 3x^2 \beta} \sqcap \gamma. \quad \frac{\boxed{a^4 x^3} + 3a^4 x^2 \beta \boxed{-a^4 x^3}}{x^6} \text{ seu } \frac{3a^4 \beta}{x^4} \sqcap \gamma.$$

10 $xy \sqcap a^2$: Wie in VIII, 2 N. 33, das offensichtlich nach unserem Stück auf derselben Seite niedergeschrieben wurde, startet Leibniz mit einer Kegelschnittgleichung (dort lautet sie $ax = y^2$). Hier wie dort wird sodann eine Größe z bestimmt: hier über $z := y(x) - y(x + \beta)$, dort einmal ebenso (ebd., S. 285 Z. 15 f.), einmal über $z := y(x + \beta) - y(x)$ (ebd., Z. 13; vgl. auch VIII, 2 N. 312 S. 263 Z. 12).

10 $z \sqcap \frac{a^2 \beta}{x^2}$: Leibniz berechnet hier das infinitesimale Element der Ordinate; z entspricht dabei dy und β entspricht dx . Die Vereinfachung zum Ergebnis $z = \frac{a^2 \beta}{x^2}$ entspricht dem zu dieser Zeit üblichen Verfahren, ebenso der Verzicht auf ein mögliches negatives Vorzeichen, da nur Streckenlängen betrachtet werden. 11 $z \sqcap \frac{a^3}{x^2}$: Leibniz berechnet nun die Differenzen der Differenzen etc. Die Gleichung für z wird homogen als $z = \frac{a^3}{x^2}$ angesetzt, ω entspricht also dz bzw. ddy . Bei der Ansetzung der Gleichung für γ , also $d\omega$ bzw. $dddy$, lässt Leibniz den Faktor 2 weg, gibt ihn aber danach in der Tabelle an.

| | | | | |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|------|
| $\frac{a^2}{x}$ | $\frac{a^3}{x^2}$ | $\frac{2a^4}{x^3}$ | $\frac{3a^5}{x^4}$ | ... |
| Termini | Differentiae
1 ^{mae} | 2 ^{dae} | tertiae | etc. |

| | | | | |
|---------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Omn. a | Omn. x | Omn. x^2 | Omn. x^3 |
| a | x | $\frac{x^2}{2a}$ | $\frac{x^3}{3a^2}$ | $\frac{x^4}{4a^3}$ |
| Termini | Summae
1 ^{mae} | 2 ^{dae} | tertiae | |
| a | $\frac{a^2}{x}$ | $\frac{a^3}{2x^2}$ | $\frac{a^4}{3x^3}$ | $\frac{a^5}{4x^4}$ |

5

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----|
| 2 darunter gestrichen: | x | $\frac{x^2}{2a}$ | $\frac{x^3}{3a^2}$ | $\frac{x^4}{4a^2}$ | L |
| Termini | Summae
1 ^{mae} | 2 ^{dae} | tertiae | | |